

آزمائشی چاپو



درسي ڪتاب

رياضي



9 درجي لاءِ

MATH

سندھ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ، چام شورو

مفت ورهاست لاء



آزاد تعلیمی چارو

درسي ڪتاب

رياضي



9 درجي لاء



سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، چام شورو

چپینڈر: پیرادائز پریس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کراچی

سڀ حق ۽ واسطا سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄامشورو وٽ محفوظ آهن.

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوائٽي (آفاق) پاران سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄامشورو لاء تيار ڪيو.

ڊائريڪٽوريٽ آف ڪريڪيولم ۽ ريسرچ سنڌ ڄامشورو جي صوبائي ريويو ڪميٽي پاران نظر ثاني ڪيل. **بورڊ آف انٽرميڊيئيٽ اينڊ سيڪنڊري ايجوڪيشن، حيدرآباد، ڪراچي، سکر، لاڙڪاڻو، ميرپورخاص ۽ شهيد بينظيرآباد** پاران سيڪنڊري ڪلاس لاء درسي ڪتاب طور منظور ٿيل.

اسڪول ايجوڪيشن اينڊ لٽريسي ڊپارٽمينٽ حڪومت سنڌ کان

نوٽيفڪيشن نمبر No.SO(C)SELD/STBB-18/2021 موجب منظور شده.

نگران اعليٰ

پرويز احمد بلوچ

چيئرمين سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

خواجہ آصف مشتاق

پروجيڪٽ ڊائريڪٽر

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوائٽي (آفاق)

يوسف احمد شيخ

چيف سپروائيزر

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

شاهد وارثي

مئنيجنگ ڊائريڪٽر

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوائٽي (آفاق)

رفيع مصطفيٰ

پروجيڪٽ مئنيجر

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوائٽي (آفاق)

ماريوش ڪافي

سپروائيزر

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

ليکڪ:

☆ مسٽر آفتاب علي

☆ مسٽر سيد آفاق احمد

☆ پروفيسر محمد فاروق خان

☆ مسٽر اويس سراج

☆ مس اقرار مغل

☆ مسٽر عمر خان

سنڌيڪار

☆ مسٽر نذير احمد ميمڻ

☆ مسز خالد ميمڻ

☆ سيد منير احمد شاه

تڪنيڪي معاون

☆ مسٽر محمد ارسلان شفاعت گدي

نظر ثاني:

☆ مسٽر عبدال سليم ميمڻ

☆ مسٽر محمد صغير شيخ

☆ مسٽر محمد وسيم

☆ مسٽر افضل احمد

☆ پروفيسر محمد فاروق خان

☆ مسٽر اعجاز علي سبهيپوٽو

☆ مسٽر نذير احمد ميمڻ

☆ مسٽر محمد ياسر نصاري

☆ مسٽر آفتاب علي

ايڊيٽر

☆ مسٽر مير سرفراز خليل ساند

چيپنڊڙ: چيپنڊڙ: پير ادائز پريس (پرائيوٽ) لميٽڊ ڪراچي

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ هڪ اهڙو تعليمي ادارو آهي، جنهن جو ڪم درسي ڪتابن جي تياري ۽ اشاعت ڪرڻ آهي. هن جو اهم مقصد اهڙن درسي ڪتابن جي تياري ۽ فراهمي آهي، جيڪي نئين نسل کي ڄاڻ، هنر سان گڏوگڏ منجهن اهڙي صلاحيت پيدا ڪن، جنهن جي ذريعي اهي آفاقي نظرين، پائيداري، بزرگن جي ڪارنامن، پنهنجي ثقافتي ورثي، روايت جي حفاظت ڪندي، نئين دور جي سائنسي، ٽيڪنيڪي ۽ سماجي تقاضائن کي پورو ڪري ڪامياب زندگي گذاري سگهن.

نون ڇاپن ۾، تعارفي مضامون معلوماتي باڪس، خلاصا ۽ مختلف وسيع مشقن کي شامل ڪيو ويو آهي. جيڪو آئون سمجهان ٿو ته نه صرف دلچسپي پيدا ڪندا پر تمام گهڻي حد تائين ڪتاب فائديمند ثابت ٿيندو.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ هن ڪتاب جي اشاعت لاءِ تمام تر تڪليفن محدود وسائل جي باوجود ڪتاب تي خاصو خرچ ڪيو آهي.

ڪوبه ڪتاب يقيناً حرف آخر نه هوندو آهي، ۽ ان ۾ هر وقت بهتري جي گنجائش هوندي آهي، جڏهن ته ليکڪ، پنهنجي پوري صلاحيتن کي استعمال ڪندي مڪمل تصـوـرن ۽ وضاحتن کي چٽي نموني پيش ڪيو آهي. هن ۾ اجابه ڪيتريون ئي خاميون ٿي سگهن ٿيون تنهن لاءِ ماهر استادن ۽ شاگردن کي عرض رکجي ٿو ته اڻپوري لکائي، يا اڻپوريون شڪلين بابت نشاندهي ڪن ۽ پنهنجيون تجويزون ۽ رايائين ته جيئن ڪتابن کي ايندڙ ڇاپي ۾ سڌاريو وڃي. آخر ۾ آئون انسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق)، اسان جي ماهر ليکڪن، ايڊيٽرن ۽ بورڊ جي ماهر عملي جو سندن تعليم جي لاءِ اڻ ٿڪ محنت ۽ ڪوششن لاءِ شڪر گذار آهيان.

چيئرمين

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ، ڄامشورو

فهرست

صفحو	عنوان	يونٽ
01 - 26	حقيقي ۽ منجهيل عدد	يونٽ 1
27 - 53	لاگرثم	يونٽ 2
54 - 81	آلجبري اظهار ۽ فارمولا	يونٽ 3
82 - 106	جزالھڻ	يونٽ 4
107 - 125	آلجبري هيرا ڦيري	يونٽ 5
126 - 139	هڪ درجي مساواتون ۽ غير مساواتون	يونٽ 6
140 - 163	سڌي ليڪ ۾ گراف ۽ ان جا استعمال	يونٽ 7
164 - 183	ٻه درجي مساوات	يونٽ 8
184 - 194	يڪسان ٽڪنڊ	يونٽ 9
195 - 206	پورو چوٽ چوڪنڊا ۽ ٽڪنڊا	يونٽ 10
207 - 217	ليڪ جا اڌ ڪنڊڙ ۽ ڪنڊ جا اڌ ڪنڊڙ	يونٽ 11
218 - 226	ٽڪنڊن جا پاسا ۽ ڪنڊون	يونٽ 12
227 - 238	عملي جاميٽري (ٽڪنڊن) جي	يونٽ 13
239 - 246	ايراضي سان تعلق رکندڙ سڌيان	يونٽ 14
247 - 254	ٽنڪنڊي جي پاسي جو واڌارو	يونٽ 15
255 - 271	تجزياتي/محددي جاميٽري جو تعارف	يونٽ 16
272 - 312	جوابات	

KARACHIEDU.COM

حقيقي ۽ منجهيل عدد

Real and Complex Numbers

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ ناطق ۽ غير ناطق عددين جي ميلاپ واري سيٽ کي حقيقي عددين جي سيٽ طور ياد ڪندا.
 - ◆ حقيقي عددين کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪندا.
 - ◆ ختم ٿيندڙ، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهاڻي عددين کي عددي ليڪ تي ڏيکاريندا.
 - ◆ ناطق ۽ غير ناطق عددين جي ڏهاڻي واري سڃاڻپ ۾ فرق ڪندا.
 - ◆ حقيقي عددين جي خاصيتن جي ڄاڻ حاصل ڪندا.
 - ◆ مول ۽ مولن جي پايي جي سڃاڻپ ڪري سگهندا.
 - ◆ مول ۽ سگهه نما، صورت جي اظهار ۾ فرق ڪري سگهندا.
 - ◆ مولن جي صورت واري اظهار کي سگهه نما اظهار ۾ بدلائي سگهندا ۽ ان جي برعڪس پڻ.
 - ◆ بنياد، سگهه ۽ سگهه جي ملهه کي پڻ وري دهرائيندا.
 - ◆ سگهن جا قاعدا استعمال ڪري حقيقي سگهه نما اظهارن کي سادي صورت ۾ آڻي سگهندا.
 - ◆ وضاحت سان منجهيل عددين (Complex numbers) z جي اظهار جي صورت ۾ وصف بيان ڪندا جيئن (a, b) يا $z = a + ib$ ، جڏهن ته a حقيقي ۽ b تصوراتي حصو آهي ۽ هتي $i = \sqrt{-1}$ آهي.
 - ◆ $z = a + ib$ يا $z = (a, b)$ ۾ a کي حقيقي ۽ b کي تصوراتي حصي طور سڃاڻپ ڪندا.
 - ◆ منجهيل عدد (Complex number) جي گردان (Conjugate) جي تعريف ڪري سگهندا.
- $$\bar{z} = \overline{a + ib} = a - ib = (a, -b)$$
- ◆ منجهيل عددين (Complex Numbers) جي برابري واري صورت بابت ڄاڻ
 - ◆ منجهيل عددين (Complex numbers) جي بنيادي نشانيون (جوڙ، ڪٽ، ضرب ۽ ونڊ) جو استعمال ڪري سگهندا.

تعارف:

گذريل ڪلاس ۾ اسان عددين جا ڪيترائي قسم سکي آيا آهيون، جهڙوڪ قدرتي عدد (عددن جي گروپ) سڃا عدد، مڪمل يا پورا عدد، ناطق عدد وغيره. هي سڀئي عدد حقيقي عددن جي سيٽ ۾ شامل آهن. ان ڪري حقيقي عددن جي درجا بندي هيٺ ڏجي ٿي.



1.1 حقيقي عدد


1.1.1 ناطق ۽ غير ناطق عددن جي ميلاپ واري سيٽ کي حقيقي عددن جي سيٽ طور ياد ڪندا.

حقيقي عددن جو سيٽ ناطق ۽ غير ناطق عددن جو ميلاپ آهي يعني $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ اسان اڳيئي ناطق ۽ غير ناطق عددن بابت سکي چڪا آهيون. حقيقي عددن جون ڪيتريون خاصيتون آهن جيئن توهان ناطق عددن جون خاصيتون سکيون آهن.

1.1.2 حقيقي عددن کي عددي ليک تي ظاهر ڪرڻ

گذريل ڪلاس ۾ اسان پورن عددن، سڄن عددن ۽ انهن کي عددي ليک تي ظاهر ڪرڻ جو مطالعو ڪري آيا آهيون. ساڳي طرح اسين حقيقي عددن کي به عددي ليک تي ظاهر ڪري سگهون ٿا. اچو ته هيٺيان مثال ڏسون:

مثال 01 $\frac{1}{2}$ ۽ $-\frac{1}{2}$ کي عددي ليک l تي ظاهر ڪريو.



حل:

اهڙي طرح مٿين شڪل ۾ ٽيڪو P_1 ۽ P_2 کي ظاهر ڪري ٿو.

مثال 02 -1.5 ۽ $1\frac{1}{5}$ کي عددي ليک تي ظاهر ڪريو.




حل:

ساڳي طرح سان مٿين شڪل ۾ نقطو P_1 ظاهر ڪري ٿو -1.5 کي ۽ P_2 ظاهر ڪري ٿو $1\frac{1}{5}$ کي.

1.1.3 ختم ٿيندڙ ۽ نه ختم ٿيندڙ، ورجندڙ ڏهاڙي واري عدد کي عددي ليک تي ڏيکارڻ.

ڪنهن به ختم ٿيندڙ، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهاڙي واري عدد کي، عددي ليک تي ظاهر ڪرڻ لاءِ جيئن ته سڀئي نقطا ناطق عدد $\frac{a}{b}$ سان لاڳاپيل آهن. جنهن ۾ a, b واڌو سڄا عدد آهن، اسان هر هڪ ايڪي ڊيگهه کي b هڪجيترن حصن ۾ ورهائيندا سين پوءِ a^{th} نقطو ورهاست جو اصل (Origin) جي ساڄي طرف $\frac{a}{b}$ کي ظاهر ڪندو ۽ کاٻي طرف $-\frac{a}{b}$ کي ظاهر ڪندو.




مثال 01 هيٺيان ختم ٿيندڙ ڏهاڻي اڻپور عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو.


i. $\frac{3}{2}$

ii. $\frac{5}{4}$

i. $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$



ii. $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$




مثال 02 هيٺيان نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهاڻي اڻپور عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو.


i. $\frac{11}{6}$

ii. $-\frac{5}{3}$

i. $\frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}$



iii. $-\frac{5}{3} = -1\frac{2}{3}$



1.1.4 ناطق ۽ غير ناطق عددن جي ڏهائي واري سڃاڻپ ۾ فرق ڪندا

جڏهن اسين ناطق عدد کي ڏهائي جي صورت ۾ ظاهر ڪندا آهيون ته ٻن قسمن جا ڏهائي اڻپور ممڪن آهن جن ۾ ختم ٿيندڙ ۽ نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي اڻپور آهن جڏهن ته غير ناطق عدد نه ختم ٿيندڙ نه ورجندڙ ڏهائي اڻپور جي صورت ۾ ظاهر ڪبا آهن. اسان انهن کي هيٺ جدول ۾ ظاهر ڪريون ٿا.

نمبر شمار	عدد	بيان ڪرڻ
1.	$\frac{1}{2} = 0.5$	ختم ٿيندڙ ڏهائي اڻپور
2.	$\frac{1}{4} = 0.25$	ختم ٿيندڙ ڏهائي اڻپور
3.	$\frac{1}{3} = 0.333...$	نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي اڻپور
4.	$\frac{9}{11} = 0.818181...$	نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي اڻپور
5.	$\sqrt{2} = 1.414213...$	نه ختم ٿيندڙ نه ورجندڙ ڏهائي اڻپور
6.	$\sqrt{3} = 1.73205...$	نه ختم ٿيندڙ نه ورجندڙ ڏهائي اڻپور


مشق 1.1

1. هيٺين عددن مان ناطق ۽ غير ناطق عددن جي سڃاڻپ ڪريو ۽ هر هڪ کي الڳ ڪالمر ۾ لکو.

- (i) $\frac{1}{5}$ (ii) $\frac{\sqrt{2}}{8}$ (iii) $\frac{5}{\sqrt{6}}$ (iv) $\frac{2}{8}$ (v) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (vi) $\sqrt{8}$
 (vii) e (viii) π (ix) $\sqrt{5}$ (x) $\frac{22}{3}$ (xi) $\frac{1}{\pi}$ (xii) $\frac{11}{12}$

2. هيٺين کي ڏهائي اڻپور ۾ تبديل ڪريو. انهن جي ختم ٿيندڙ ۽ نه ختم ٿيندڙ جي پڻ نشاندهي ڪريو.

- (i) $\frac{5}{8}$ (ii) $\frac{4}{18}$ (iii) $\frac{1}{15}$ (iv) $\frac{49}{8}$ (v) $\frac{207}{15}$ (vi) $\frac{50}{76}$



3. هيٺيان ناطق عدد، عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو.

(i) $\frac{8}{10}$ (ii) $-\frac{8}{10}$ (iii) $1\frac{1}{4}$ (iv) $-1\frac{1}{4}$ (v) $\frac{2}{3}$ (vi) $-\frac{2}{3}$

4. ڇا توهان 1 ۽ 2 جي وچ ۾ سڀني ناطق عددن جي فهرست ٺاهي سگهو ٿا؟

5. سبب ٻڌايو ته ڇو (π) هڪ غيرناطق آهي.

6. صحيح بيان تي ($\checkmark$) ٽڪ جو نشان لڳايو.

(i) $\frac{5}{7}$ غيرناطق عدد جو مثال آهي.

(ii) π هڪ غيرناطق عدد آهي.

(iii) $0.31591\dots$ نه ختم ٿيندڙ ۽ نه ورجندڙ ڏهائي اڻپور آهي.

(iv) $0.12\bar{3}$ هڪ ورجندڙ ڏهائي اڻپور آهي.

(v) $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 0 ۽ 1 جي وچ ۾ هوندا آهن.

(vi) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ناطق عدد جو هڪ مثال آهي.

1.2 حقيقي عددن جون خاصيتون

حقيقي عددن ۾ جوڙ ۽ ضرب جي لحاظ کان خاصيتون موجود آهن. حقيقي عددن لاءِ a, b جي جوڙ اپت $a + b$ ۽ ضرب اپت $a \cdot b$ يا $a \times b$ يا صرف ab آهي.

1.2.1 حقيقي عددن جي خاصيتن جي ڄاڻ رکڻ

(a) جوڙ جي لحاظ کان حقيقي عددن جون خاصيتون

(i) بندش واري خاصيت (Closure property)

ٻن حقيقي عددن جي جوڙ اپت، وري هڪ حقيقي عدد ٿيندو.

$\forall a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow a + b \in \mathbb{R}$ جوڙ جي لحاظ کان بندش جي خاصيت آهي.

مثال:

(i) $5, 7 \in \mathbb{R} \Rightarrow 5 + 7 = 12 \in \mathbb{R}$

(ii) $\frac{4}{5}, \frac{3}{4} \in \mathbb{R} \Rightarrow \frac{4}{5} + \frac{3}{4} = \frac{16 + 15}{20} = \frac{31}{20} \in \mathbb{R}$

(ii) مٽاواري خاصيت (Commutative property)

ڪن به ٻن حقيقي عددين a ۽ b لاءِ

$$a+b=b+a$$

کي جوڙ جي لحاظ کان مٽا واري خاصيت چئبو آهي.

مثال: (i) $3+7=7+3$ (ii) $\sqrt{5}+\sqrt{6}=\sqrt{6}+\sqrt{5}$

(iii) سنگت واري خاصيت (Associative property)

ڪن به ٽن حقيقي عددين a, b ۽ c لاءِ

$$(a+b)+c=a+(b+c)$$

کي جوڙ جي لحاظ کان سنگت واري خاصيت چئبو آهي.

مثال: $(4+5)+6=4+(5+6)$

(iv) جوڙ لاءِ ذاتي عنصر (Additive inverse)

هڪ عدد ٻڙي 0 جنهنجو تعلق حقيقي عدد سان آهي $0 \in \mathbb{R}$ اهڙي طرح $a+0=a=0+a, \forall a \in \mathbb{R}$

"0" کي جوڙ لاءِ ذاتي عنصر چئبو آهي.

مثال: $3+0=3=0+3, \frac{7}{8}+0=\frac{7}{8}=0+\frac{7}{8}$ وغيره

(v) جمعي ابتڙ (Additive inverse)

هر هڪ حقيقي عدد a لاءِ $-a$ حقيقي عدد موجود آهي اهڙي طرح جو $a+(-a)=0=(-a)+a$

تنهن ڪري $-a$ ۽ a هڪ ٻئي جا جمعي ابتڙ آهن.

مثال: $6+(-6)=0=(-6)+6=0$

هتي 6 ۽ -6 هڪ ٻئي جا جمعي ابتڙ آهن.


(b) ضرب جي لحاظ کان حقيقي عددين جون خاصيتون

(i) بندش واري خاصيت (Closure property)

ڪن به ٻن حقيقي عددين a ۽ b جي ضرب اپت وري به هڪ حقيقي عدد آهي.

$$a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow ab \in \mathbb{R}$$

ضرب جي لحاظ کان بندش واري خاصيت سڏبو آهي.



مثال: (i) $5, 7 \in \mathbb{R} \Rightarrow (5)(7) = 35 \in \mathbb{R}$ (ii) $\frac{3}{5}, \frac{6}{7} \in \mathbb{R} \Rightarrow \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{6}{7}\right) = \frac{18}{35} \in \mathbb{R}$

(ii) متاواري خاصيت (Commutative property)

ڪن به ٻن حقيقي عددن a ۽ b لاءِ

$ab = ba$ کي جوڙ جي لحاظ کان متاواري خاصيت چئبو آهي.

مثال: (i) $\sqrt{3}, \sqrt{5} \in \mathbb{R} \Rightarrow (\sqrt{3})(\sqrt{5}) = (\sqrt{5})(\sqrt{3})$

(ii) $3, 4 \in \mathbb{R} \Rightarrow 3 \times 4 = 4 \times 3$ etc.

(iii) سنگت واري خاصيت (Associative property)

ڪن به ٽن حقيقي عدد a, b, c لاءِ

$(ab)c = a(bc)$ کي ضرب جي لحاظ کان سنگت واري خاصيت چئبو آهي.

مثال: (i) $4, 5, 6 \in \mathbb{R}$, ته پوءِ $(4 \times 5) \times 6 = 4 \times (5 \times 6)$,

(ii) وغيره، $\frac{2}{5}, 4, \sqrt{3} \in \mathbb{R}$, ته پوءِ $(\frac{2}{5} \times 4) \times \sqrt{3} = \frac{2}{5} \times (4 \times \sqrt{3})$,

(iv) ضرب لاءِ ذاتي عنصر (Multiplicative identity)

هر هڪ حقيقي عدد a لاءِ هڪ رڪن 1 موجود آهي جيڪو حقيقي عدد جي سيٽ سان

تعلق رکي ٿو $1 \in \mathbb{R}$.

$1, a \times 1 = 1 \times a = a$ کي ضرب لاءِ ذاتي عنصر چئبو آهي.

مثال: $\frac{3}{5} \times 1 = 1 \times \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$, $1 \times 3 = 3 \times 1 = 3$ وغيره.

(v) ضربِي ابتڙ (Multiplicative inverse)

هر هڪ حقيقي عدد a لاءِ (a غير ٻڙي عدد آهي)، هڪ رڪن $\frac{1}{a}$ يا $a^{-1} \in \mathbb{R}$ موجود آهي جنهن

جو تعلق حقيقي عدد سان آهي.

$a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1$ تنهنڪري a ۽ $\frac{1}{a}$ هڪٻئي جا ضربِي ابتڙ آهن.

مثال: $3 \times \frac{1}{3} = 1 = \frac{1}{3} \times 3$

هتي 3 ۽ $\frac{1}{3}$ هڪٻئي جا ضربِي ابتڙ آهن.

(c) ضرب جي جوڙ تي ورهائجڻ واري خاصيت
(Distributive property of Multiplication over Addition)

- (i) $a(b+c) = ab + ac$ ڪن به ٽن حقيقي عدد a, b, c لاءِ
ان کي ضرب جي جوڙ تي ورهائجڻ واري خاصيت چئبو آهي (ڪاٻي کان ورهاست واري خاصيت)
- (ii) $(a+b)c = ac + bc$
ان کي ضرب جي جوڙ تي ورهائجڻ واري خاصيت چئبو آهي (ساڄي کان ورهاست واري خاصيت)
- مثال: $3(5+7) = 3 \times 5 + 3 \times 7$ (ڪاٻي کان ورهاست واري خاصيت)
 $(3+7)2 = 3 \times 2 + 7 \times 2$ (ساڄي کان ورهاست واري خاصيت)

نوٽ: $a(b-c) = ab - ac$ ضرب جي ڪٽ تي ورهائجڻ واري خاصيت آهي.

(d) حقيقي عددين جي برابري واريون خاصيتون

هيٺيون حقيقي عددين تي برابر واريون خاصيتون آهن.

(i) عڪسي خاصيت (Reflective property)

جيڪڏهن $a \in \mathbb{R}$ ته پوءِ $a = a$

(ii) هم شڪلي خاصيت (Symmetric property)

جيڪڏهن a, b حقيقي عدد آهن ته پوءِ $a = b \Leftrightarrow b = a$

(iii) متعددي خاصيت (Transitive property)

جيڪڏهن a, b, c حقيقي عدد آهن ته پوءِ $a = b$ ۽ $b = c \Leftrightarrow a = c$

(iv) جوڙ واري خاصيت (Additive property)

جيڪڏهن a, b, c حقيقي عدد آهن ته پوءِ $a + c = b + c$ ته $a = b$

(v) ضرب جي خاصيت (Multiplicative property)


جيڪڏهن a, b, c حقيقي عدد آهن اهڙي طرح جيئن $a = b$ ته پوءِ $ac = bc$

(vi) ڪاٽ واري خاصيت جوڙ جي لاءِ (Cancellation property for Addition)

جيڪڏهن a, b, c حقيقي عدد آهن ۽ جيڪڏهن $a + c = b + c$ ته پوءِ $a = b$

(vii) ڪاٽ واري خاصيت ضرب جي لاءِ (Cancellation property for Multiplication)

جيڪڏهن a, b, c حقيقي عدد آهن ۽ $c \neq 0$ جيڪڏهن $ac = bc$ ته پوءِ $a = b$



(e) حقيقي عددن ۾ اڻ برابري واري تعلق جون خاصيتون

(Properties of Inequalities of Real Numbers)

هينين حقيقي عددن ۾ اڻ برابري واري تعلق جون خاصيتون آهن.

(i) ترخي خاصيت (Trichotomy property)

جيڪڏهن $a, b \in \mathbb{R}$ ته پوءِ $a = b$ يا $a < b$ يا $a > b$

(ii) متعدي خاصيت (Transitive property)

جيڪڏهن $a, b, c \in \mathbb{R}$ ته پوءِ

$$a > b \text{ ۽ } b > c \Rightarrow a > c \quad (b) \quad a < b \text{ ۽ } b < c \Rightarrow a < c \quad (a)$$

(iii) جوڙ واري خاصيت (Additive property)

جيڪڏهن $a, b, c \in \mathbb{R}$ ته پوءِ

$$a > b \Rightarrow a + c > b + c \quad (b) \quad a < b \Rightarrow a + c < b + c \quad (a)$$

(iv) ضربِي خاصيت (Multiplicative property)

جيڪڏهن $a, b, c \in \mathbb{R}$ ۽ $c > 0$ ته پوءِ

$$a < b \Rightarrow ac < bc \quad (b) \quad a > b \Rightarrow ac > bc \quad (a)$$

ساڳي طرح جيڪڏهن $c < 0$ ته پوءِ

$$a < b \Rightarrow ac > bc \quad (b) \quad a > b \Rightarrow ac < bc \quad (a)$$

(v) ابتر خاصيت (Reciprocativity property)

جيڪڏهن $a, b \in \mathbb{R}$ ۽ $a, b \neq 0$ جون ساڳيون نشانيون هجن ته پوءِ

$$a > b \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b} \text{ ۽ } \frac{1}{a} > \frac{1}{b} \Rightarrow a < b \quad (b) \quad a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b} \text{ ۽ } \frac{1}{a} < \frac{1}{b} \Rightarrow a > b \quad (a)$$

(vi) ڪاٽ واري خاصيت (Cancellation property)

جيڪڏهن $a, b, c \in \mathbb{R}$ ته پوءِ

$$a + c > b + c \Rightarrow a > b \quad (a)$$

$$a + c < b + c \Rightarrow a < b \quad (b)$$

$$\text{ساڳي طرح } ac > bc \Rightarrow a > b \text{ ۽ } c > 0 \quad (c)$$

$$ac < bc \Rightarrow a < b \text{ ۽ } c > 0 \quad (d)$$

مشق 1.2

1. هيٺين ۾ حقيقي عددن جي خاصيتن جي سڃاڻپ ڪريو.

$$(i) \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{2}$$

$$(ii) \frac{4}{3} + \left(1\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{4}{3} + 1\frac{1}{3}\right) + \frac{2}{3}$$

$$(iii) 9 \times \left(\frac{10}{9} + \frac{20}{9}\right) = \left(9 \times \frac{10}{9}\right) + \left(9 \times \frac{20}{9}\right)$$

$$(iv) \left(\frac{4}{5} + \frac{5}{7}\right) \times \frac{7}{8} = \left(\frac{4}{5} \times \frac{7}{8}\right) + \left(\frac{5}{7} \times \frac{7}{8}\right)$$

$$(v) \left(\frac{7}{5} - \frac{3}{5}\right) \times \frac{10}{15} = \left(\frac{7}{5} \times \frac{10}{15}\right) - \left(\frac{3}{5} \times \frac{10}{15}\right)$$

$$(vi) \frac{d}{e} \times \frac{e}{f} = \frac{e}{f} \times \frac{d}{e}$$

$$(vii) 11 \times (15 \times 21) = (11 \times 15) \times 21$$

$$(viii) \frac{2}{11} \times \frac{11}{2} = \frac{11}{2} \times \frac{2}{11} = 1$$

$$(ix) \left(\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{3}{5}\right) = \left(-\frac{3}{5}\right) + \left(\frac{3}{5}\right) = 0$$

$$(x) \left(\frac{a}{b}\right) \times \left(\frac{b}{a}\right) = \left(\frac{b}{a}\right) \times \left(\frac{a}{b}\right) = 1$$

$$(xi) \frac{15}{10} \times \left(\frac{8}{5} - \frac{4}{10}\right) = \left(\frac{15}{10} \times \frac{8}{5}\right) - \left(\frac{15}{10} \times \frac{4}{10}\right)$$

$$(xii) \frac{\sqrt{2}}{3} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{3} = 1$$

2. هيٺين حقيقي عددن کي مڪمل درست ڪرڻ لاءِ درست حقيقي عددن سان خال ڀريو.

$$(i) \frac{\sqrt{2}}{5} + \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\square}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}}{5}$$

$$(ii) \frac{7}{10} + \left(\frac{70}{\square} + \frac{16}{33}\right) = \frac{7}{\square} + \left(\frac{\square}{10} + \frac{16}{\square}\right)$$

$$(iii) \frac{99}{50} \times \frac{50}{99} = \square$$

$$(iv) \left(\frac{59}{95}\right) \times \left(\frac{95}{59}\right) = \square$$

$$(v) (-21) + (\square) = 0$$

$$(vi) \frac{5}{8} \times \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{7}\right) = \left(\frac{\square}{\square} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{5}{8} \times \frac{\square}{\square}\right)$$

3. هيٺين خاصيتن کي درست/صحيح ڪرڻ لاءِ خال ڀريو.


$$(i) 5 < 8 \text{ ۽ } 8 < 10 \Rightarrow \underline{\quad} < \underline{\quad}$$

$$(ii) 10 > 8 \text{ ۽ } 8 > 5 \Rightarrow \underline{\quad} < \underline{\quad}$$

$$(iii) 3 < 6 \Rightarrow 3 + 9 < \underline{\quad}$$

$$(iv) 4 < 6 \Rightarrow 4 + 8 < \underline{\quad}$$

$$(v) 8 > 6 \Rightarrow 6 + 8 > \underline{\quad}$$



4. هيٺيان خال ڀريو جيڪي خاصيتن کي صحيح/درست ڪن.

- (i) $5 < 7 \Rightarrow 5 \times 12 < \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}$
(ii) $7 > 5 \Rightarrow 7 \times 12 > \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}$
(iii) $6 > 4 \Rightarrow 6 \times (-7) \underline{\hspace{1cm}} 4 \times (-7)$
(iv) $2 < 8 \Rightarrow 2 \times (-4) \underline{\hspace{1cm}} 8 \times (-4)$

5. هيٺين حقيقي عددن جا جمعي ۽ ضربتي ابتڙ معلوم ڪريو.

- (i) 3 (ii) -7 (iii) 0.3 (iv) $\frac{-\sqrt{5}}{5}$ (v) $\frac{9}{\sqrt{12}}$ (vi) 0

1.3 مول ۽ مول جو پاڻو

1.3.1 مول ۽ مول جي پايي جي سڃاڻپ ڪرايو

سمجهو ته $n \in \mathbb{Z}^+$ (واڌو سڄن عددن جو سيٽ) ۽ $n > 1$

۽ فرض ڪريو ته $a \in \mathbb{R}$ ، پوءِ ڪنهن به واڌو حقيقي عدد x لاءِ

$$(a \text{ جو ٻيو مول}) \quad x^2 = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x = \sqrt{a}$$

$$(a \text{ جو ٽيون مول}) \quad x^3 = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{3}} \Rightarrow x = \sqrt[3]{a} \quad \text{ساڳي طرح}$$

$$(a \text{ جو چوٿون مول}) \quad x^4 = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{4}} \Rightarrow x = \sqrt[4]{a}$$

$$(a \text{ جو } n \text{ وون مول}) \quad x^n = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{n}} \Rightarrow x = \sqrt[n]{a} \quad \text{عام طرح}$$

$\sqrt[n]{a}$ ۾ a کي مول جو پاڻو ۽ n کي مول جي ڏسڻي چئبو آهي.

$\sqrt{\hspace{1cm}}$ کي مول جي نشاني سڏبو آهي.

1.3.2 مول ۽ سگهه نما صورت جي اظهار ۾ فرق ڪريو.

جيئن ته اسان پڙهي آيا آهيون ته $x = \sqrt[n]{a}$ هڪ مول واري صورت آهي.

ساڳي طرح $a^{\frac{1}{3}}, a^{\frac{2}{3}}, a^{\frac{3}{2}}, a^{\frac{1}{n}}, a^{\frac{m}{n}}$ ڪجهه سگهه نما صورت جا مثال آهن.

ياد ڪريو ته

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

هتي $\sqrt[n]{a}$ هڪ مولي صورت آهي $a^{\frac{1}{n}}$ سگهه واري صورت آهي.

هتي ٻيو مول جون ڪجهه خاصيتون ڏجن ٿيون.

$\forall a, b \in \mathbb{R}^+ \wedge m, n \in \mathbb{Z}$ ته پوءِ

(i) $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

(ii) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

(iii) $\frac{a}{\sqrt{a}} = \sqrt{a}$

(iv) $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = \sqrt{a^2} = a$

(v) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = 1$

(vi) $m\sqrt{a} \pm n\sqrt{a} = (m \pm n)\sqrt{a}$

(vii) $\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^{-n}} = \sqrt{\left(\frac{b}{a}\right)^n}, a, b \neq 0$

ساڳي طرح

(i) $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

(ii) $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

(iii) $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

(iv) $\sqrt[mn]{a^n} = a^{\frac{n}{nm}} = a^{\frac{1}{m}}$

(v) $\sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{a^{\frac{1}{n}}} = \sqrt[mn]{a} = a^{\frac{1}{mn}}$

(vi) $\sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n^2]{a} = a^{\frac{1}{n^2}}$


(vii) $\sqrt[n]{a^n} = a$

(viii) $\frac{\sqrt[n]{a^n}}{\sqrt[n]{a^n}} = 1$

1.3.3 مولي صورت ۾ ڏنل اظهار کي سگهه واري صورت ۾ بدلائڻ ۽ ان جي برعڪس

جڏهن اسان مول ۽ سگهن تي مشتمل اظهارن کي سادي صورت ۾ آڻيندا آهي ته ان لاءِ

مول ۽ سگهه واريون خاصيتون تمام ڪارگر آهن.



هينين مولي اظهارن کي سگھ نما اظهارن ۾ بدلايو.

مثال 01

(i) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (ii) $\sqrt[3]{18}$ (iii) $\sqrt[5]{\frac{5}{7}}$ (iv) $\sqrt[9]{\left(\frac{x}{y}\right)^2}$ (v) $\sqrt[4]{(ab)^3}$

(i) $\sqrt{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$ (ii) $\sqrt[3]{18} = (18)^{\frac{1}{3}}$ (iii) $\sqrt[5]{\frac{5}{7}} = \left(\frac{5}{7}\right)^{\frac{1}{5}}$
 (iv) $\sqrt[9]{\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{2}{9}}$ (v) $\sqrt[4]{(ab)^3} = (ab)^{\frac{3}{4}}$

هينين سگھ نما اظهارن کي مولي اظهارن ۾ بدلايو.

مثال 02

(i) $\left(\frac{5}{7}\right)^{\frac{1}{3}}$ (ii) $(12)^{\frac{n}{2}}$ (iii) $(-7)^{\frac{3}{4}}$ (iv) $\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{2}{5}}$ (v) $\left(-\frac{x}{y}\right)^{\frac{m}{n}}$

(i) $\left(\frac{5}{7}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{5}{7}}$ (ii) $(12)^{\frac{n}{2}} = \sqrt{(12)^n}$ (iii) $(-7)^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{(-7)^3}$
 (iv) $\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{\left(\frac{y}{x}\right)^2} = \sqrt[5]{\left(\frac{x}{y}\right)^{-2}}$ (v) $\left(-\frac{x}{y}\right)^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{\left(-\frac{x}{y}\right)^m}$

مشق 1.3

هينين جو بنياد ۽ سگھ نما لکو.

(i) 3^4 (ii) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ (iii) $(-30)^{20}$

هينين ۾ مول جو پايو ۽ مول جي ڏسڻي جي سڃاڻپ ڪريو.

(i) $\sqrt[3]{5}$ (ii) $\sqrt[4]{\frac{x}{y}}$ (iii) $\sqrt[5]{x^2yz}$

3. هيٺين کي سگه واري نموني ۾ تبديل ڪريو.

$$\begin{array}{lllll} \text{(i)} \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)} & \text{(ii)} \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^5} & \text{(iii)} \sqrt[3]{\left(\frac{y}{x}\right)^{-5}} & \text{(iv)} \sqrt[3]{(yz)^7} & \text{(v)} \sqrt[2]{27} \\ \text{(vi)} \sqrt[3]{(-64)^2} & \text{(vii)} \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^m} & \text{(viii)} \sqrt[5]{(xy)^3} & \text{(ix)} \sqrt[3]{\sqrt{\frac{4}{3}}} \end{array}$$

4. هيٺين کي مول واري نموني ۾ تبديل ڪريو.

$$\begin{array}{llll} \text{(i)} (5^3)^{\frac{1}{7}} & \text{(ii)} (ab^{-2})^{\frac{1}{3}} & \text{(iii)} \left[\left(\frac{5}{7}\right)^3\right]^{\frac{5}{7}} & \text{(iv)} \left(\frac{b}{a}\right)^{-\frac{m}{2}} \\ \text{(v)} \left[\left(\frac{11}{13}\right)\left(\frac{12}{13}\right)\right]^{\frac{1}{5}} \end{array}$$

1.4 سگهن جا قاعدا

سگهن يا سگه نما جا قاعدا رياضي جي ڪيترن ئي حصن ۾ اهم آهن.

1.4.1 بنياد، سگه ۽ سگه جي مله جي ڏهرايو

سمجهو ته a^n سگهن واري صورت ۾ آهي. جنهن ۾ a 'بنياد' ۽ n 'سگه' يا سگه نما آهي جنهن کي a جي n وين سگه پڙهيو. a^n جو نتيجو، جڏهن $a \in \mathbb{R}$ آهي ته ان جو مله چئبو آهي.

1.4.2 سگهن جا قاعدا استعمال ڪري حقيقي سگه نما اظهارن کي سادي صورت ۾ بيان ڪرڻ.

هيٺيان سگهن جا قاعدا اظهارن کي سادي صورت ۾ آڻڻ لاءِ ڪارگر آهن.

(i) سگهن جي ضرب اپت جو قاعدا (Law of Product of Power)

$$(a) \text{ جيڪڏهن } a, b \in \mathbb{R} \text{ ۽ } x, y \in \mathbb{Z}^+ \text{ ته پوءِ } a^x \times a^y = a^{x+y} \text{ هيٺ ڪجهه مثال هن قاعدي مطابق ڏنل آهن.}$$

$$(a) a^2 \times a^3 = a^{2+3} = a^5 \quad (b) 3 \times 3^5 = 3^{1+5} = 3^6 = 729$$

(ii) سگه جي سگه جو قاعدا (Law of Power of Power)

$$\text{جيڪڏهن } a \in \mathbb{R} \text{ ۽ } x, y \in \mathbb{Z}^+ \text{ ته پوءِ } (a^x)^y = a^{xy} \text{ هيٺ ڪجهه مثال هن قاعدي مطابق ڏنل آهن.}$$

$$(a) (5^2)^4 = 5^{2 \times 4} = 5^8$$

$$(b) \left\{ \left(\frac{6}{11} \right)^4 \right\}^3 = \left(\frac{6}{11} \right)^{4 \times 3} = \left(\frac{6}{11} \right)^{12} \quad (c) \left\{ \left(-\frac{3}{4} \right)^3 \right\}^3 = \left(-\frac{3}{4} \right)^{3 \times 3} = \left(-\frac{3}{4} \right)^9 = -\left(\frac{3}{4} \right)^9$$

(iii) ضرب ايت جي سگھ جو قاعدو (Law of Power of a Product)

$$\forall a, b, \in \mathbb{R} \text{ ۽ } n \in \mathbb{Z}^+,$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \text{ ته پوءِ}$$

هيٺيان مثال هن قاعدي مطابق ڏنل آهن.

$$(a) (xy)^3 = x^3 y^3 \quad (b) \left\{ \left[\frac{8}{9} \right] \left[\frac{7}{11} \right] \right\}^3 = \left(\frac{8}{9} \right)^3 \left(\frac{7}{11} \right)^3$$

(iv) اڻپور جي سگھ جو قاعدو (Law of Power of a Quotient)

$$\forall a, b, \in \mathbb{R} \text{ ۽ } n \in \mathbb{Z}^+, \text{ ته پوءِ } \left(\frac{a}{b} \right)^n = \frac{a^n}{b^n} \text{ جڏهن } b \neq 0$$

$$(a) \left(\frac{5}{8} \right)^3 = \frac{5^3}{8^3} \quad (b) \left(\frac{f}{g} \right)^4 = \frac{f^4}{g^4}, g \neq 0 \text{ مثال هن قاعدي مطابق ڏنل آهن.}$$

(v) سگھن جي ونڊ ايت جو قاعدو (Law of quotient of Power)

جيڪڏهن $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$ ۽ $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ته پوءِ

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \text{ جيڪڏهن } m > n$$

$$= \frac{1}{a^{n-m}} \text{ جيڪڏهن } n > m$$

جيڪڏهن $m = n$ ته پوءِ

$$a^{m-n} = a^{m-m} = a^0 = 1$$

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{a^m}{a^m} = \frac{a^n}{a^n} = 1 \text{ ساڳي طرح}$$

هيٺيان مثال هن قاعدي مطابق ڏنل آهن.

$$(a) \frac{3^5}{3^2} = 3^{5-2} = 3^3 = 27$$

$$(b) \frac{7^3}{7^5} = \frac{1}{7^{5-3}} = \frac{1}{7^2} = \frac{1}{49}$$

ياد رکو ته:

$(-a)^n = a^n$ جيڪڏهن n هڪ ٻڌي سگھ آهي.

$(-a)^n = -a^n$ جيڪڏهن n هڪ اڪي سگھ آهي.

ياد رکو ته:

جيڪڏهن ڪنهن غير ٻڌي عدد جي سگھ ٻڌي آهي

ته ان جو ملهه 1 جي برابر ٿيندو. مثال طور $3^0 = 1$

مشق 1.4

1. سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $\frac{3^5}{3^2}$ (ii) $\frac{2^4 \cdot 5^3}{10^2}$ (iii) $\frac{(a+b)^2 \cdot (c+d)^3}{(a+b) \cdot (c+d)^2}$

2. سگه جا قاعدا استعمال ڪري سادي صورت ۾ آڻيو.

(i) $\left(\frac{1}{3}\right)^4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^5$ (ii) $\left(\frac{3}{4}\right)^5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2$ (iii) $\left(-\frac{4}{5}\right)^3 \times \left(-\frac{4}{5}\right)^5$
 (iv) $(-3 \times 5^2)^3$ (v) $[3 \times (-4)^2]^3$ (vi) $\left(-\frac{a}{bc}\right)^5 \times \left(-\frac{a}{bc}\right)^4$
 (vii) $\left(-\frac{c}{d}\right)^2 \left(-\frac{c}{d}\right)^3 \left(-\frac{c}{d}\right)^5$ (viii) $mn^2t^4n^3m^5t^7$ (ix) $a^2c^5b^2a^3c^3b^4a^4$
 (x) $10x^4y^6x^2z^2y^3$ (xi) $\frac{3}{5}r^3s^2r^7t^2s^2$ (xii) $-\left(-\frac{l}{m}\right)^4 \left(-\frac{l}{m}\right)^5 \left(-\frac{l}{m}\right)^3$

3. سگه جا قاعدا استعمال ڪري سادي صورت ۾ آڻيو.

(i) $(5^2)^3$ (ii) $\{(xy)^3\}^5$ (iii) $\{(-4)^2\}^5$ (iv) $\{(-3)^3(-4)^2\}^3$ (v) $\left(\frac{b^2}{5}\right)^3$
 (vi) $\left\{\left(-\frac{4}{9}\right)^2\right\}^3$ (vii) $\{(z^3)^2\}^4$ (viii) $\{(mm^2m^3m^4)^2\}^5$ (ix) $-[(-0.1)^2(-0.1)^3(-0.1)^4]^2$

1.5 منجهيل عدد (Complex numbers)

1.5.1 وضاحت سان منجهيل عددن (Complex numbers) جي اظهار جي صورت ۾ وصف پيال

ڪندا جيئن (a, b) يا $z = a + ib$ ، جڏهن ته a حقيقي ۽ b تصوراتي حصو آهي ۽ هتي $i = \sqrt{-1}$ آهي.

اسان کي خبر آهي ته حقيقي عدد جو چورس غيرڪاٽو آهي. ته پوءِ $x^2 + 1 = 0$ مساوات جو

حل $\mathbb{R}$ سان تعلق نٿو رکي. حقيقي عددن جي هن ناڪافي هجڻ کي قابو پائڻ لاءِ، رياضي دانن

هڪ نئون عدد تصوراتي ايڪو $\sqrt{-1}$ روشناس ڪرايو، جنهن کي لفظ i (iota) سان ظاهر ڪيو

ويو، جنهن کي $i^2 = -1$ جي خاصيت آهي. ظاهر آهي ته " i " حقيقي عدد نه آهي. اهو رياضي

هر هڪ نئون وجود آهي جيڪو اسان کي هر الجبري مساوات جي نموني $x^2 + a = 0$ جڏهن ته

$a > 0$ جو حل ڪرڻ جي قابل بنائي ٿو. عدد جهڙوڪ $\sqrt{-1} = i, \sqrt{-5} = \sqrt{5}i, \sqrt{-49} = 7i$ خالص

تصوراتي عدد آهن.

منجهيل (Complex) عددن جي وصف:

هڪ عدد جيڪو $a+ib$ جي نموني ۾ مليل هجي، جنهن ۾ a, b حقيقي عدد ۽ i هڪ تصوراتي ايڪو هجي ته اهڙي عدد کي منجهيل (Complex) عدد چئبو آهي ۽ ان کي z سان ظاهر ڪبو آهي. مثال طور $z=3+4i$ هڪ منجهيل (Complex) عدد آهي. منجهيل (Complex) عدد $a+ib$ کي ترتيب ڏنل جوڙي جي صورت (a, b) جهڙي طرح $5+8i=(5, 8)$ ۾ لکي سگهجي ٿو.

1.5.2 $z=a+ib$ ۾ a کي حقيقي ۽ b کي تصوراتي حصي طور سڃاڻپ ڪريو.

منجهيل (Complex) عدد $z=a+ib$ ۾ a حقيقي حصو آهي. منجهيل عدد جو b "تصوراتي حصو" آهي. منجهيل عدد جو حقيقي حصي کي $\text{Re}(z)$ سان ظاهر ڪبو آهي ۽ ان جي تصوراتي حصي کي $\text{Im}(z)$ سان ظاهر ڪبو آهي.

مثال 01 مليل منجهيل (Complex) عددن جي حقيقي ۽ تصوراتي حصن جي سڃاڻپ ڪريو.

$$z=3-2i$$

$$\text{Re}(z)=a=3 \text{ ۽ } \text{Im}(z)=b=-2$$

1.5.3 منجهيل (Complex) عدد جي گردان (Conjugate) جي تعريف لکو.

z جو گردان (Conjugate) کي $\bar{z}$ سان ظاهر ڪبو آهي. جيڪڏهن $z=a+ib$ ته پوءِ $\bar{z}=a-ib$ يا $z=(a, b)$ ته پوءِ $\bar{z}=(a, -b)$ ۽ جيڪڏهن $z=a-ib$ ته پوءِ $\bar{z}=a+ib$ يا $z=(a, -b)$ ته پوءِ $\bar{z}=(a, b)$ گردان (Conjugate) ۾ اسان صرف تصوراتي حصي جي نشاني تبديل ڪندا آهيون.

نوٽ: جيڪڏهن ڪو منجهيل (Complex) عدد z آهي ته $(\bar{\bar{z}})=z$

مثال هيٺين منجهيل (Complex) عددن جو گردان (Conjugate) معلوم ڪريو.

(i) $3+4i$

(ii) $\left(-\frac{4}{5}, \frac{5}{4}\right)$

حل:

(ii) فرض ڪريو ته $z_2 = \left(-\frac{4}{5}, -\frac{5}{4}\right)$

(i) فرض ڪريو ته $z_1 = 3+4i$

$$\bar{z}_2 = \left(-\frac{4}{5}, \frac{5}{4}\right)$$

ته پوءِ $\bar{z}_1 = 3-4i$

$$\bar{z}_2 = \left(-\frac{4}{5}, \frac{5}{4}\right)$$

$$\bar{z}_1 = 3-4i$$

1.5.4 منجهيل عددن (Complex Numbers) جي برابري واري صورت بابت ڄاڻ

ٻه منجهيل عدد (Complex Numbers) کي برابر چئبو جيڪڏهن انهن ۾ هڪ جهڙا حقيقي ۽ ٻه صورتاتي حصا هجن جيئن

$$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad a + ib = c + id, \text{ iff } a = c \text{ ۽ } b = d.$$

مثال 01 جيڪڏهن $x + 3yi = 16 + 9i$ ته x ۽ y معلوم ڪريو.

حل:

$$4x + 3yi = 16 + 9i \Rightarrow 4x = 16 \text{ ۽ } 3y = 9, \\ \Rightarrow \frac{4x}{4} = \frac{16}{4} \text{ ۽ } \frac{3y}{3} = \frac{9}{3} \Rightarrow x = 4 \text{ ۽ } y = 3.$$

مثال 02 جيڪڏهن $x^2 + iy^2 = 25 + i36$ ته x ۽ y معلوم ڪريو.

حل:

$$x^2 + y^2i = 25 + 36i \Rightarrow x^2 = 25 \text{ ۽ } y^2 = 36, \\ x = \pm\sqrt{25} \text{ ۽ } y = \pm\sqrt{36} \Rightarrow x = \pm 5 \text{ ۽ } y = \pm 6$$

مشق 1.5

1. هيٺيان منجهيل عدد (Complex Numbers) کي $a+ib$ واري نموني ۾ لکو.

(i) $(1, 2)$

(ii) $(2, 2)$

(iii) $(3, 4)$

(iv) $(-1, 1)$

(v) $(-2, 2)$

(vi) $(-3, 4)$

2. هيٺين منجهيل عددن (Complex Numbers) مان حقيقي ۽ صورتاتي حصن جي سڃاڻپ ڪريو.

(i) $1 + 2i$

(ii) $9i + 4$

(iii) $(-5, 6)$

(iv) $-1 - i$

(v) $\left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{4}{5}\right)i$

(vi) $2i - 1$

3. هيٺين منجهيل عدد (Complex Numbers) جو گردان (Conjugate) معلوم ڪريو.

(i) $3 + 2i$


(ii) $(4, 9)$

(iii) $(-1, 1)$

(iv) $1 - i$

(v) $\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right)i$

(vi) $3i + 1$



4. هيٺين منجهيل (Complex Numbers) جي چڪاس ڪريو ته $\overline{(\bar{z})} = z$

(i) $\left(\frac{4}{7}\right) + \left(\frac{9}{10}\right)i$ (ii) $\left(-\frac{9}{11}\right) + \left(\frac{10}{9}\right)i$ (iii) $\frac{1}{2} - 3i$

(iv) $2 + 3i$ (v) $-2 - 3\left(-\frac{10}{9}\right)i$ (vi) $4x + 3iy$

5. x ۽ y جا ملهه لھو جڏهن: (i) $x + yi = -5 + 5i$ (ii) $x^2 + iy^2 = \frac{16}{9} + \frac{9}{25}i$

(iii) $y^2 + \frac{x}{3}i = 121 - \frac{9}{5}i$ (iv) $\frac{\sqrt{5}}{3}x - \frac{3}{\sqrt{2}}yi = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{2\sqrt{2}}{9}i$

1.6 منجهيل عددن (Complex Numbers) تي بنيادي نشانيون (Basic Operations)

1.6.1 منجهيل عددن (Complex Numbers) تي بنيادي نشانيون استعمال ڪريو (جوڙ، ڪٽ، ضرب ۽ ورڇ)

(i) منجهيل عددن (Complex Numbers) جو جوڙ

فرض ڪريو ته $z_1 = a + ib$ ۽ $z_2 = c + id$ ڪي ٻه منجهيل (Complex) عدد آهن.

جيئن $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ته پوءِ انهن جو جوڙ ٿيندو

$$z_1 + z_2 = (a + ib) + (c + id)$$

$$= (a + c) + i(b + d) = (a + c, b + d).$$

ياد رکيو ته:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

مثال: جيڪڏهن $z_1 = 6 + 9i$ ۽ $z_2 = -1 + 2i$ ته $z_1 + z_2$ جا ملهه لھو.

حل: مليل آهي ته $z_1 = 6 + 9i = (6, 9)$ ۽ $z_2 = -1 + 2i = (-1, 2)$

اسان کي خبر آهي ته $z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d) = (a + c, b + d)$

$$\therefore z_1 + z_2 = (6, 9) + (-1, 2) = (6 - 1, 9 + 2)$$

$$\Rightarrow z_1 + z_2 = (5, 11)$$

(ii) منجهيل عددن (Complex Numbers) جي ڪٽ

فرض ڪريو ته $z_1 = a + ib$ ۽ $z_2 = c + id$, $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$

$$z_1 - z_2 = (a + ib) - (c + id)$$

$$= (a - c) + i(b - d) = (a - c, b - d)$$

مثال: جيڪڏهن $z_1 = -7 + 2i$ ۽ $z_2 = 4 - 9i$ ته $z_1 - z_2$ جا ملهه لھو.

حل: مليل آهي ته $z_1 = -7 + 2i = (-7, 2)$ ۽ $z_2 = 4 - 9i = (4, -9)$

اسان کي خبر آهي ته $z_1 - z_2 = (a - c, b - d)$

$$\therefore z_1 - z_2 = (-7 - 4, 2 + 9)$$

$$\Rightarrow z_1 - z_2 = (-11, 11)$$

ياد رکيو ته:

$$(a, b) - (c, d) = (a - c, b - d)$$

(iii) منجهيل عددن (Complex Numbers) جي ضرب

فرض ڪريو ته $z_1 = a + ib$ ۽ $z_2 = c + id$ ڪي به منجهيل عدد آهن جنهن ۾ $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + ib)(c + id) \\ &= c(a + ib) + di(a + ib) \\ &= ac + bci + adi + bdi^2 \\ &= (ac - bd) + i(ad + bc) = (ac - bd, ad + bc) \therefore i^2 = -1 \end{aligned}$$

ياد رکڻو ته:

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

مثال جيڪڏهن $z_1 = 3 + 4i = (3, 4)$ ۽ $z_2 = -3 - 4i = (-3, -4)$ ته $z_1 z_2$ جي ضرب معلوم ڪريو.

حل:

مليل آهي ته $z_1 = 3 + 4i = (3, 4)$ ۽ $z_2 = -3 - 4i = (-3, -4)$

اسان کي خبر آهي ته $z_1 z_2 = (ac - bd, ad + bc)$

$$\therefore z_1 z_2 = (3, 4) \cdot (-3, -4)$$

$$\Rightarrow z_1 z_2 = (-9 + 16, -12 - 12) = (7, -24)$$

(iv) منجهيل عددن (Complex Numbers) جي ونڊ


فرض ڪريو ته $z_1 = a + ib = (a, b)$ ۽ $z_2 = c + id = (c, d)$ ۽ $z_2 \neq 0$ $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$

ته z_1 ۽ z_2 جي ونڊ هن طرح لکبي.

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{a + ib}{c + id} \\ &= \frac{a + ib}{c + id} \times \frac{c - id}{c - id} \\ &= \frac{(ac + bd) + i(bc - ad)}{c^2 + d^2} \\ &= \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} \right) + i \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right) \\ &= \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right) \end{aligned}$$

ياد رکڻو ته:

$$\frac{(a, b)}{(c, d)} = \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right)$$



مثال 01 سادي صورت ۾ آڻيو. $\frac{2+3i}{4+2i}$

$$\begin{aligned}
 & \frac{2+3i}{4+2i} \\
 = & \frac{2+3i}{4+2i} \times \frac{4-2i}{4-2i} \\
 = & \frac{(8+6)+i(12-4)}{(4)^2-(i2)^2} \\
 = & \frac{14+8i}{20} \\
 = & \frac{14}{20} + i \frac{8}{20} \\
 = & \frac{7}{10} + i \frac{4}{10} \\
 = & \left(\frac{7}{10}, \frac{4}{10} \right) = \left(\frac{7}{10}, \frac{2}{5} \right) \text{ تنهنڪري سادي صورت ۾ آهي.}
 \end{aligned}$$

مثال 02 ونڊ جو فارمولا استعمال ڪري منجهيل عدد (Complex Number) جي ونڊ ڪريو.

$$(-1, 3) \div (2, -4)$$

حل: فارمولا

$$\begin{aligned}
 \frac{z_1}{z_2} = \frac{(a, b)}{(c, d)} &= \left(\frac{ac+bd}{c^2+d^2}, \frac{bc-ad}{c^2+d^2} \right) \\
 \frac{(-1, 3)}{(2, -4)} &= \left(\frac{(-1)(2) + (3)(-4)}{2^2 + (-4)^2}, \frac{(3)(2) - (-1)(-4)}{2^2 + (-4)^2} \right) \\
 &= \left(\frac{-2-12}{4+16}, \frac{6-4}{4+16} \right) \\
 &= \left(\frac{-14}{20}, \frac{2}{20} \right) \\
 &= \left(\frac{-7}{10}, \frac{1}{10} \right)
 \end{aligned}$$

مشق 1.6

1. هيٺين منجهيل عددن (Complex Numbers) کي ٻڌايل نشانين عمل ذريعي جي حل ڪريو.

(i) $(3, 2) + (9, 3)$

(ii) $\left(\frac{3}{2}, \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right)$

(iii) $(2xy, 5y^2) - \left(\frac{1}{2}xy, 6y^2\right)$

(iv) $(15, 12) - (10, -9)$

(v) $\left(\frac{4}{5}, \frac{8}{15}\right) - \left(\frac{4}{5}, \frac{6}{10}\right)$

(vi) $(1, 2)(1, -2)$

(vii) $(4, -5)(5, -4)$

(viii) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{2\sqrt{3}}{4}, \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\right)$

(ix) $(3, -7) \div (3, 2)$

(x) $(4, 5) \div (2, -3)$

2. سادي صورت ۾ آڻي، پنهنجو جواب $a+ib$ جي صورت ۾ لکو.

(i) $\frac{-1}{1+i}$

(ii) $(1+i)^4$

(iii) $\frac{2-6i}{3-i} - \frac{4+i}{3+i}$

(iv) $\frac{1}{(2+3i)(1+i)}$

3. جيڪڏهن $z_1 = -4+6i$ ۽ $z_2 = 2\frac{1}{2}-2i$ چڪاس ڪريو ته

(i) $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$

(ii) $\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$

4. جيڪڏهن $z_1 = 2-5i$ ۽ $z_2 = 2+3i$ چڪاس ڪريو ته

(i) $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

(ii) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

مشق ورجايو 1

1. هيٺيان خال ڀريو.


(i) $\sqrt{5}$ جو ضربِي ابتَر آهي _____.

(ii) _____ = $Q \cup Q'$

(iii) $\mathbb{R}$ ۾ جوڙَلا ذاتِي عنصر آهي _____.

(iv) $5+(6+7)=(5+6)+$ _____.

(v) $3+(-3)=$ _____.



(vi) π عدد آهي.

(vii) $\frac{22}{7}$ هڪ عدد آهي.

(viii) $-3 + 5i$ جو گردان (Conjugate) آهي.

(ix) $2i(3-i)$ ۾ حقيقي حصو آهي.

(x) بن منجهيل عددن (c, d) ۽ (a, b) جي ضرب جيڪا

$$= (a, b) \cdot (c, d)$$

2. هيٺين بيانن کي غور سان پڙهو، درست بيانن لاءِ T تي ڳولو لڳايو. غلط بيانن لاءِ F تي ڳولو لڳايو.

(i) ضرب جي تحت $\mathbb{R}$ بندش واري حالت ۾ آهي.

(ii) جيڪڏهن $x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z$

(iii) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x(y-z) = xy - xz$

(iv) هر ٻن تصوراتي عددن جي ضرب، حقيقي آهي.

(v) بن حقيقي عددن جو جوڙ هڪ حقيقي عدد آهي.

3. درست جواب تي (✓) تڪ جو نشان لڳايو.

(i) $\sqrt{5}$ جو جوڙ جو ابتڙ آهي.

(a) $-\sqrt{5}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (c) $\sqrt{-5}$ (d) -5

(ii) $(5i) \cdot (-2i)$

(a) -10 (b) 10 (c) $-10i$ (d) $10i$

(iii) $3(5+7)=3 \cdot 5 + 3 \cdot 7$ ، خاصيت جو نالو آهي.

(a) مٿاڇري (b) سنگت (c) ورهاست (d) بندش

(iv) $\sqrt{-2} \times \sqrt{-2}$

(a) 2 (b) -2 (c) $2i$ (d) $-2i$

خلاصو

♦ حقيقي عددن جو سيٽ، ناطق ۽ غير ناطق جي سيٽ جو ميلاپ آهي جيئن $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$

♦ نه ختم ٿيندڙ ڏهاڻي اڻپورن جا ٻه قسم آهن جيڪي نه ورجندڙ ڏهاڻي اڻپور ۽ ورجندڙ ڏهاڻي اڻپور

♦ حقيقي عددن جون "+" ۽ "x" جي لحاظ سان خاصيتون

(i) بندش واري خاصيت

$$a + b \in \mathbb{R} \text{ ۽ } ab \in \mathbb{R}, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

(ii) سنگت واري خاصيت

$$a + (b + c) = (a + b) + c \text{ ۽ } a(bc) = (ab)c, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(iii) متاواري خاصيت

$$a + b = b + a \text{ ۽ } ab = ba, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

(iv) ذاتي عنصرن واري خاصيت (Identities Property)

$$a + 0 = a = 0 + a \text{ ۽ } a \cdot 1 = a = 1 \cdot a \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

(v) ورهائجن واري خاصيت

$$a(b + c) = ab + ac \text{ يا } (b + c)a = ba + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(vi) ابتڙن واري خاصيت (Inverses Property)

$$a + (-a) = 0 = -a + a \text{ ۽ } a \times \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \times a, \forall a \in \mathbb{R} \wedge a \neq 0$$

♦ عددي ليڪ: اهڙي ليڪ جيڪا حقيقي عددن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ان کي عددي ليڪ چئبو آهي.



♦ مول ۽ مول جو پايو: $\sqrt[n]{a}$ ۽ $\sqrt{a}$ کي مول جي نشاني ۽ a کي مول جو پايو چئبو آهي.

♦ سگهن جا قاعدا:

(i) جيڪڏهن $a, b \in \mathbb{R}$ ۽ $x, y \in \mathbb{Z}^+$ ته $a^x \times a^y = a^{x+y}$

(ii) جيڪڏهن $a \in \mathbb{R}$ ۽ $x, y \in \mathbb{Z}^+$ ته پوءِ $(a^x)^y = a^{xy}$

(iii) $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ ته پوءِ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ ۽ $n \in \mathbb{Z}^+$

(iv) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ته پوءِ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ ۽ $n \in \mathbb{Z}^+$ جڏهن ته $b \neq 0$

♦ منجهيل عدد (Complex Numbers): $z = a + ib = (a, b)$ کي منجهيل عدد چئبو آهي.

جڏهن ته 'a' حقيقي حصو ۽ 'b' تصوراتي حصو آهي z جو ۽ $i = \sqrt{-1}$

♦ ٻن منجهيل عددن (Complex Numbers) تي عمل (نشانين) جڏهن $z_2 = c + id$ ۽

$$z_1 = a + ib$$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d)$$

$$z_1 - z_2 = (a - c) + i(b - d)$$

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} \right) + i \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right)$$



لاگريٿم

LOGARITHMS

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ عدد کي سائنسي لکڻي جي معياري صورت ۾ ظاهر ڪن ۽ برڪس.
- ◆ حقيقي عدد جو لاگريٿم جنهن جو بنياد a (Base) ۽ جنهن تي ڪجهه سگهه (Exponent) ڏيڻ سان ڪو عدد ملي ان جي وصف بيان ڪرڻ (i.e., $a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x$, $a > 0$, $y > 0$ and $a \neq 1$)
- ◆ عام لاگريٿم جي وصف بيان ڪري عدد جي لاگريٿم جوڳڻ ۽ مئنيٽيسا بيان ڪري سگهن.
- ◆ عددن جو لاگريٿم معلوم ڪرڻ لاءِ جدول استعمال ڪري سگهن.
- ◆ ضد لاگريٿم جو تصور ڏيڻ ۽ جدول (Table) کي استعمال ڪندي ڪنهن عدد جو ضد لاگريٿم معلوم ڪن.
- ◆ ڪئليڪيوليٽر جي استعمال سان لاگريٿم ۽ ضد لاگريٿم معلوم ڪن.
- ◆ عام لاگريٿم ۽ قدرتي لاگريٿم ۾ فرق بيان ڪري سگهن
- ◆ $\log_{10} y = \log y$ يا صرف $\log y$ ۽ $\log_e(y)$ کي لکن
- ◆ $\log_{10} y = x \Leftrightarrow y = 10^x$ (i)
- ◆ $\ln y = x \Leftrightarrow y = e^x$. (ii)
- ◆ لاگريٿم جا هيٺيان قاعدا ثابت ڪريو.
- ◆ $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$ (i)
- ◆ $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$, (ii)
- ◆ $\log_a m^n = n \log_a m$, (iii)
- ◆ $\log_a m \cdot \log_m n = \log_a n$. (iv)
- ◆ لاگريٿم جا هي قاعدا استعمال ڪري، ضرب، ونڊ ۽ سگهن جي ڊگهن طريقن کي جوڙ ۽ ڪٽ وغيره جي آسان طريقن ۾ تبديل ڪن



تعارف:

مسلمان رياضي دان ابو محمد موسيٰ الخوارزمي لاڳرٿم روشناس ڪرايو. ان کان پوءِ سترهين صدي عيسويءَ ۾ جان نيپيئر انهيءَ ۾ وڌيڪ سڌارو آندو ۽ سندس جدولون تيار ڪيون. انهن جدولن ۾ عدد e کي بنياد بنايو ويو. e هڪ غيرناتق عدد آهي جنهن جو ملهه تقريباً 2.71828 آهي. 1631ع ۾ پروفيسر هينري ڊرگس 10 کي بنياد بڻائي لاڳرٿم جون جدولون تيار ڪيون.

لاڳرٿم جي استعمال سان حساب ڪتاب آسان ٿي پيو ۽ ان جو استعمال وڌيڪ ڪارآمد ٿي ويو.

۲/۱ سائنسي لکڻي (Scientific Notation)

سائنسي لکڻي، تمام وڏن ۽ تمام ننڍن عددين کي آسانيءَ سان لکڻ جو هڪ خاص نمونو آهي.

2.1.1 عدد کي سائنسي لکڻي جي معياري صورت ۾ ظاهر ڪرڻ ۽ برڪس.

سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي دنيا ۾ اسان جو واسطو تمام وڏن ۽ ننڍن عددين، مقدارن، سان پوندو آهي. ڌرتي کان سج جو مفاصلو تقريباً 150,000,000 ڪلوميٽر آهي ۽ هٽلروجن ائٽم جو وزن (0.000,000,000,000,000,000,000,001,7) گرام آهي. اهڙي قسم جي عددين کي عام لکڻي (معياري لکڻي) ۾ هر هڪ لاءِ لکڻ تمام ڏکيو آهي ۽ وقت به گهڻو گهربل آهي. سائنسدانن تمام ننڍن عددين ۽ تمام وڏن عددين کي لکڻ لاءِ مناسب ۽ آسان طريقو روشناس ڪرايو آهي جنهن کي سائنسي لکڻي چئبو آهي.

مٿي ڏنل حصي 2.1.1 ۾ ڏيکاريل عددين کي آساني سان سائنسي لکڻي ۾ ترتيبوار 1.5×10^8 km ۽ 1.7×10^{-27} g لکبو.

هيٺيان مثال سائنسي لکڻي کي سمجھڻ لاءِ مدد فراهم ڪندا.

مثال 01

هيٺين عددن کي سائنسي لکڻي ۾ لکو.

(i) 400900

(ii) 0.0000075

حل: (i) 400900

ڏنل عدد ۾، ڏهائي ايڪي واري عدد کان پوءِ آهي، تنهنڪري ڏهائي جي نشاني کي ساڄي کان کاٻي طرف پنجن عددن تائين ٽپايو ۽ $400900 = 4.009 \times 10^5$

حل: (ii) 0.0000075

ڏنل ڏهائي عدد ۾ ڏهائي جو نشان کان پوءِ 7 انگ آهن جنهن ۾ 7 پهريون غير بڙي عدد آهي. تنهنڪري ڏهائي نشان کي 6 عددن تائين کاٻي کان ساڄي طرف ٽپايو ۽ لکو $0.0000075 = 7.5 \times 10^{-6}$ جيڪو ڏنل عدد جي گهربل سائنسي لکڻي ۾ آهي.

هيٺين کي عام لکڻي ۾ لکو

(i) 2.76×10^6

(ii) 5.24×10^{-4}

حل: (i) 2.76×10^6

10 جي سگهه 6 آهي تنهنڪري اسان ڏهائي نشان کي 6 درجن تائين کاٻي کان ساڄي طرف ٽپائينداسين، پر مليل انگ ٻه آهن ان ڪري اسان چار ٻڙيون ساڄي طرف لکي پوءِ ڏهائي ڏينداسين يعني $2.76 \times 10^6 = 2760000$ ، جيڪو گهربل عام لکڻي وارو عدد آهي.

حل: (ii) 5.24×10^{-4}

10 جي سگهه ڪاٺو 4 آهي تنهنڪري اسان ڏهائي نشان کي 4 درجن تائين ساڄي کان کاٻي طرف ٽپائينداسين، پر مليل انگ هڪ آهي. ان ڪري اسان ٽي ٻڙيون کاٻي طرف وڌائي پوءِ ڏهائي ڏينداسين، يعني جيڪو گهربل عام لکڻي وارو عدد آهي. $5.24 \times 10^{-4} = 0.000524$

مشق 2.1

1. هيٺين عددن مان هر هڪ کي سائنسي لکڻي ۾ ظاهر ڪريو.

- | | | |
|---------------|----------------|------------------|
| (i) 9700 | (ii) 4,980,000 | (iii) 96,000,000 |
| (iv) 4169 | (v) 84,000 | (vi) 0.00643 |
| (vii) 0.00643 | (viii) 0.0074 | (ix) 0.0074 |
| (x) 275,000 | | |

2. هيٺين عددن کي عام لکڻي (معياري نشاني) ۾ ظاهر ڪريو.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| (i) 7×10^4 | (ii) 8.072×10^{-10} | (iii) 6.018×10^6 |
| (iv) 7.865×10^8 | (v) 2.05×10^{-4} | (vi) 7.25×10^{10} |
| (vii) 4.502×10^6 | (viii) 2.865×10^{-8} | (ix) 3.056×10^6 |

2.2 لاگرٿم

لاگرٿم ضرب / ونڊ تي مشتمل منجهيل حسابن کي سادي صورت ۾ لکڻ جو طريقو آهي.

2.2.1 حقيقي عدد جو لاگرٿم جنهن جو بنياد a (Base) ۽ جنهن تي ڪجهه سگهه (Exponent)

ڏيڻ سان ڪو عدد ملي ان جي وصف بيان ڪرڻ (i.e., $a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x$, $a > 0$, $y > 0$ and $a \neq 1$)

جيڪڏهن $a^x = y$ ته y جو لاگرٿم a بنياد تي x کي چئبو هي ۽

علامتن ۾ لکندياسين $\log_a y = x$ جڏهن ته $a > 0$, $y > 0$ ۽ $a \neq 1$

تنهنڪري $a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x$

اهو ظاهر ٿئي ٿو ته $a^x = y$ سگهه واري صورت ۾ $\log_a y = x$ لاگرٿمي صورت ۾ آهن.

هيٺيان مثال سگهه ۽ لاگرٿمي صورت جي تصور کي سمجهڻ ۾ مدد ڪندا.

مثال 01 $2^{-4} = \frac{1}{16}$ کي لاگرٿمي صورت ۾ لکو.

حل: $2^{-4} = \frac{1}{16} \Rightarrow \log_2 \frac{1}{16} = -4$

مثال 02 $\log_3 81 = 4$ کي سگهه واري صورت ۾ لکو.

حل: $\log_3 81 = 4 \Rightarrow 3^4 = 81$

مثال 03 $\log_4 2$ جو ملهه لھو.

حل: فرض ڪريو ته $x = \log_4 2$

سگهه واري صورت آهي

$$\therefore 4^x = 2$$

$$\Rightarrow (2^2)^x = 2^1$$

ٻنهي طرف سگهن کي هڪٻئي جي برابر ڪرڻ سان.

$$\begin{aligned} 2x &= 1 \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

مثال 04 x جو ملهه لھو جيڪڏھن $\log_x 8 = \frac{3}{2}$

حل: $\log_x 8 = \frac{3}{2}$

سگھه واري صورت آھي.

$$\begin{aligned} \Rightarrow &= (x)^{\frac{3}{2}} 8 \\ \Rightarrow &= (x)^{\frac{3}{2}} 2^3 \end{aligned}$$

ٻنهي طرف $\frac{2}{3}$ سگھه ڏيڻ سان

$$\begin{aligned} \Rightarrow &= (x^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}} (2^3)^{\frac{2}{3}} \\ \Rightarrow &= x \cdot 2^2 \\ \Rightarrow &= x \cdot 4 \end{aligned}$$

مثال 05 x جو ملهه لھو جيڪڏھن $\log_{64} x = \frac{-2}{3}$

حل:

سگھه واري صورت آھي.

$$\begin{aligned} (64)^{\frac{-2}{3}} &= x & \Rightarrow (4^3)^{\frac{-2}{3}} &= x \\ 4^{-2} &= x & \Rightarrow \frac{1}{4^2} &= x \\ \frac{1}{16} &= x & \Rightarrow x &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

مشق 2.2

1. هيٺين کي لاگرٿمي صورت ۾ لکو.

(i) $7^3 = 343$

(ii) $3^{-4} = \frac{1}{81}$

(iii) $10^{-3} = 0.001$

(iv) $\sqrt[3]{m^2} = 1$

2. هيٺين کي سگهه واري صورت ۾ لکو.

(i) $\log_{27} 81 = \frac{4}{3}$

(ii) $\log_2 \frac{1}{8} = -3$

(iii) $\log_{10} 1 = 0$

(iv) $\log_{10} (0.01) = -2$

3. هيٺين مان نامعلوم لهو.

(i) $\log_{32} x = \frac{1}{2}$ (ii) $\log_a 3 = \frac{1}{2}$ (iii) $\log_{\sqrt{5}} 25 = y$

(iv) $\log_4 x = \frac{3}{2}$ (v) $\log_{10} 100 = y$ (vi) $\log_a 64 = 3$

(vii) $\log_a 1 = 0$ (viii) $\log_{55} 55 = y$ (xi) $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$

2.2.2 عام لاگرٿم جي وصف لکڻ ۽ لاگرٿم جو گڻ ۽ مئنٽيسا جي

وصف لکڻ.

عام لاگرٿم

عام لاگرٿم جو بنياد 10 هوندو آهي. ان کي مصنوعي لاگرٿم يا برگز (Briggs

Logarithms) پڻ سڏبو آهي.

عام لاگرٿم کي $\log_{10} y$ يا صرف $\log y$ سان لکبو آهي.

$$\log y = x \Leftrightarrow y = 10^x$$

عدد جي لاگرٿم جا گڻ (Characteristics) ۽ مئنٽيسا (Mantissa)

ڪنهن عدد جو لاگرٿم ٻن حصن تي مشتمل هوندو آهي. هڪڙو سڄو

عددي حصو ۽ ٻيو ڏهائي يا اڻپور حصو. سڄي عددي حصي کي

گڻ (Characteristics) ۽ ڏهائي حصي کي مئنٽيسا (Mantissa) چئبو آهي.

لاگرٿم جو گڻ واڌو (Positive) يا ڪاٽو (Negative) ٿي سگهي ٿو، پر مئنٽيسا

هميشه واڌو ٿيندو آهي سائنسي لکڻي ۾ 10 جي سگهه کي گڻ ۽ مئنٽيسا

معلوم ڪرڻ لاءِ لاگرٿم جدول استعمال ڪبي جيڪا اسان اڳيان بحث ڪنداسين.

مثال 01

هيٺين عددن جا گڻ معلوم ڪريو.
0.765, 0.04, 0.004567, 2.134, 23.56 and 3456.

گڻ	سائنسي لکڻي	عدد	نمبر شمار
$\bar{1}$ يا -1	7.65×10^{-1}	0.765	1
$\bar{2}$ يا -2	4.0×10^{-2}	0.04	2
$\bar{3}$ يا -3	4.5467×10^{-3}	0.004567	3
0	2.134×10^0	2.134	4
1	2.356×10^1	23.56	5
3	3.456×10^3	3456	6

اسان مشاهدو ڪيو ته:

- 1 کان وڌيڪ عدد جي لاڳرٿم جو گڻ هميشه غير ڪاٺو ٿيندو آهي.
- 1 کان ننڍي عدد جي لاڳرٿم جو گڻ هميشه ڪاٺو ٿيندو آهي.

مئنٽيسا:

ڇا توهان سمجهيو؟

لاڳرٿم جي ڪاٺو گڻ
ڪي -3، -2، -1 جي بدران

ترتيبوار لکيو آهي.

$\bar{1}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$ جڏهن

مئنٽيسا ڪاٺو هجي ته ان
کي واڌو ۾ تبديل ڪيو
ڇاڪاڻ ته مئنٽيسا
هميشه واڌو هوندو آهي.

مئنٽيسا معلوم ڪرڻ لاءِ لاڳرٿم جدول استعمال ڪبي
آهي هي جدول ڏهائي جي 7 انگن تائين لاڳرٿم معلوم
ڪرڻ لاءِ ٺاهي ويئي آهي. پر عملي طرح هن سطح تي
عددن جو درست لاڳرٿم معلوم ڪرڻ لاءِ چئن انگن
واري لاڳرٿم جدول کارگر آهي.

2.2.3 عددن جو لاڳرٿم معلوم ڪرڻ لاءِ جدول جو استعمال ڪرڻ

هيٺيان مثال جدول جي استعمال سان لاڳرٿم معلوم ڪرڻ لاءِ مددگار ٿيندا.


مثال 01

هيٺ ڏنل لاڳرٿم عددن جو مئنٽيسا معلوم ڪريو.

- (ii) $\log(0.002347)$. (i) $\log(43.254)$
(i) $\log(43.254)$

حل:

قدم 1: ڏهائي کي غور ۾ آڻڻ بڻاء، 4 انگن تي مشتمل عدد کڻو جيڪو 4325 آهي.



قدم 2: لاڳرٿم جدول ۾ ڪاٻي پاسي کان پهرئين ڪالمر ۾ عدد 43 تلاش ڪريو.

قدم 3: ساڳي طرح ٽيون انگ ”2“ ڪٿي پهرئين ڪالمر جي عدد 48 جي افقي ليڪ سان ”2“ واري ڪالمر مان عدد 6355 لکو.

قدم 4: وري ساڳي طرح سان چوٿون انگ ”5“ کي فرق واري ڪالمر (mean Difference) ۾ پهرئين ڪالمر جي 43 واري افقي ليڪ سان تلاش ڪريو جيڪو عدد آهي ”5“.

قدم 5: عدد ”5“ کي 6355 ۾ جوڙ ڪريو، جيڪو 0.6360 ٿيندو اهو عدد (43.25) جو مئنيٽيسا آهي.

KARACHIEDU.COM

Logarithm Table

											Mean Differences									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	0000	0043	0086	0128	0017	0212	0253	0294	0334	0374	4	8	12	17	21	25	29	33	37	
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	4	8	11	15	19	23	26	30	34	
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	3	7	10	14	17	21	24	28	31	
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	3	6	10	13	16	19	23	26	29	
14	1463	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	3	6	9	12	15	18	21	24	27	
15	1761	1790	1818	1847	1875	1901	1931	1959	1987	2014	3	6	8	11	14	17	20	22	25	
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	3	5	8	11	13	16	18	21	24	
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	2	5	7	10	12	15	17	20	22	
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	2	5	7	9	12	14	16	19	21	
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	2	4	7	9	11	13	16	18	20	
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19	
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17	
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17	
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16	
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15	
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15	
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14	
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14	
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13	
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13	
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12	
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12	
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12	
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11	
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11	
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11	
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10	
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10	
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10	
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8	
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1	2	3	4	5	5	6	7	8	
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8	
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8	
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8	
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	1	2	3	3	4	5	6	7	8	
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	1	2	2	3	4	5	6	7	7	
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	1	2	2	3	4	5	6	6	7	

Logarithm Table

Mean Differences

54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1	2	2	3	4	5	6	6	7
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	2	3	4	5	5	6	7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	2	3	4	5	5	6	7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	2	3	4	5	5	6	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1	1	2	3	4	4	5	6	7
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1	1	2	3	4	4	5	6	7
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	1	2	3	4	4	5	6	6
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	3	4	5	5	6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1	1	2	3	3	4	5	5	6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	3	4	5	5	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	3	4	5	5	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	1	2	3	3	4	5	5	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	3	4	4	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	3	3	4	4	5	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	1	2	2	3	4	4	5	6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	1	2	2	3	4	4	5	5
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	1	2	2	3	4	4	5	5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1	1	2	2	3	4	4	5	5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	1	2	2	3	3	4	5	5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	1	2	2	3	3	4	5	5
76	8808	8814	882	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	1	2	2	3	3	4	5	5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	1	1	2	2	3	3	4	4	5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1	1	2	2	3	3	4	4	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	1	2	2	3	3	4	4	5
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1	1	2	2	3	3	4	4	5
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	1	2	2	3	3	4	4	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	1	2	2	3	3	4	4	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	1	2	2	3	3	4	4	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	1	2	2	3	3	4	4	5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	1	2	2	3	3	4	4	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	1	2	2	3	3	4	4	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0	1	1	2	2	3	3	4	4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0	1	1	2	2	3	3	4	4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0	1	1	2	2	3	3	4	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0	1	1	2	2	3	3	4	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0	1	1	2	2	3	3	4	4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0	1	1	2	2	3	3	4	4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0	1	1	2	2	3	3	4	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0	1	1	2	2	3	3	4	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0	1	1	2	2	3	3	4	4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0	1	1	2	2	3	3	4	4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0	1	1	2	2	3	3	4	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0	1	1	2	2	3	3	4	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	0	1	1	2	2	3	3	3	4

$$\log (0.002347) \quad (\text{ii})$$

حل: $\log (0.002347)$ ۾ ڏهائي ۽ ٻڙين کي غور ۾ آڻڻ بنا چئن انگن تي مشتمل عدد 2347 ڪٿو. پهرئين ڪالم جي 23 قطار تي نشان ڏيو، عدد 4 کي چوٿين ڪالم ۽ 23 قطار جي ڪات واري رقم 3692 ڪٿو. آخري عدد 7 کي فرق واري ڪالم (Mean Difference) ۾ تلاش ڪريو جيڪو 13 آهي. هن عدد کي 3692 ۾ جوڙ ڪريو جنهن جو حاصل 3705 ٿيندو. تنهنڪري گهربل مئٽيسا ٿيندو.

هينين عددن جو لاگرتم معلوم ڪريو.

مثال 02

$$(i) \quad 278.27 \quad (ii) \quad 0.07058$$

حل: (i) فرض ڪريو ته $x = 278.27$

ٻنهي پاسي لاگرتم ڏيڻ سان

$$\text{Log} x = \log (278.27) \quad \therefore$$

قدم 1: عدد کي 4 انگن تائين ڪٿو جيڪو ٿيندو 278.3

قدم 2: $278.3 = 2.783 \times 10^2$ تنهنڪري گڻ آهي 2

قدم 3: مئٽيسا معلوم ڪرڻ لاءِ ڏهائي تي غور ڪرڻ بنا عدد ٿيندو 2783

لاگرتم جي جدول استعمال ڪري مئٽيسا حاصل ڪريو، جيڪو 0.4445 ٿيندو.

قدم 4: گڻ ۽ مئٽيسا کي جوڙ ڪريو جيڪو ٿيندو

$$\log x = 2.4445$$

حل: (ii) فرض ڪريو ته $x = 0.07058$

قدم 1: ڏهائي ۽ ٻڙي تي غور ڪرڻ بنا چئن انگن

وارو عدد ٿيندو 7058

قدم 2: مليل عدد کي سائنسي لکڻي ۾ تبديل ڪريو

$$\text{تہ گڻ ٿيندو } 7058 \times 10^{-2} \quad -2 \text{ يا } \bar{2}$$

قدم 3: ڏهائي کي غور ۾ آڻڻ بنا 7058 جو

مئٽيسا معلوم ڪريو. لاگرتم جي جدول استعمال

ڪريو ته مئٽيسا ٿيندو 0.8487

قدم 4: گڻ ۽ مئٽيسا کي جوڙ ڪريو ته حاصل ٿيندو

$$\text{Log} x = \log (0.07058) = \bar{2}.8487$$



ياد رکيو ته

ساڳي ترتيب واري اهم
(Significant) عددن جي
لاگرتم جو مئٽيسا به
ساڳيو ٿيندو.

مثال طور: 0.004576,
45.76 0.4576, 0.04576,
وغيره جو مئٽيسا به
ساڳيو آهي.

مشق 2.3

1. هيٺين لاگريٿم جو گڻ ۽ مئٽيسا معلوم ڪريو.

- | | | |
|------------|-------------|----------------|
| (i) 8 | (ii) 5054 | (iii) 9.992 |
| (vi) 765.3 | (v) 0.00329 | (vi) 0.0000300 |

2. هيٺين عددن جو لاگريٿم معلوم ڪريو.

- | | | |
|------------|-------------|---------------|
| (i) 9 | (ii) 55.56 | (iii) 29.592 |
| (vi) 405.3 | (v) 0.00469 | (vi) 0.000076 |

3. جيڪڏهن $\log 31.09 = 1.4926$ ، ته لاگريٿم جدول استعمال ڪرڻ کان

بغير هنن جو ملهه معلوم ڪريو.

- | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| (i) $\log 3.109$ | (ii) $\log 310.9$ | (iii) $\log 0.003109$ |
| (iv) $\log 3109.0$ | (v) $\log 310.942$ | (vi) $\log 310926$ |

2.2.4 ضد لاگريٿم جو تصور ڏيو ۽ جدول استعمال ڪري عددن جو ضد لاگريٿم معلوم ڪريو.

جيڪڏهن $\log x = y$ ، ته x کي y جو ضد لاگريٿم چئبو آهي ۽ ان کي لکبو $x = \text{antilog } y$. جيڪڏهن x جو عام لاگريٿم y آهي جيئن $\log x = y$ ، ته x معلوم ڪرڻ لاءِ ضد لاگريٿم جون جدولون هيٺ ڏنل قاعدن مطابق استعمال ڪندا سين.

- قاعدو 1: جيڪڏهن گڻ واڌو n آهي ته پوءِ ضد لاگريٿم ۾ $n+1$ انگ سجهي حصي ۾ هوندو.
- قاعدو 2: جيڪڏهن گڻ ڪاٽو n آهي ته پوءِ ضد لاگريٿم ۾ $n-1$ ، پڙيون ڏهائي جي نشاني کان پوءِ هونديون.

ضد لاگريٿم جو طريقو هيٺين مثالن سان واضح ڪيل آهي

Antilogarithm Table											Mean Differences								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.00	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	0000	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	0	1	1	1	1	1	2	2	2
.05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146	0	1	1	1	1	1	2	2	2
.06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	0	1	1	1	1	1	2	2	2
.07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	0	1	1	1	1	1	2	2	2

Antilogarithm Table


											Mean Differences								
.08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.10	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.12	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.13	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.18	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1545	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	0	1	1	1	2	2	3	3	3
.20	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	0	1	1	1	2	2	3	3	3
.21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656	0	1	1	2	2	2	3	3	3
.22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694	0	1	1	2	2	2	3	3	3
.23	1698	1702	1706	1710	1714	1718	722	1726	1730	1734	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.26	1820	1821	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	0	1	1	2	2	3	3	3	4
.27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	0	1	1	2	2	3	3	3	4
.28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.29	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.32	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.33	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.34	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	1	1	2	2	3	3	4	5	5
.40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	1	1	2	2	3	4	4	5	5
.41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	1	1	2	2	3	4	4	5	5
.42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	1	1	2	2	3	4	4	5	6
.43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	1	1	2	3	3	4	4	5	6
.44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812	1	1	2	3	3	4	4	5	6

Antilogarithm Table

											Mean Differences									
.45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	1	1	2	3	3	4	5	5	6	
.46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	1	1	2	3	3	4	5	5	6	
.47	2951	2958	2965	2972	2970	2985	2992	2999	3006	3013	1	1	2	3	3	4	5	5	6	
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	3	4	4	5	6	6	
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	3	4	4	5	6	6	
.50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	2	4	4	5	6	7	
.51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304	1	2	2	3	4	5	5	6	7	
.52	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381	1	2	2	3	4	5	5	6	7	
.53	3388	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459	1	2	2	3	4	5	6	6	7	
.54	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540	1	2	2	3	4	5	6	6	7	
.55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622	1	2	2	3	4	5	6	7	7	
.56	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707	1	2	3	3	4	5	6	7	8	
.57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793	1	2	3	3	4	5	6	7	8	
.58	3802	3811	3819	3828	3837	3846	3855	3864	3873	3882	1	2	3	4	4	5	6	7	8	
.59	3890	3899	3908	3917	3926	3936	3945	3954	3963	3972	1	2	3	4	5	5	6	7	8	
.60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064	1	2	3	4	5	6	6	7	8	
.61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	4256	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.64	4365	4374	4385	4395	4406	4416	4426	4436	4446	4457	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.65	4467	4477	4487	4498	4508	4519	4529	4539	4550	4560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667	1	2	3	4	5	6	7	9	10	
.67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4742	4753	4764	4775	1	2	3	4	5	7	8	9	10	
.68	4786	4797	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
.69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000	1	2	3	5	6	7	8	9	10	
.70	5012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5105	5117	1	2	4	5	6	7	8	9	11	
.71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	1	2	4	5	6	7	8	10	11	
.72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	5333	5346	5358	1	2	4	5	6	7	9	10	11	
.73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483	1	3	4	5	6	8	9	10	11	
.74	5495	5508	5521	5534	5546	5559	5572	5585	5598	5610	1	3	4	5	6	8	9	10	12	
.75	5623	5636	5649	5662	5675	5689	5702	5715	5728	5741	1	3	4	5	7	8	9	10	12	
.76	5754	5768	5781	5794	5808	5821	5834	5848	5861	5875	1	3	4	5	7	8	9	11	12	
.77	5888	5902	5916	5929	5943	5957	5970	5984	5998	6012	1	3	4	5	7	8	10	11	12	
.78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6152	1	3	4	6	7	8	10	11	13	
.79	6166	6180	6194	6209	6223	6237	6252	6266	6281	6295	1	3	4	6	7	9	10	11	13	
.80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6415	6427	6442	1	3	4	6	7	9	10	12	13	
.81	6457	6471	6486	6501	6516	6531	6546	6561	6577	6592	2	3	5	6	8	9	11	12	14	

Antilogarithm Table

											Mean Differences									
.82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	6714	6730	6745	2	3	5	6	8	9	11	12	14	
.83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902	2	3	5	6	8	9	11	13	14	
.84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063	2	3	5	6	8	10	11	13	15	
.85	7079	7096	7112	7129	7145	7161	7178	7196	7211	7228	2	3	5	7	8	10	12	13	15	
.86	7244	7261	7278	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396	2	3	5	7	8	10	12	13	15	
.87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7516	7534	7551	7568	2	3	5	7	9	10	12	14	16	
.88	7586	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745	2	4	5	7	9	11	12	14	16	
.89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925	2	4	5	7	9	11	13	14	16	
.90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110	2	4	6	7	9	11	13	15	17	
.91	8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8299	2	4	6	8	9	11	13	15	17	
.92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492	2	4	6	8	10	12	14	15	17	
.93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
.94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
.95	8913	8933	8954	8974	8995	9016	9036	9057	9078	9099	2	4	6	8	10	12	15	17	19	
.96	9120	9141	9162	9183	9204	9226	9247	9268	9290	9311	2	4	6	8	11	13	15	17	19	
.97	9333	9354	9376	9397	9419	####	9462	9484	9506	9528	2	4	7	9	11	13	15	17	20	
.98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750	2	4	7	9	11	13	16	18	20	
.99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977	2	5	7	9	11	14	16	18	20	



مثال 01 عدد معلوم ڪريو جنهن جو لاگريٿم آهي.

(i) 1.3247 (ii) $\bar{2}.1324$

حل (i): فرض ڪريو ته $x = \text{anti log } (1.3247)$ هتي $\text{Log } x = 1.3247$

قدم 1: هاڻ گڻ $1 = 1$ ۽ مئنيٽيسا 0.3247

قدم 2: ضد لاگريٿم جدول ۾ 32 واري قطار کي ظاهر ڪريو.

قدم 3: ٽيئن انگ کي جيڪو ”4“ آهي 32 واري قطار ۾ چوٿين ڪالم جي ڪاٺ سان معلوم ڪريو جيڪو 2109 آهي.

قدم 4: وري فرق واري ستين ڪالم ۾ انگ تلاش ڪريو جيڪو 3 آهي

قدم 5: 3 کي 2109 ۾ جوڙ ڪريو جيڪو ٿيندو 2112 .

قدم 6: جيئن ته گڻ 1 آهي تنهنڪري ڏهائي ٻن درجن کان پوءِ ڪاٺي کان

ساڄي طرف ڏيو ته گهربل ضد لاگريٿم ٿيندو 21.12 .

حل (ii): فرض ڪريو ته $x = \text{antilog } (\bar{2}.1324)$ هتي $\text{Log } \bar{x} = \bar{2}.1324$

هتي گڻ $\bar{2}$ ۽ مئنيٽيسا 0.1324

هاڻ ضد لاگريٿم جدول ۾ 13 واري قطار کي ظاهر ڪريو ۽ ڪالم 2

جي ڪاٺ سان ملندو 1355 ۽ چوٿين ڪالم جو فرق آهي 1 تنهنڪري

اهو ٿيندو $1355 + 1 = 1356$ جيئن ته گڻ آهي 2 تنهنڪري گهربل عدد آهي 0.01356

2.2.5 ڪئليڪيوليٽر جي استعمال سان لاگريٿم ۽ ضد لاگريٿم معلوم ڪرڻ.

مثال 1: ڪئليڪيوليٽر جو استعمال ڪري $\log (41230)$ جي قيمت معلوم

ڪريو.

حل: فرض ڪريو ته $x = \log 41230$

اسان جو پهريو قدم آهي $\log$ بٽڻ کي دٻايو هاڻ (41230)

رقم لکو.



ڏنگين بند ڪري ”=” واري بٽڻ کي دٻايو

اسان ڏسنداسين ته $\log(41230) = 4.615213335$

تنهنڪري $\log(41230) = 4.615213335$

مثال 02 ڪئلكيوليٽر استعمال ڪري $\text{antilog}(4.615213335)$ جو ملهه لھو.

حل: اسان ضد لاگريٿم بٽن استعمال ڪنداسين.

(i) shift key يا function 2^{nd} بٽن کي دٻايو.

(ii) $\log$ بٽن کي دٻايو.

(iii) 4.615213335 ڏنگين کي گڏ ڪري لکو.

(iv) Enter بٽن کي دٻايو

ضد لاگريٿم جو جواب $\text{antilog}(4.615213335) = 41230.00002$

2.3 عام لاگريٿم ۽ قدرتي لاگريٿم ۾ فرق معلوم ڪرڻ.

عام لاگريٿم جو بنياد "10" هوندو آهي، ۽ ان کي $\log_{10}(x)$ جي بدران

$\log(x)$ سان ظاهر ڪيو ويندو آهي. جڏهن ته قدرتي لاگريٿم جو بنياد

"e" هوندو آهي (e هر غيرناتق عدد آهي جنهن جي قيمت $2.718281\dots$

آهي) ۽ ان کي $\log_e(x)$ جي بدران $\ln x$ سان ظاهر ڪيو ويندو آهي.

2.4 مشق

1. جدول استعمال ڪري عدد معلوم ڪريو جن جا عام لاگريٿم هيٺ ڏجن ٿا.

(i) 0.35749 (ii) 3.56721 (iii) 1.7427

2. ڪئلكيوليٽر استعمال ڪري هيٺين عددن جا لاگريٿم معلوم ڪريو.

(i) 900 (ii) 45.54 (iii) 36582

(iv) 826.3 (v) 0.00851 (vi) 0.000097

3. ڪئلكيوليٽر استعمال ڪري هيٺين مان x جو ملهه معلوم ڪريو.

(i) $\log x = 1.7505$ (ii) $\log x = 0.6609$ (iii) $\log x = 2.2132$

(iv) $\log x = 1.9009$ (v) $\log x = 0.0009$ (vi) $\log x = 3.8505$

(vii) $\log x = 1.6132$ (viii) $\log x = 2.7777$ (ix) $\log x = 3.3465$

(x) $\log x = 4.8455$ (xi) $\log x = 6.7835$ (xii) $\log x = 9.6875$

(xiii) $\log x = 3.4800$ (xiv) $\log x = 7.0038$ (xv) $\log x = 9.687$

2.4 لاگريٿم جا قاعدا (Laws of Logarithms)

2.4.1 هيٺيان لاگريٿم جا قاعدا ثابت ڪريو.

(i) $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$

(ii) $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$

$$(iii) \log_a m^n = n \log_a m$$

$$(iv) \log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

$$\log_a (mn) = \log_a m + \log_a n \quad m, n, a, a > 0, a \neq 1, \quad (i)$$

ثابتي: فرض ڪريو ته $\log_a n = y$ ۽ $\log_a m = x$ ته پوءِ

$$n = a^y \quad \text{۽} \quad m = a^x$$

$$mn = a^x \cdot a^y \quad \text{هاڻ}$$

$$mn = a^{x+y} \quad (\text{سگهن جو قاعدو})$$

سگهه واري صورت کي لاگريٿم واري صورت ۾ تبديل ڪرڻ سان

$$\log_a (mn) = x + y$$

$$\log_a (mn) = \log_a m + \log_a n \quad \text{تنهنڪري}$$

ٻن عددن جي ضرب ايت جو لاگريٿم انهن جي الڳ الڳ لاگريٿم جي جوڙ برابر آهي.

(ii) حقيقي عددن $a > 0, a \neq 1$ ۽ m, n, a

$$\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n$$

ثابتي: فرض ڪريو ته $\log_a m = x$ ۽ $\log_a n = y$ ته پوءِ

$$m = a^x \quad \text{۽} \quad n = a^y$$

$$\frac{m}{n} = \frac{a^x}{a^y} \quad \text{هاڻ}$$

$$\frac{m}{n} = a^{x-y}$$

سگهه واري صورت کي لاگريٿم واري صورت ۾ تبديل ڪرڻ سان

$$\Rightarrow \log_a \frac{m}{n} = x - y$$

$$\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n \quad \text{تنهنڪري}$$

ٻن عددن جي ونڊ ايت جو لاگريٿم انهن جي الڳ الڳ لاگريٿم جي تفاوت برابر آهي.

(iii) حقيقي عددن $a > 0, a \neq 1$ ۽ m, n, a

$$\log_a m^n = n \log_a m$$

ثابتي: فرض ڪريو ته $\log_a m = x$

$$m = a^x \text{ ته پوءِ}$$

$$m^n = (a^x)^n \text{ هاڻ}$$

$$m^n = a^{nx}$$

سگهه واري صورت کي لاڳرثم واري صورت ۾ تبديل ڪرڻ سان

$$\Rightarrow \log_a m^n = nx$$

$$\log_a m^n = n \log_a m \text{ تنهنڪري}$$

عددن جي n سگهه جو لاڳرثم، انهيءَ عدد جي لاڳرثم کي n سان ضرب جي برابر آهي.

(iv) **بياني جي بدلائڻ واري خاصيت**

حقيقي عددين $a > 0, a \neq 1$ ۽ m, n

$$\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

ثابتي: فرض ڪريو ته $\log_a n = x$

$$n = a^x \text{ ته پوءِ}$$

بنياد b تي ٻنهي طرف لاڳرثم وٺڻ سان

$$\log_b n = \log_b a^x$$

$$\log_b n = x \log_b a \therefore \log_b m^n = n \log_b m$$

$$x = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

$$\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a} \text{ تنهنڪري}$$

مثال 01 $\log_a(2bc)$ کي لاڳرثم جي جوڙ ۾ ظاهر ڪريو.

لاڳرثم جو قاعدو استعمال ڪرڻ سان

$$\log_a(2bc) = \log_a 2 + \log_a b + \log_a c,$$

لاڳرثم جي جوڙ ۾ ظاهر ڪيو ويو.

مثال 02 $\log(52.5 \times 63 \times 4.567)$ کي لاڳرثم جي جوڙ ۾ ظاهر ڪريو.

لاڳرثم جو قاعدو استعمال ڪرڻ سان

$$\log(52.5 \times 63 \times 4.567) = \log 52.5 + \log 63 + \log 4.567$$

لاڳرثم جي جوڙ ۾ ظاهر ڪيو ويو.

حل:



نوٽ ڪريو ته

- (i) $\log_a(mn) \neq \log_a m \times \log_a n$
(ii) $\log_a m + \log_a n \neq \log_a (m + n)$

مثال 03 $\log\left(\frac{213.1}{34.22}\right)$ ڪي لاڳرٿم تفاوت ۾ ظاهر ڪريو.

حل: لاڳرٿم جي تفاوت جو قاعدو استعمال ڪريو ته $\log\left(\frac{213.1}{34.22}\right)$ ٿيندو

$$\log\left(\frac{213.1}{34.22}\right) = \log 213.1 - \log 34.22$$

لاڳرٿم جي تفاوت ۾ ظاهر ڪيو ويو.

مثال 04 $\log_a 2^x$ ڪي ضرب واري صورت ۾ ظاهر ڪريو.

حل: اسان کي خبر آهي ته $\log_a m^n = n \log_a m$

$$\therefore \log_a 2^x = x \log_a 2$$

مشق 2.5

1. هيٺين لاڳرٿم ڪي $\log_a x$, $\log_a y$ ۽ $\log_a z$ جي رقمن جي صورت ۾

لکو. (i) $\log_a \frac{x^3 y}{z^2}$ (ii) $\log_a \sqrt{xy^2 z}$ (iii) $\log_a \left(\sqrt[3]{x^{-1} \sqrt{y^3}} \div \sqrt{y^3 \sqrt{x}} \right)$

(iv) $\log_a \left\{ \left(\frac{yz^2}{y^4 z^3} \right)^{-3} \cdot \left(\frac{y^{-1} z}{y^2 z^{-3}} \right)^5 \right\}$ (v) $\log_a \frac{\sqrt[6]{xy^{-1} z^{-2}}}{(x^{-1} y^{-2} z^{-3})^{\frac{1}{6}}}$ (vi) $\log_a \frac{x \sqrt{y^3}}{\sqrt[3]{z^2 x^5}}$

2. هيٺين کي هڪ لاڳرٿم جي صورت ۾ گهٽايو.

(i) $\log_a 20 - \log_a 15 + \frac{1}{2} \log_a \frac{9}{2}$

(ii) $\frac{1}{3} \log_a (x-1)^3 + \frac{10}{9} \log_a (x+1) - \frac{1}{9} \log_a (x+1)$

(iii) $\log x - 2 \log x + 3 \log (x+1) - \log (x^2 - 1)$

3. جيڪڏهن $\log 5 = 0.6990$ ۽ $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ ته جدول استعمال ڪرڻ کان بغير هيٺين جون قيمتون معلوم ڪريو.

(i) $\log 15$ (ii) $\log 64$ (iii) $\log \sqrt{5 \times 2}$ (iv) $\log 48$

(v) $\log \sqrt{18}$ (vi) $\log 30$ (vii) $\log \frac{8}{3}$ (viii) $\log \frac{5}{\sqrt{3}}$

هيٺيان ثابت ڪريو.

(i) $\log_b m \times \log_m a = \log_b a$ (ii) $\log_a b \times \log_c a = \log_c b$

(iii) $\log_b a \cdot \log_c b \frac{1}{\log_c a} = 1$ (iv) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

5. هيٺين جي چڪاس ڪريو.

(i) $\log_5 7 \times \log_7 25 = 2$ (ii) $\log_3 2 \times \log_2 81 = 4$

(iii) $\log_5 343 \times \log_7 25 = 6$ (iv) $\log_6 16 \times \log_2 216 = 12$

2.5 لاگرٿم جي قاعدن جا استعمال

2.5.1 لاگرٿم جي قاعدن کي استعمال ڪري، ضرب وند ۽ سگهن جي ڊگهن

طريقن کي جوڙ، ڪٽ وغيره جي آسان طريقن ۾ تبديل ڪريو.

هيٺيان مثال لاگرٿم جي قاعدن جي استعمال کي سمجهڻ ۾ مدد ڪندا.

مثال 01 لاگرٿم استعمال ڪري $(8.573)(28.74)$ جي قيمت معلوم ڪريو.

حل: فرض ڪريو ته $x = (8.573)(28.74)$

ٻنهي طرف لاگرٿم وٺڻ سان اسان کي ملندو

$$\therefore \log x = \log(8.573)(28.74)$$

$$\Rightarrow \log x = \log(8.573) + \log(28.74)$$


$$\Rightarrow \log x = 0.9332 + 1.4585$$

$$\Rightarrow \log x = 2.3917$$

$$\therefore x = \text{antilog}(2.3917)$$

$$x = 246.4$$

تنهنڪري



مثال 02: لاگرتھم جي مدد سان $\frac{213.1}{34.22}$ جو ملهه معلوم ڪريو.

حل: فرض ڪريو ته $x = \frac{213.1}{34.22}$

ٻنهي طرف لاگرتھم وٺڻ سان اسان کي ملندو

$$\log x = \log \left(\frac{213.1}{34.22} \right)$$

$$\Rightarrow \log x = \log \left(\frac{213.1}{34.22} \right)$$

$$\Rightarrow \log x = \log 213.1 - \log 34.22, \quad \left(\log \left(\frac{a}{b} \right) = \log a - \log b \right)$$

لاگرتھم جدول کي استعمال ڪرڻ سان

$$\log x = 2.3286 - 1.5343 = 0.7943$$

$$\Rightarrow \log x = 0.7943,$$

ضد لاگرتھم ڪرڻ سان اسان کي ملندو

$$x = \text{antilog} (0.7943)$$

ضد لاگرتھم جي جدول استعمال ڪرڻ سان اسان کي ملندو $x = 6.227$ (ڳڻ=0) ۽ $0.7943 =$ مئنيٽيسا

ته $\frac{213.1}{34.22}$ جو گهربل ملهه مليو 6.227

مثال 03: لاگرتھم جا قاعدا استعمال ڪري $\sqrt{\frac{3.41 \times 37.92}{2.34}}$ جو ملهه لھو.

حل: فرض ڪريو ته $x = \sqrt{\frac{3.41 \times 37.92}{2.34}}$

ٻنهي طرف لاگرتھم وٺڻ سان اسان کي ملندو

$$\begin{aligned}
 \log x &= \log \left(\frac{3.41 \times 37.92}{2.34} \right)^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{1}{2} \log \left(\frac{3.41 \times 37.92}{2.34} \right) \\
 &= \frac{1}{2} (\log 3.41 + \log 37.92 - \log 2.34) \\
 &= \frac{1}{2} (0.5325 + 1.5788 - 0.3692) \\
 &= \frac{1}{2} (1.7424) \\
 &= 0.8712 \\
 x &= \text{antilog } (0.8712) \\
 &= 7433 \\
 &= 7.433
 \end{aligned}$$

4^5 ۾ انگن جو تعداد معلوم ڪريو.

مثال 04

فرض ڪريو ته $n=4^5$

حل:

ٻنهي طرف لاگريٿم وٺڻ سان اسان کي ملندو

$$\begin{aligned}
 \therefore \log n &= \log 4^5, & (\because \log a^n &= n \log a) \\
 \Rightarrow \log n &= 5 \log 4, \\
 \Rightarrow \log n &= 5 \times 0.6021, & (\log 4 = 0.6021 \text{ ته}) \\
 \Rightarrow \log n &= 3.0105,
 \end{aligned}$$

جيئن ته انگن جو تعداد = گڻ + 1

تنهنڪري انگن جو تعداد ٿيندو $4^5 = 3+1=4$

مشق 2.6

1. لاگرٿم جي استعمال سان هيٺين جا ملهه لھو.

- (i) 57.86×4.385 (ii) $25.753 \times 0.5341 \times 490.8$ (iii) $\frac{25.753}{0.5341}$
 (iv) $\frac{(790.6 \times 30.32)}{25.753}$ (v) $\frac{(2391 \times 30.72)}{23.34}$ (vi) $\frac{99.87}{(8.369) \times (0.785)}$
 (vii) $\sqrt[5]{2.709} \times \sqrt[7]{1.239}$ (viii) $\frac{(26.62)^{\frac{1}{2}} \times (87.19)^3}{\sqrt{69.53}}$ (ix) $\frac{(4308)^3 \times \sqrt{80.06}}{(0.3387)^3}$
 (x) $\frac{(43.68)^5 \times \sqrt{(0.057)^3}}{(3.048)^4}$

2. هيٺين ۾ الڳن جو تعداد معلوم ڪريو.

- (i) 4^{12} (ii) 7^{25} (iii) 3^{30} (iv) 3^5 (v) 9^4

مشق ورجايو 2

1. هيٺين بيانن کي ڌيان سان پڙھو ۽ درست بيانن لاءِ T تي ڳولو پاڻو ۽ غلط بيانن لاءِ F تي ڳولو پاڻو.

- (i) 0.025 کي سائنسي لکڻي ۾ 2.5×10^3 لکي سگهجي ٿو. T/F
 (ii) لاگرٿم البيروني روشناس ڪرايو. T/F
 (iii) ڪنهن عدد جي لاگرٿم ۾ سڄي حصي کي ان جو ڪٽ چٽيو آهي. T/F
 (iv) لاگرٿم عدد جو مٿنيسا هميشه غير ڪاتو هوندو آهي. T/F
 (v) $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$. T/F

2. هيٺيان خال ڀريو.

(i) جنهن لاگرٿم جو بنياد 10 هجي ان کي چئبو _____.

(ii) $\log 1 = \underline{\hspace{2cm}}$.

(iii) لاگرٿم جي اڻپوري حصي کي سڏبو _____.

(iv) $\log 512 = \underline{\hspace{2cm}}$.

(v) $\log_a m \times \log_m n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(vi) $x = \log_a y$ جي سگهه واري صورت آهي _____.

(vii) $a^{10} = y$ جي لاگرٿم صورت آهي _____.

(viii) $\log_b a \times \log_a b = \underline{\hspace{2cm}}$.

(ix) $\log_a \left(\frac{m}{n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(x) $\log(10 \times 10) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. درست جواب تي (✓) جو نشان لڳايو.

(i) جيڪڏهن $\log_{10} x = 4$ ته $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

(a) 500 (b) 100 (c) 1000 (d) 10000

(ii) $\log 54.58$ جو ڪٿي آهي _____.

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4

(iii) عام لاگرٿم جو بنياد آهي _____.

(a) 5 (b) 10 (c) e (d) 100

(iv) $\log xyz = \underline{\hspace{2cm}}$.


(a) $\log x \log y \log z$ (b) $\log x + \log y + \log z$

(c) $\log(xy)^z$ (d) $\log x - \log y - \log z$

(v) 0.00789 جي سائنسي لکڻي آهي:

(a) 7.89×10^{-3} (b) 7.89×10^3

(c) 0.789×10^{-2} (d) 78.9×10^{-4}



جيڪڏهن $\log x = 2$ ته $x =$ _____ (vi)

(a) 200 (b) 1000 (c) 100 (d) $2/10$

جيڪڏهن $\log_2 8 = x$ ته $x =$ _____ (vii)

(a) 64 (b) 3 (c) 3 (d) 2

(viii) قدرتي لاگرٿم جو بنياد آهي _____

(a) 10 (b) e (c) π (d) 5

(ix) $3^5 = 243$ کي لاگرٿم صورت ۾ لکيو _____

(a) $\log_3 5 = 243$ (b) $\log_3 243 = 5$

(c) $\log_5 243 = 12$ (d) $\log_5 3 = 243$

خلاصو

جيڪڏهن $a^x = y$ ته y جو لاگرٿم a بنياد تي x کي چئبو آهي ان کي هن ريت لکيو

$$a \neq 1, \log_a y = x, a > 0, y > 0$$

عام لاگرٿم جو بنياد 10 آهي، ان کي برڪز لاگرٿم چئبو آهي. گهڻو ڪري $\log_{10} x$ جي بدران $\log x$ لکيو ويندو آهي. قدرتي لاگرٿم جو بنياد e آهي (هڪ غيرناتق عدد جنهن جي قيمت $2.7182818...$ آهي ان کي $\log_e x$ جي بدران $\ln x$ لکيو آهي).

$$\log x = y \Leftrightarrow 10^y = x$$

$$\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$$

لاگريٿم ۾ سڄي عددي حصي کي گڻ چئبو آهي ۽ اڻپوري حصي کي مئنتيسا چئبو آهي.

لاگريٿم عدد جو گڻ 1 کان وڌيڪ هميشه غير کاتو هوندو آهي.

لاگريٿم عدد جو گڻ 1 کان گهٽ هميشه کاتو هوندو آهي.

لاگريٿم جو کاتو گڻ کي -1, -2, -3 جي بدران $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}$ لکبو آهي.

لاگريٿم عدد جن کي انگن جي هڪ جهڙي ترتيب هجي تن جو مئنتيسا پڻ ساڳيو ٿيندو آهي.

عدد جيڪو مليل لاگريٿم سان مشابهت رکي ان کي ضد لاگريٿم چئبو آهي.

لاگريٿم جا قاعدا:

$$(i) \quad \log_a (mn) = \log_a m + \log_a n$$

$$(ii) \quad \log_a \left(\frac{m}{n} \right) = \log_a m - \log_a n$$

$$(iii) \quad \log_a m^n = n \log_a m$$

$$(iv) \quad \log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

هي قاعدا هن ريت به لکي سگهجن ٿا: $\log_b a \cdot \log_a n = \log_b n$

يونٽ 3

آلجبري اظهار ۽ فارمولا Algebraic Expression and Formulas

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ ناطق اظهار، ناطق عددن وانگر هوندا آهن جي ڄاڻ حاصل ڪندا.
- ◆ ناطق اظهار جي تعريف ۾ گهڻي رقمين $p(x)$ ۽ $q(x)$ جي ونڊ اپٽ (Quotient) $\frac{p(x)}{q(x)}$ (جنهن ۾ $q(x)$ گهڻي رقمي ٻڙي نه آهي) بيان ڪندا.
- ◆ ڏنل آلجبري اظهارن جي چڪاس ڪري سگهندا ته
 - ◆ گهڻي رقمي آهي يا نه
 - ◆ ناطق اظهار آهي يا نه
- ◆ ناطق اظهار کي $\frac{p(x)}{q(x)}$ جي طور وضاحت ڪندا، جيڪڏهن $p(x)$ ۽ $q(x)$ مڪمل عددي سرڻ سان گهڻي رقميون آهي جن ۾ ڪو به مشترڪ جزو نه هجي.
- ◆ چڪاس ڪندا ته ناطق آلجبري اظهار سادي صورت ۾ آهي يا نه.
- ◆ ناطق اظهار کي سادي صورت ۾ گهٽائي سگهندا.
- ◆ ناطق اظهار جو جوڙ، ڪٽ ۽ ضرب اپٽ معلوم ڪري سگهندا.
- ◆ هڪ ناطق اظهار کي، ٻي ناطق اظهار سان ونڊ ڪري سادي صورت ۾ آڻي سگهندا.
- ◆ خاص حقيقي عددن سان، آلجبري اظهارن جي قيمت معلوم ڪري سگهندا.
- ◆ فارمولا بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن.
- ◆ $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$ ۽ $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$.
- ◆ $a^2 + b^2$ ۽ ab جو ملهه معلوم ڪن، جڏهن $(a + b)$ ۽ $(a - b)$ جا ملهه معلوم هجن.

فارمولا بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca.$$

$a^2 + b^2 + c^2$ جو مله معلوم ڪريو، جڏهن $a + b + c$ ۽ $ab + bc + ca$ جو مله مليل هجي.

$a + b + c$ جو مله معلوم ڪريو، جڏهن $a^2 + b^2 + c^2$ ۽ $ab + bc + ca$ جو مله مليل هجي.

$ab + bc + ca$ جو مله معلوم ڪريو، جڏهن $a^2 + b^2 + c^2$ ۽ $a + b + c$ جو مله مليل هجي.

فارمولا بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهن

$$(a + b)^3 = a^3 + 3ab(a + b) + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3ab(a - b) - b^3$$

$a^3 \pm b^3$ جو مله معلوم ڪريو، جڏهن $a \pm b$ ۽ ab جو مله مليل هجي.

$x^3 \pm \frac{1}{x^3}$ جو مله معلوم ڪريو، جڏهن $x \pm \frac{1}{x}$ جو مله مليل هجي.

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2).$$

$x^2 + \frac{1}{x^2} - 1$ ۽ $x + \frac{1}{x}$ جي ضرب معلوم ڪن.

$x^2 + \frac{1}{x^2} + 1$ ۽ $x - \frac{1}{x}$ جي ضرب معلوم ڪن

لاڳيتي ضرب معلوم ڪري سگهندا.

$$(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2).$$


غير ناطق عدد ۽ انهن جا استعمال جي سڃاڻپ ڪري سگهن.

بي درجي جي غير ناطق عدد جي وضاحت ڪن.

بنيادي عملن کي بي درجي جي غير ناطق عددي اظهارن جي چيڊن کي ناطق ڪن ۽ ان جو جائزو وٺي سگهن.

چيڊ کي ناطق ڪرڻ جي عمل جي وضاحت ڪن، ۽ $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$ ، $\frac{1}{a + b\sqrt{x}}$ نموني جي

اظهار جي چيڊ کي ناطق ڪن ۽ جڏهن ته x ۽ y قدرتي عدد a ۽ b سڃا عدد آهن.



3.1 آڄبري اظهار

اسان اڳيئي گذريل ڪلاس ۾ آڄبري اظهارن بابت پڙهيو آهي ۽ اڄو ته ان جي قسمن تي بحث ڪريون آڄبري اظهار هيٺين ٽن قسمن جا ٿيندا آهن.

(a) گهڻ رقمي اظهار يا گهڻ رقمي (Polynomial Expression or Polynomial)

(b) ناطق اظهار (Rational Expression)

(c) غير ناطق اظهار (Irrational Expression)

(a) **گهڻ رقمي اظهار يا گهڻ رقمي (Polynomial Expression or Polynomial)**

هڪ گهڻ رقمي ڪنهن بدلجندڙ x ۾ هيٺئين نموني لکي سگهجي ٿي

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} \dots + a_{n-1}x^1 + a_n$$

جتي ' n ' هڪ غير منفي (يعني واڌو) سڄو عدد آهي ۽ عددي سرا (منڊ) $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ حقيقي عدد آهن.

اڪثر ڪري هڪ گهڻ رقميءَ کي $p(x)$ لکبو آهي، تنهن ڪري مٿي ڏيکاريل آڄبري اظهار کي $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} \dots + a_{n-1}x^1 + a_n$ ظاهر ڪبو. جيڪڏهن $a_0 \neq 0$ ، ته ان گهڻ رقمي کي n درجي جي گهڻ رقمي ۽ a_0 کي گهڻ رقمي جو عددي سرو (منڊ) چئبو آهي.

گهڻ رقمين ۽ انجي درجن جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا.

(ii) $x^4 - 2x^3 + 5x^2 + 1$ درجو 4 آهي.

(i) $8x - 5$ درجو 1 آهي

(iv) $12x^4 - x^3 + \frac{2}{3}x^2 - 3x + 1$ درجو 4 آهي.

(iii) $6x^{31} + 3$ درجو 31 آهي

(vi) $\sqrt{10}x^{12} + 2x^6 - x^5 - 18x + 1$ درجو 12 آهي.

(v) 4 درجو 0 آهي.

$x^3 - x^3y^2 + x^2y^2 - 10$ ٻن متغيرن (بدلجندڙن) x Variables ۽ y سان هڪ آڄبري اظهار جو درجو 5 آهي.

ساڳيءَ طرح $x^3y^5z^2 - x^3y^2z^3 + x^2yz - 34$ ٽن متغيرن بدلجندڙن (x, y, z Variables) ۽ z سان هڪ آڄبري اظهار جو درجو 10 آهي.

(چو جو هن آڄبري اظهار جي سڀني رقمن مان سگهن جو وڏي ۾ وڏو جوڙ 10 آهي).

ياد رکو ته:

- جيڪڏهن گهڻ رقيقيءَ ۾ صرف هڪ رقم موجود هجي ته انکي هڪ رقيقي (Monomial) اظهار چئبو آهي، مثال طور: $3x, 7xy, 6xy^2z^5$ وغيره.
- جيڪڏهن گهڻ رقيقيءَ ۾ صرف ٻه رقم موجود هجن ته انکي ٻه رقيقي (Binomial) اظهار چئبو آهي، مثال طور: $x+4, 5x+y, 7x-3$ وغيره.
- جيڪڏهن گهڻ رقيقيءَ ۾ صرف ٽي رقم موجود هجي ته انکي ٽي رقيقي (Trinomial) اظهار چئبو آهي، مثال طور: $\frac{1}{\sqrt{3}}x^2y^2 - 5xy + 3x^2 - 2x + 1$ وغيره.
- جيڪڏهن گهڻ رقيقيءَ ۾ چار يا وڌيڪ رقمون موجود هجن ته انکي ڪيترائي رقيقي (Multinomial) اظهار چئبو آهي.

(b) ناطق اظهار (Rational Expression)

اهڙي الجبري اظهار جيڪو $\frac{p(x)}{q(x)}$ جي صورت ۾ لکي سگهجي جنهن ۾ $p(x)$ ۽ $q(x)$ گهڻ رقيقيون هجن ۽ $q(x) \neq 0$ هجي انکي ناطق الجبري اظهار چئبو آهي.

مثال طور: $\frac{\sqrt{3}x^2 - 5x + 4}{x^2 + 6x - 5}, \frac{x^2 - x + 1}{x - 5}, \frac{x + 1}{x}$ وغيره.

نوٽ: هر گهڻ رقيقي اظهار ناطق اظهار آهي پر هر ناطق اظهار گهڻ رقيقي اظهار نه آهي.


(c) غير ناطق اظهار (Irrational Expression)

اهڙي الجبري اظهار جيڪو $\frac{p(x)}{q(x)}$ جي صورت ۾ لکي نه سگهجي جنهن ۾ $p(x)$ ۽ $q(x)$ گهڻ رقيقيون هجن ۽ $q(x) \neq 0$ هجي انکي غير ناطق الجبري اظهار چئبو آهي.

مثال طور: $\sqrt{x} + \frac{5}{\sqrt{x}}, \frac{\sqrt{x^3 + 2x + 3}}{\sqrt{x} - 9}, \frac{\sqrt{x} + 1}{x}, \frac{1}{\sqrt{x}}$ وغيره.

3.1.1 اهو معلوم هجي ته ناطق الجبري اظهار ناطق عددن وانگر عمل ڪندا آهن.

جيئن p ۽ q ٻه ناطق عدد آهن ته پوءِ $\frac{p}{q}$ سڄا عدد ٿي سگهن ٿا يا نه تنهن ڪري عددين جو سرشتو وڌايو آهي ۽ $\frac{p}{q}$ کي ناطق جي صورت ۾ ظاهر ڪيو آهي، جتي $p, q \in \mathbb{Z}$ جنهن ۾ $q \neq 0$.



ساڳيءَ طرح: جيڪڏهن $p(x)$ ۽ $q(x)$ ٻه گهڻ رقيون آهن ته لازمي نه آهي ته $\frac{p(x)}{q(x)}$ به گهڻ رقي هجي

3.1.2 ناطق اظهار جي وضاحت ڪريو جيئن $\frac{p(x)}{q(x)}$ ونڊ ايت آهي $p(x)$ ۽ $q(x)$ جي، جتي $q(x) \neq 0$

جيئن اسين ڄاڻون ٿا $\frac{p(x)}{q(x)}$ صورت ۾ جتي $p(x)$ ۽ $q(x)$ ٻه گهڻ رقيون آهن، $q(x)$ غير

ٻڙي گهڻ رقي آهي. انڪي ناطق اظهار چئبو آهي.

مثال طور: $\frac{x^2-5}{3x^2+4} \neq 0$ ناطق اظهار آهن.

3.1.3 چڪاس ڪريو ته ڏنل الجبري اظهار

(i) گهڻ رقي آهي يا نه (ii) ناطق اظهار آهي يا نه

هيٺيان مثال گهڻ رقي ۽ ناطق اظهارن کي سڃاڻڻ مدد ڪندا.

مثال 01

(i) $2x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}}$

(ii) $6x^3 - 4x^2 - 5x$

حل: (i) $2x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}}$

اهو گهڻ رقي اظهار نه آهي ڇاڪاڻ ته ٻي رقم کي سگهه واڌو سڄو عدد نه آهي.

حل: (ii) $6x^3 - 4x^2 - 5x$

اهو گهڻ رقي اظهار آهي ڇاڪاڻ ته هر رقم کي سگهه واڌو سڄو عدد آهي.

مثال 02 ناطق اظهار آهي يا نه

(i) $\frac{x-2}{3x^2+1}$

(ii) $6x^3 - \frac{1}{\sqrt{x+4}}$

حل (i) $\frac{x-2}{3x^2+1}$

انس ۽ چيد ٻئي گهڻ رقمي اظهار آهن، تنهنڪري اهو ناطق اظهار آهي.

حل (ii) $6x^3 - \frac{1}{\sqrt{x+4}}$

اهو ناطق اظهار نه آهي ڇاڪاڻ ته ٻي رقم جو چيد گهڻ رقمي اظهار نه آهي.

3.1.4 $\frac{p(x)}{q(x)}$ کي انجي سادي صورت ۾ وضاحت ڪريو جڏهن $p(x)$ ۽ $q(x)$ گهڻ رقمي

اظهار آهن انهن کي عددي سرامنڊ (Coefficient) سڃا عدد (Integral) آهن ۽ ڪو عام جزو (Common factor) نه آهي.

ناطق اظهار کي مختصر حالت ۾ تڏهن چونڊاسين جڏهن $p(x)$ ۽ $q(x)$ وٽ 1 کان علاوه ڪو به مشترڪ جزو نه آهي.

مثال طور: $\frac{x^2-1}{(x-1)^2}$ جي ننڍي ۾ ننڍي صورت $\frac{x+1}{x-1}$ آهي.

3.1.5 چڪاس ڪريو ته ڏنل ناطق الجبري اظهار سندس ننڍي ۾ ننڍي صورت

۾ آهي. $\frac{p(x)}{q(x)}$ ناطق اظهار جي چڪاس ڪرڻ لاءِ $p(x)$ ۽ $q(x)$ جا عام جزا

(Common factors) ڏسو.

جيڪڏهن عام جزو 1 آهي ته ناطق الجبري اظهار ننڍي صورت ۾ آهي

مثال طور: $\frac{x+1}{x-1}$ ننڍي ۾ ننڍي صورت ۾ آهي ڇاڪاڻ ته $x+1$ ۽ $x-1$ جو عام جزو 1 آهي.

3.1.6 ناطق اظهارن کي سندن سادي صورت ۾ آڻيو:

فرض ڪريو ته $\frac{p(x)}{q(x)}$ هڪ ناطق اظهار آهي جنهن ۾ $q(x) \neq 0$

قدم 1: جيڪڏهن ممڪن هجي ته $p(x)$ ۽ $q(x)$ اظهارن جا جزا لھو.

قدم 2: جيڪڏهن ممڪن هجي ته $p(x)$ ۽ $q(x)$ جا عام جزا لھو.

قدم 3: $p(x)$ ۽ $q(x)$ جا عام جزا پاڻ ۾ ڪٽيو.

مثال 01 هيٺين ناطق اظهارن کي ساديءَ صورت ۾ آڻيو.

$$(i) \quad \frac{(x^2 - x)(x^2 - 5x + 6)}{2x(x^2 - 3x + 2)}$$

$$(ii) \quad \frac{5(x^2 - 4)}{(3x + 6)(x - 3)}$$

(i) حل:

$$\frac{(x^2 - x)(x^2 - 5x + 6)}{2x(x^2 - 3x + 2)}$$

$$= \frac{x(x-1)}{2x} \cdot \frac{x^2 - 3x - 2x + 6}{x^2 - 2x - x + 2}$$

$$= \left(\frac{x-1}{2} \right) \cdot \left\{ \frac{x(x-3) - 2(x-3)}{x(x-2) - 1(x-2)} \right\}$$

$$= \frac{(x-1)(x-3)(x-2)}{2(x-2)(x-1)}$$

$$= \frac{(x-3)}{2}$$

$= \frac{1}{2}(x-3)$ گهريل سادي صورت آهي.

(ii) حل:

$$\frac{5(x^2 - 4)}{(3x + 6)(x - 3)}$$

$$= \frac{x^2 - 4}{x - 3} \cdot \frac{5}{3x + 6}$$

$$= \frac{x^2 - 2^2}{x - 3} \cdot \frac{5}{3(x+2)}$$

$$= \frac{(x+2)(x-2)}{x-3} \cdot \frac{5}{3(x+2)}$$

$$= \frac{(x+2)(x-2)}{x-3} \cdot \frac{5}{3(x+2)} \quad x \neq -2$$

$$= \frac{5(x-2)}{3(x-3)} \quad \text{گهريل سادي صورت آهي}$$

3.1.7. **ناطق اظهارن جي جوڙ، ڪٽ ۽ ضرب اپت لھو.**

ناطق اظهارن جي جوڙ، ڪٽ ۽ ضرب هيٺين مثالن جي مدد سان ڪبي آھي.

$$\frac{3}{x+1} + \frac{4x}{x^2-1}$$

مثال 01

حل:

$$\frac{3}{x+1} + \frac{4x}{x^2-1}$$

$$= \frac{3}{x+1} + \frac{4x}{(x-1)(x+1)} \quad \text{جزا}$$

$$= \frac{3(x-1) + 4x}{(x-1)(x+1)}$$


$$= \frac{3x-3+4x}{(x-1)(x+1)}$$

$$= \frac{7x-3}{(x-1)(x+1)}$$

$$x \neq 1, -1.$$

$$= \frac{7x-3}{x^2-1}$$

گهريل سادي صورت آهي



$$\frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{x^3-1}$$

مثال 02

حل:

$$= \frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{x^3-1}$$

$$= \frac{1}{(x-1)(x+1)} - \frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} \quad \text{جزا}$$

$$= \frac{(x^2+x+1)-(x+1)}{(x+1)(x-1)(x^2+x+1)}$$

$$= \frac{x^2+x+1-x-1}{(x+1)(x-1)(x^2+x+1)}$$

$$= \frac{x^2}{(x+1)(x^3-1)}$$

گهريل سادي صورت آهي

$$\frac{x^2}{x^2+x-12} \cdot \frac{x^2-9}{2x^2}$$

مثال 03

حل:

$$\frac{x^2}{x^2+x-12} \cdot \frac{x^2-9}{2x^2}, x \neq 0$$

$$= \frac{x^2}{x^2+4x-3x-12} \cdot \frac{(x-3)(x+3)}{2x^2}$$

$$= \frac{1}{x(x+4)-3(x-4)} \cdot \frac{(x-3)(x+3)}{2}$$

$$= \frac{1}{(x+4)(x-3)} \cdot \frac{(x-3)(x+3)}{2}$$

$$= \frac{(x+3)}{2(x+4)}$$

گهريل سادي صورت آهي

3.1.8 هڪ ناطق اظهار کي ٻئي ناطق اظهار سان ونڊ ڪري ساديءَ صورت ۾ آڻڻ:

هڪ ناطق اظهار کي ٻئي ناطق اظهار سان ونڊ ڪرڻ جي ترتيب، پهرين ونڊ کي

ضرب ۾ بدلائي ساديءَ صورت ۾ آڻبو:

$$\frac{3x-9y}{2x+10y} \div \frac{x^2-3xy}{4x+20y}$$

مثال 01

حل:

$$\frac{3x-9y}{2x+10y} \div \frac{x^2-3xy}{4x+20y}$$

$$= \frac{3x-9y}{2x+10y} \times \frac{4x+20y}{x^2-3xy}$$

ضرب ۾ بدلائڻ

$$= \frac{3(x-3y)}{2(x+5y)} \times \frac{4(x+5y)}{x(x-3y)} = \frac{6}{x}$$

گهربل سادي صورت آهي

3.1.9 ڪجهه مخصوص حقيقي عددن سان آڱري اظهارن جو ملهه لهو:

ڪجهه مخصوص حقيقي عددن سان آڱري اظهارن جو ملهه لهڻ هيٺ ڏنل مثالن ۾ واضح ڪيل آهي.

$$z = -1 \text{ ۽ } y = 2, x = 3 \text{ جڏهن } \frac{x^2 + yz}{x^3 + y^2 - 7yz^4}$$

مثال 01

$$z = -1 \text{ ۽ } y = 2, x = 3$$

مليل

حل

$$= \frac{x^2 + yz}{x^3 + y^2 - 7yz^4}$$

$$= \frac{(3)^2 + (2)(-1)}{(3)^3 + (2)^2 - 7(2)(-1)^4}$$

$$= \frac{9-2}{27+4-14} = \frac{7}{17}$$

مشق 3.1

1. ٻڌايو ته هيٺ آڱري اظهار گهڻ رقمي آهن يا نه:

(i) $2xy^2 - 3x^2 + 5y^3 - 6$


(ii) $3xy^{-2}$

(iii) $6x^2 - 10x + x - \sqrt{45}$

(iv) $5\sqrt{x} - x + 5x^2$

(v) $\frac{2}{x+2}$

(vi) $\frac{2}{x} + x^3 - 2$



2. ہڈایو ته هیث ڈنل الجبری اظهار ناطق آهن یا نه:

$$(i) \frac{x^2 + 2x + 3}{x - 4}$$

$$(ii) \frac{x^2 + 5\sqrt{x} - 2x}{3x^2 + 5x + 4}$$

$$(iii) \frac{13x^2 - 9x + 4}{x^2 + 5x + \sqrt{7}}$$

$$(iv) \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$$

$$(v) \frac{7}{x+7}$$

$$(vi) 5\sqrt{x} - x + 5x^2$$

3. هینیان سادیء صورت یر آئیو:

$$(i) \frac{p^2 - 100}{p^2 + 10}$$

$$(ii) \frac{3ab - 3a^2}{3a^2 + 6ab + 3ab^2}$$

$$(iii) \frac{(a-b)}{(a+b)} \times \frac{(a^2 + ab)}{(2a^2 - 2b^2)}$$

$$(iv) \frac{(x+y)^2 - z^2}{x+y+z}$$

$$(v) \frac{(m^2 - 6m)(3m + 15)}{2m - 12}$$

$$(vi) \frac{4t^2 - 36t + 80}{(4t - t^2)(5 - t)}$$

$$(vii) \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - x - 2}$$

$$(viii) \frac{4x^2 + 24x + 36}{3x^2 - 27}$$

$$(ix) \frac{(y+z)(y^2 - 2yz + z^2)}{y^2 + yz}$$

4. هینیان سادیء صورت یر آئیو:

$$(i) \frac{4x-1}{2x-2} + \frac{4x+1}{2x+2}$$

$$(ii) \frac{1}{x+2} + \frac{2}{x+3}$$

$$(iii) \frac{y^2 - 25}{y^2 - 5y} + \frac{y}{5y^2 - 5y}$$

$$(iv) \frac{xy}{xy+1} + \frac{xy+1}{xy-1}$$

$$(v) \frac{4}{z^2 - 4z - 5} + \frac{2}{4z^2 - 4} \quad (vi) \frac{1}{a+b} - \frac{1}{a-b} + \frac{2a}{a^2 - b^2}$$

$$(vii) \frac{4y}{y^2 - 1} + \frac{y+1}{y-1} + \frac{y-1}{y+1}$$

$$(viii) \frac{1}{2x+y} + \frac{1}{2x-y} + \frac{1}{4x^2 - y^2}$$

$$(ix) \frac{x-2}{x^2 + 6x + 9} - \frac{x-2}{2x^2 - 18}$$

$$(x) \frac{1}{a-1} + \frac{1}{a-3} + \frac{1}{a+1} + \frac{1}{a+3}$$

5. سادیء صورت یر آئیو:

$$(i) \left(\frac{x^2}{4y^2 - x^2 + 1} \right) \div \left(1 - \frac{x}{2y} \right)$$

$$(ii) \frac{x+3}{3y-2x} \cdot \frac{4x^2 - 9y^2}{xy+3y}$$

$$(iii) \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1} \times \frac{x+1}{x-1} \right)$$

$$(iv) \frac{8(y+3)}{9} \times \frac{12(y+1)}{4(y+3)} \div \frac{8(y+1)}{5}$$

$$(v) \frac{q^2 - 25}{q^2 - 3q} \div \frac{q^2 + 5q}{q^2 - 9}$$

$$(vi) \frac{4}{z^2 - 4z - 5} \div \frac{2}{4z^2 - 4}$$

6. $t + \frac{1}{t}$ جو مله لھو، جڏهن $t = \frac{x-y}{x+y}$ هجي.

7. هيٺين جو مله لھو:

(i) $\frac{5(x+y)}{3x^2\sqrt{y}+6}$, if $x = -4, y = 9$

(ii) $\frac{42ab^2c^3}{3a^2b+1}$, if $a = 3, b = 2$ and $c = 1$

(iii) $\frac{(x+y)^3 - z^2}{x^2y^2 + z^2}$, if $x = 2, y = -4$ and $z = 3$,

(iv) $\frac{3x^2y}{z} - \frac{bc}{x+1}$, if $x = 2, y = -1, z = 3, b = 4, c = \frac{1}{3}$

(v) $\frac{(ab^2 - c)}{(a + cd^2)} \times \frac{(c + d)}{(a^2b - d)}$, if $a = 1, b = 3, c = -3$ and $d = 2$.

3.2 آڱبري فارمولا

اسان گذريل ڪلاس ۾ ڪجهه آڱبري فارمولا پڙهيا ۽ استعمال ڪيا آهن، هاڻي ڪجهه نوان فارمولا سکنداسين ۽ لاڳو ڪندا سين:

3.2.1 فارمولا ڄاڻو:

$$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2) \quad (i)$$

چڪاس

$$\text{L.H.S} = (a+b)^2 + (a-b)^2$$

$$= a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - 2ab + b^2$$

$$= 2a^2 + 2b^2$$

$$\text{L.H.S} = 2(a^2 + b^2) = \text{R.H.S}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab \quad (ii)$$

چڪاس

$$\text{L.H.S} = (a+b)^2 - (a-b)^2$$


$$= a^2 + 2ab + b^2 - (a^2 - 2ab + b^2)$$

$$= a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2$$

$$\text{L.H.S} = 4ab = \text{R.H.S}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



مثال 01 ھینین مثالن ۾ طریقو واضح کیل آھی

(i) $a^2 + b^2$ (ii) ab جو مله لھو، جڏهن $a + b = 6$ ۽ $a - b = 4$

(i) گهريل $a^2 + b^2 = ?$

حل: مليل $a + b = 6$ ۽ $a - b = 4$

اسان کي معلوم آهي ته $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$

جو مله وجهڻ سان $a + b = 6$ ۽ $a - b = 4$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (6)^2 + (4)^2 &= 2(a^2 + b^2), \\ \Rightarrow 36 + 16 &= 2(a^2 + b^2) \\ \Rightarrow 52 &= 2(a^2 + b^2) \\ \Rightarrow 26 &= a^2 + b^2 \\ \Rightarrow \boxed{a^2 + b^2 = 26} \end{aligned}$$

(ii) گهريل $ab = ?$

$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$

جو مله وجهڻ سان $a + b = 6$ ۽ $a - b = 4$

$$\begin{aligned} \therefore (6)^2 - (4)^2 &= 4ab, \\ \Rightarrow 36 - 16 &= 4ab, \\ \Rightarrow 20 &= 4ab, \\ \Rightarrow 5 &= ab, \\ \Rightarrow \boxed{ab = 5} \end{aligned}$$

جيئن ته $a^2 + b^2 = 26$ ۽ $ab = 5$

3.3.2 فارمولا ڄاڻو:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$\begin{aligned} (a + b + c)^2 &= (a + b + c)(a + b + c) \\ &= a(a + b + c) + b(a + b + c) + c(a + b + c) \\ &= a^2 + ab + ac + ab + b^2 + bc + ac + bc + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \end{aligned}$$

مثال 01 $a^2 + b^2 + c^2$ جو مله لھو، جڏهن $a + b + c = 7$ ۽ $ab + bc + ca = 15$

حل: $a^2 + b^2 + c^2 = ?$ گهريل

اسان کي معلوم آهي ته $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$

هاڻي $a + b + c = 7$ ۽ $ab + bc + ca = 15$ جو مله وجهڻ سان

$$\therefore (7)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(15)$$

$$\Rightarrow 49 = a^2 + b^2 + c^2 + 30$$

$$\Rightarrow 49 - 30 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow 19 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow \boxed{a^2 + b^2 + c^2 = 19}$$

جيئن ته $(a^2 + b^2 + c^2)$ جو مله 19 آهي.

مثال 02 $(a + b + c)$ جو مله لھو، جڏهن $a^2 + b^2 + c^2 = 38$ ۽ $ab + bc + ac = 31$ هجي.

حل: مليل $a^2 + b^2 + c^2 = 38$ ۽ $ab + bc + ac = 31$

اسان کي معلوم آهي ته $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$

$a^2 + b^2 + c^2 = 38$ ۽ $ab + bc + ac = 31$ جو مله وجهڻ سان

$$(a + b + c)^2 = 38 + 2(31)$$

$$\Rightarrow (a + b + c)^2 = 38 + 62$$

$$\Rightarrow (a + b + c)^2 = 100$$

$$\Rightarrow (a + b + c) = (\pm \sqrt{100})$$

$$\Rightarrow \boxed{(a + b + c) = \pm 10}$$

جيئن ته $(a + b + c)$ جو مله ± 10 آهي.

مثال 03 $(ab + bc + ac)$ جو مله لھو، جڏهن $a + b + c = 8$ ۽ $a^2 + b^2 + c^2 = 20$ هجي.

حل: مليل $a^2 + b^2 + c^2 = 20$ ۽ $a + b + c = 8$

اسان کي معلوم آهي ته $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$

$a^2 + b^2 + c^2 = 20$ ۽ $a + b + c = 8$ جو مله وجهڻ سان

$$(8)^2 = 20 + 2(ab + bc + ac)$$

$$\Rightarrow 64 = 20 + 2(ab + bc + ac)$$

$$\Rightarrow 64 - 20 = 2(ab + bc + ac)$$

$$\Rightarrow 44 = 2(ab + bc + ac)$$

$$\Rightarrow 22 = ab + bc + ac$$

$$\Rightarrow ab + bc + ac = 22$$

جيئن ته $(ab + bc + ac)$ جو مله 22 آهي.

3.2.3: کعب جو فارمولا:

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b) \quad (i)$$

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2 \quad \text{چکاس}$$

$$\begin{aligned} &= (a + b)(a^2 + 2ab + b^2) \\ &= a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2 \\ &= a^3 + b^3 + 3ab(a + b) \end{aligned}$$

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b) \quad (ii)$$

$$(a - b)^3 = (a - b)(a - b)^2 \quad \text{چکاس}$$

$$\begin{aligned} &= (a - b)(a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2 \\ &= a^3 - b^3 - 3ab(a - b) \end{aligned}$$

هيٺيان مثال کعب جي فارمولا جو استعمال سمجھڻ لاءِ ڪارائتا آهن:

مثال 01 $a^3 + b^3$ جو ملهه لھو، جڏھن $a + b = 4$ ۽ $ab = 5$ ھجي.

مليل $a + b = 4$ ۽ $a^3 + b^3$

حل

اسان کي معلوم آهي ته $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$

$a + b = 4$ ۽ $ab = 5$ جو ملهه رچھڻ سان

$$(4)^3 = a^3 + b^3 + 3(5)(4)$$

$$\Rightarrow 64 = a^3 + b^3 + 60$$

$$\Rightarrow 64 - 60 = a^3 + b^3$$

$$\Rightarrow 4 = a^3 + b^3$$

$$\Rightarrow \boxed{a^3 + b^3 = 4}$$

جيئن ته $(a^3 + b^3)$ جو ملهه 4 آهي.

مثال 02 ab جو مله لھو، جڏهن $a^3 - b^3 = 5$ ۽ $a - b = 5$ هجي.

حل: مليل: $a - b = 5$ ۽ $a^3 - b^3 = 5$

اسان کي معلوم آهي ته $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

$a - b = 5$ ۽ $a^3 - b^3 = 5$ جو مله وجهڻ سان

$$\begin{aligned} (5)^3 &= 5 - 3ab(5) \\ \Rightarrow 125 &= 5 - 15ab \\ \Rightarrow 125 - 5 &= -15ab \\ \Rightarrow 120 &= -15ab \\ \Rightarrow -8 &= ab \\ \Rightarrow \boxed{ab = -8} \end{aligned}$$

جيئن ته ab جو مله -8 آهي

مثال 03 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ جو مله لھو، جڏهن $x + \frac{1}{x} = 3$ هجي.

حل: مليل $x + \frac{1}{x} = 3$

ٻنهي پاسن ڪعب لڳائڻ سان $\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = 3^3$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 27 \quad \left[(a+b)^3 = a^3 + b^3 - 3ab(a+b) \right]$$


$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(3) = 27$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 9 = 27$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} = 27 - 9$$

$$\Rightarrow \boxed{x^3 + \frac{1}{x^3} = 18}$$

جيئن ته $x^3 + \frac{1}{x^3}$ جو مله 18 آهي.



مثال 04 $8x^3 - \frac{1}{x^3}$ جو مله لهو، جڏهن $2x - \frac{1}{x} = 4$ هجي.

حل: مليل $2x - \frac{1}{x} = 4$

ٻنهي پاسن ڪعب لڳائڻ سان $(2x - \frac{1}{x})^3 = (4)^3$

$$(2x)^3 - (\frac{1}{x})^3 - 3(2x)(\frac{1}{x})(2x - \frac{1}{x}) = 64$$

$$8x^3 - \frac{1}{x^3} - 6(4) = 64$$

$$8x^3 - \frac{1}{x^3} - 24 = 64 \Rightarrow 8x^3 - \frac{1}{x^3} = 88$$

جيئن ته $8x^3 - \frac{1}{x^3}$ جو مله 88 آهي.

3.2.4: ڪعب جو فارمولا:

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \quad (i)$$

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad \text{چڪاس} \\ &= a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3 \end{aligned}$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad (ii)$$

$$\begin{aligned} a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad \text{چڪاس} \\ &= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - b^3 \end{aligned}$$

مثال 01 $\left(x + \frac{1}{x}\right)$ ۽ $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 1\right)$ جي ضرب ايت لهو.

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right) \quad \text{حل:}$$

$$\therefore (a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3}$$

مثال 02 $\left(x - \frac{1}{x}\right)$ ۽ $\left(x^2 + 1 + \frac{1}{x^2}\right) = x^3 - \frac{1}{x^3}$ جي ضرب ايت لھو.

حل:

$$\left(x - \frac{1}{x}\right) \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$\therefore (a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right) \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x^2}\right) = x^3 - \frac{1}{x^3}$$

مثال 03 $(x+y)(x^2-xy+y^2)$ ۽ $(x-y)(x^2+xy+y^2)$ جي لاڳيتي ضرب ايت لھو.

حل:


$$(x+y)(x^2-xy+y^2)(x-y)(x^2+xy+y^2)$$

$$= (x^3+y^3)(x^3-y^3) \quad [\because (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3]$$

$$= x^6 - y^6.$$

مشق 3.2

1. $a-b$ جو ملھ لھو، جڏھن $a+b=9$ ۽ $ab=20$ ھجي.
2. $a-b$ جو ملھ لھو، جڏھن $a+b=5$ ۽ $ab=-6$ ھجي.
3. a^2+b^2 ۽ ab جو ملھ لھو، جڏھن $a+b=8$ ۽ $a-b=6$ ھجي.
4. a^2+b^2 ۽ ab جو ملھ لھو، جڏھن $a+b=5$ ۽ $a-b=3$ ھجي.
5. $a^2+b^2+c^2$ جو ملھ لھو، جڏھن $a+b+c=9$ ۽ $ab+bc+ac=13$ ھجي.
6. $a^2+b^2+c^2$ جو ملھ لھو، جڏھن $a+b+c=\frac{1}{3}$ ۽ $ab+bc+ac=-\frac{2}{9}$ ھجي.
7. $a+b+c$ جو ملھ لھو، جڏھن $a^2+b^2+c^2=29$ ۽ $ab+bc+ac=10$ ھجي.
8. $a+b+c$ جو ملھ لھو، جڏھن $a^2+b^2+c^2=0.9$ ۽ $ab+bc+ac=0.8$ ھجي.
9. $ab+bc+ac$ جو ملھ لھو، جڏھن $a+b+c=10$ ۽ $a^2+b^2+c^2=20$ ھجي.
10. a^3+b^3 جو ملھ لھو، جڏھن $a+b=4$ ۽ $ab=3$ ھجي.
11. ab جو ملھ لھو، جڏھن $a^3-b^3=16$ ۽ $a-b=4$ ھجي.
12. ab جو ملھ لھو، جڏھن $a^3-b^3=5$ ۽ $a-b=5$ ھجي.
13. a^3-b^3 جو ملھ لھو، جڏھن $a-b=5$ ۽ $ab=7$ ھجي.



14. $125x^3 + y^3$ جو مله لهو، جڏهن $5x + y = 13$ ۽ $xy = 10$ هجي.

15. $216a^3 - 343b^3$ جو مله لهو، جڏهن $6a - 7b = 11$ ۽ $ab = 8$ هجي.

16. $x^3 + \frac{1}{x^3}$ جو مله لهو، جڏهن $x + \frac{1}{x} = 7$ هجي.

17. $x^3 - \frac{1}{x^3}$ جو مله لهو، جڏهن $x - \frac{1}{x} = 11$ هجي.

18. مناسب فارمولا جي مدد سان لاڳيتي ضرب ايت لهو.

(i) $(2x^2 + 3y^2)(4x^4 - 6x^2y^2 + 9y^4)$

(ii) $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^4 + y^4)$

(iii) $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4)$

(iv) $(2x + 3y)(2x - 3y)(4x^2 + 9y^2)(16x^4 + 81y^4)$

19. ٻڌايو ته هيٺ ڏنل الجبري اظهار گهڻ رقمي آهن يا نه:

(i) $\left(\frac{3}{2}b + \frac{2}{3b}\right)\left(\frac{9b^2}{4} + \frac{4}{9b^2} - 1\right)$ (ii) $\left(\frac{7y^2}{9} + \frac{9}{7y^2}\right)\left(\frac{49y^4}{81} + \frac{81}{49y^4} - 1\right)$

(iii) $\left(\frac{x^4}{12} + \frac{12}{x^4}\right)\left(\frac{x^8}{144} + \frac{144}{x^8} + 1\right)$ (iv) $\left(c^2 - \frac{1}{c^2}\right)\left(c^4 + \frac{1}{c^4} + 1\right)$

3.3 غير ناطق عددي اظهار (Surds) ۽ انهن جو استعمال

3.3.1 غير ناطق عددي اظهار (Surds) جي سڃاڻپ ۽ انهن جو استعمال

وصف: اهڙو عددي اظهار جنهن ۾ موجود رقمن ۾ گهڻ ۾ گهڻ هڪ رقم تي ٻئي مول جي نشاني هجي انکي ”غير ناطق عددي اظهار“ (Surd) چئبو آهي.

مثال طور: $\sqrt{2}, \sqrt{a-4}, \sqrt[3]{\frac{5}{10}}, \left(\frac{1}{3} + \sqrt{3}\right), \left(\sqrt[5]{2} - \frac{1}{2}\right)$ غير ناطق عددي اظهار (Surds) آهن.

سڃاڻپ (سرد Surds) غير ناطق عددي اظهار آهن.

جيڪڏهن $\sqrt[n]{a}$ هڪ غير ناطق عدد هجي ۽ a مڪمل n^{th} وين سگهه نه هجي ته انکي n^{th} ترتيب جو غير ناطق عدد چئبو. $\sqrt[n]{a}$ حل هڪ غير ناطق عدد آهي ان کي غير ناطق مول ۽ ناطق مول جو پايو چئبو آهي.

مثال طور: $\sqrt[5]{\frac{5}{7}}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{6}, \sqrt[5]{2}, \sqrt[7]{10}$ 2nd, 3rd, 4th, 5th ۽ 7th ترتيب جا سرڊ Surds آهن. پر $\sqrt[3]{27}$ ۽ $\sqrt{\frac{1}{4}}$ سرڊ (Surds) نه آهن. ڇاڪاڻ ته آهي عدد 3 ۽ $\frac{1}{2}$ جي نمائندگي ڪن ٿا جيڪي غير ناطق عدد نه آهن.

3.3.2 بي درجي جو غير ناطق عددن (Surd of the second order) جي وضاحت ڪريو. ٻئي درجي جي غير ناطق عددن کي بنيادي عمل استعمال ڪري، ڇيڊن کي ناطق ڪري انجو جائزو وٺو.

(a) **بي ترتيب جو غير ناطق عددي اظهار (Surd of the second order)**

(i) هڪ غير ناطق اظهار جيڪو هڪ رقم وارو هجي انکي هڪ رقمي غير ناطق اظهار (Monomial Surd) چئبو آهي.

مثال طور: $\sqrt{\frac{4}{5}}, \sqrt{a-9}, \sqrt{53}$ وغيره بي درجي جا هڪ رقم وارو غير ناطق اظهار آهن.

(ii) هڪ غير ناطق عدد جيڪو ٻن هڪ رقمي غير ناطق اظهارن جو جوڙ يا فرق رکي يا هڪ رقمي غير ناطق اظهار ۽ ناطق اظهار جو جوڙ هجي انکي ٻه درجي ناطق اظهار (Binomial Surd) چئبو آهي.

مثال طور: $\sqrt{17} + \sqrt{11}, \sqrt{2} - 13, \sqrt{3} - 35$ وغيره بي ترتيب جا ٻه درجي غير ناطق عدد آهن. (iii) ٻه درجي غير ناطق اظهارن جو ميل (Conjugate of Binomial Surds) اظهار جانمونا.

(a) $(\sqrt{a} + c\sqrt{b})$ ۽ $(\sqrt{a} - c\sqrt{b})$ هڪٻئي جا غير ناطق ميل (زوج) (Conjugate) آهن.


(b) $a + \sqrt{b}$ ۽ $a - \sqrt{b}$ هڪٻئي جا غير ناطق ميل (زوج) (Conjugate) آهن.

(b) **بي ترتيب جي غير ناطق اظهارن تي بنيادي عمل، انجي ڇيڊن کي ناطق اظهارن ۾ بدلائڻ ۽ انهن جو ملهه لهڻ.**

(i) **غير ناطق اظهارن (Surds) جي جوڙ ۽ ڪٽ**

غير ناطق اظهارن (Surds) جي جوڙ ۽ ڪٽ ڪرڻ لاءِ هيٺيان قاندا استعمال ڪري سگهجن ٿا.

مثال طور: $a\sqrt{c} - b\sqrt{c} = (a-b)\sqrt{c}$ ۽ $a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a+b)\sqrt{c}$



مثال 01 $\sqrt{343} - 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7}$ ساديء صورت ۾ آڻيو:

حل:

$$\begin{aligned} & \sqrt{343} - 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} \\ &= \sqrt{7 \times 7 \times 7} - 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} \\ &= 7\sqrt{7} - 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} \\ &= (7 - 3 - 2)\sqrt{7} \\ &= (7 - 5)\sqrt{7} \\ &= 2\sqrt{7} \end{aligned}$$

مثال 02 $\sqrt{32} + 5\sqrt{2} + \sqrt{128} + 7\sqrt{2}$ ساديء صورت ۾ آڻيو:

حل:

$$\begin{aligned} & \sqrt{32} + 5\sqrt{2} + \sqrt{128} + 7\sqrt{2} \\ &= \sqrt{16 \times 2} + 5\sqrt{2} + \sqrt{64 \times 2} + 7\sqrt{2} \\ &= \sqrt{(4)^2 \times 2} + 5\sqrt{2} + \sqrt{(8)^2 \times 2} + 7\sqrt{2} \\ &= 4\sqrt{2} + 5\sqrt{2} + 8\sqrt{2} + 7\sqrt{2} \\ &= (4 + 5 + 8 + 7)\sqrt{2} \\ &= 24\sqrt{2} \end{aligned}$$

(ii) غير ناطق اظهارن (Surds) جي ضرب ۽ ونڊ

غير ناطق اظهارن (Surds) جي ضرب ۽ ونڊ ڪرڻ لاءِ هيٺيان قاندا استعمال ڪري سگهجن ٿا.

(a) $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ (b) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$, $a > 0$ ۽ $b > 0$

مثال 01 $\sqrt{125} \times \sqrt{48}$ ساديء صورت ۾ آڻيو:

حل:

$$\begin{aligned} & \sqrt{125} \times \sqrt{48} \\ &= \sqrt{(5)^2 \times 5} \times \sqrt{(4)^2 \times 3} \\ &= 5\sqrt{5} \times 4\sqrt{3} \\ &= (5 \times 4)(\sqrt{5} \times \sqrt{3}) \\ &= 20\sqrt{15} \end{aligned}$$

مثال 02 ساديء صورت ۾ آڻيو:

حل:

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{162}}{\sqrt{144}} \\ &= \frac{\sqrt{2 \times 81}}{\sqrt{12 \times 12}} \\ &= \frac{\sqrt{2 \times (9)^2}}{\sqrt{(12)^2}} = \frac{9\sqrt{2}}{12} = \frac{3\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

مشق 3.3

ساديء صورت ۾ آڻيو:

1.

$$\begin{aligned} \text{(i)} & \sqrt[4]{81x^{-8}z^4} & \text{(ii)} & \sqrt[3]{256a^6b^{12}c^9} & \text{(iii)} & \sqrt[7]{128} & \text{(iv)} & \sqrt{7776} \\ \text{(v)} & \frac{\sqrt[3]{(125)^2 \times 8}}{\sqrt{(2 \times 32)^2}} & \text{(vi)} & \frac{\sqrt{21} \times \sqrt{28}}{\sqrt{121}} & \text{(vii)} & \frac{(216)^{\frac{2}{3}} \times (125)^{\frac{1}{2}}}{(0.04)^{\frac{-3}{2}}} \end{aligned}$$

$$\text{(viii)} \frac{\sqrt[5]{4} \times \sqrt[3]{27} \times \sqrt{60}}{\sqrt{180} \times \sqrt[3]{0.25} \times \sqrt[4]{9}}$$

هينين جو ميل (زوج) (Conjugate) ٺاهو.


2.

$$\begin{aligned} \text{(i)} & (8 - 4\sqrt{3}) & \text{(ii)} & (6\sqrt{6} + 2\sqrt{3}) & \text{(iii)} & (8\sqrt{12} + \sqrt{8}) & \text{(iv)} & (2 - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

ساديء صورت ۾ آڻيو:

3.

$$\begin{aligned} \text{(i)} & (6\sqrt{3} + 4\sqrt{2} + 7\sqrt{128}) & \text{(ii)} & \frac{\sqrt{2}}{10} + \sqrt{8} \\ \text{(iii)} & (13 + 15\sqrt{3}) + (7 - 6\sqrt{3}) & \text{(iv)} & \sqrt{250} + \sqrt{490} + 3\sqrt{10} \\ \text{(v)} & \sqrt{245} + \sqrt{625} - \sqrt{45} & \text{(vi)} & 10\sqrt{11} - \sqrt{396} - 3\sqrt{11} \\ \text{(vii)} & \sqrt{17}(10\sqrt{17} - 2\sqrt{17}) & \text{(viii)} & \frac{3}{2}(\sqrt{18} + \sqrt{32} - \sqrt{50}) \\ \text{(ix)} & \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) & \text{(x)} & (\sqrt{13} + \sqrt{11})(\sqrt{13} - \sqrt{11}) \\ \text{(xi)} & (3\sqrt{6} - 4\sqrt{5})^2 & \text{(xii)} & (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})^2 \end{aligned}$$



4. ساديء صورت ۾ آڻيو:

(i) $\sqrt{32} - \sqrt{8}$ (ii) $8\sqrt{243} - 2\sqrt{27}$ (iii) $\frac{3}{2}\sqrt{18} - \frac{3}{8}\sqrt{32} - \frac{6}{4}\sqrt{50}$
 (iv) $10\sqrt{289}$ (v) $3\sqrt{2} + \sqrt{8}$ (vi) $(3\sqrt{27} - 5\sqrt{3}) + (\sqrt{3} + \sqrt{27})$

3.4 ناطق ڪرڻ (Rationalization)

3.4.1 غير ناطق اظهارن تي حقيقي عددن جي ناطق ڪرڻ جا نمونا $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$, $\frac{1}{a + b\sqrt{x}}$

۽ انهن جا مجموعا، جتي x, y قدرتي عدد آهن ۽ $(a$ ۽ $b)$ سڃا عدد آهن.

جيڪڏهن ٻن غير ناطق اظهارن (Surds) جي ضرب اپت هڪ ناطق عدد آهي ته هر غير ناطق اظهار هڪٻئي جو ناطق ڪندڙ جزو سڏبو.

مثال طور: $(35 - \sqrt{31})$ ۽ $(35 + \sqrt{31})$

ڏنل غير ناطق اظهارن جي پنهنجي ناطق ڪندڙ جزي سان ضرب جو عمل سان ناطق عدد ضرب اپت جي طور تي حاصل ڪرڻ کي ناطق ڪندڙ چئبو آهي.

غير ناطق اظهارن ميل (Conjugate surds) جي ضرب اپت هڪ ناطق عدد آهي.

مثال 01 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ جي ضرب اپت لھو:

حل: $(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ ۽ $(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

$$= (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2$$

جيڪو هڪ ناطق عدد آهي $3 - 2 = 1$

چيڊن جو ناطق ٿيڻ (Rationalization of denominator)

مٿين بحث کي ذهن ۾ رکي، اسان نتيجو ڪڍيو ته $(a + b\sqrt{x})$ يا $(a - b\sqrt{x})$ نموني جي

هڪ چيڊ کي ناطق ڪرڻ لاءِ اسين ٻئي چيڊ ۽ انس جي ميل جزي (Conjugate) $(a + b\sqrt{x})$ يا

(factor) $(a - b\sqrt{x})$ سان ضرب ڪنداسين. ائين ڪرڻ سان اسان ٻئي مول کي خارج ڪيون ٿا

ٿا ۽ اهڙيءَ طرح چيڊ کي ڪنهن به غير ناطق اظهار (Surd) کان آزاد حاصل ڪري سگهون ٿا.

حقيقي عددن جي ناطق ٿيڻ جا نمونا (Rationalization of real numbers of the types)

(i) $\frac{1}{a + b\sqrt{x}}$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$

هيٺيان مثال ناطق ڪرڻ جي تصور (Concept of Rationalization) کي سمجھڻ ۾ مدد ڪندا.

مثال 01 $\frac{1}{5+2\sqrt{3}}$ ناطق ڪريو:

چيدڪي $5-2\sqrt{3}$ سان ان جي ميل $5+2\sqrt{3}$ کي ضرب ۽ ونڊ ڪريو.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{5+2\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{5+2\sqrt{3}} \times \frac{5-2\sqrt{3}}{5-2\sqrt{3}} \\ &= \frac{5-2\sqrt{3}}{(5)^2 - (2\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{5-2\sqrt{3}}{25-12} \\ &= \frac{5-2\sqrt{3}}{13} \\ &= \frac{5}{13} - \frac{2}{13}\sqrt{3} \end{aligned}$$

مثال 02 $\frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ ناطق ڪريو:

حل:

$$\begin{aligned} \frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} &= \frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \\ &= \frac{5(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{5(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{3-2} \\ &= \frac{5(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{1} \\ &= 5(\sqrt{3}-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

مشق 3.4

1. هيٺين جو ميل (Conjugate) ٺاهو.

- (i) $\sqrt{6} - 2$ (ii) $10 + \sqrt{10}$ (iii) $3 - 2\sqrt{2}$
 (iv) $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$ (v) $5\sqrt{10} + \sqrt{3}$ (vi) $4\sqrt{5} - \sqrt{11}$
 (vii) $\sqrt{11} + \sqrt{7}$ (viii) $9 - 3\sqrt{7}$

2. هيٺين جي چيد کي ناطق ڪريو:

- (i) $\frac{1}{\sqrt{2} + 10}$ (ii) $\frac{1}{3 + 2\sqrt{5}}$ (iii) $\frac{1}{4\sqrt{3} - 3\sqrt{6}}$
 (iv) $\frac{16}{\sqrt{12} + \sqrt{11}}$ (v) $\frac{9 - \sqrt{2}}{9 + \sqrt{2}}$ (vii) $\frac{\sqrt{13} + 3}{\sqrt{13} - 3}$
 (viii) $\frac{15}{7 - 2\sqrt{5}}$ (viii) $\frac{11 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} + 11}$ (ix) $\frac{1}{\sqrt{17} + 4}$ (x) $\frac{1}{\sqrt{17} - 4}$

3. (i) جيڪڏهن $x = 8 - 3\sqrt{7}$ ته $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ ٺاهو.

(ii) جيڪڏهن $\frac{1}{x} = 2\sqrt{28} - 11$ ته x ٺاهو.

(iii) جيڪڏهن $x = 3 - 2\sqrt{2}$ ته $x^2 - \frac{1}{x^2}$, $x^2 + \frac{1}{x^2}$, $x - \frac{1}{x}$, $x + \frac{1}{x}$ ۽ $x^4 + \frac{1}{x^4}$ ٺاهو.


4. هيٺيان ساديءَ صورت ۾ آڻيو:

- (i) $\frac{\sqrt{x+3} + \sqrt{x-3}}{\sqrt{x+3} - \sqrt{x-3}}$ (ii) $\frac{\sqrt{y^2 + 5} - y}{\sqrt{y^2 + 5} + y}$ (iii) $\frac{10}{6 - \sqrt{y^2 + 36}}$
 (iv) $\frac{5}{6 + \sqrt{y^2 + 36}}$ (v) $\frac{15}{3 - 2\sqrt{2}} - \frac{5}{3 + 2\sqrt{2}}$
 (vi) $\frac{6}{12 + \sqrt{6}} - \frac{3}{12 - \sqrt{6}}$

مشق ورجايو 3

1. درست جوابن تي گول پايو:

- (i) هر گهڻ رقمي آهي: (a) هڪ غير ناطق اظهار (b) هڪ ناطق اظهار (c) هڪ جملو (d) انهن مان ڪو به نه
- (ii) هڪ اهڙو غير ناطق عدد جيڪو ٻن هڪ رقمي غير ناطق اظهارن جو جوڙ هجي انکي چئبو آهي: (a) ته رقمي غير ناطق اظهار (b) به رقمي غير ناطق اظهار (c) غير ناطق اظهار جو ميل (d) هڪ رقمي غير ناطق اظهار
- (iii) $3x + 2y - 3$ هڪ آجبري: (a) اظهار (b) مساوات (c) جملو (d) غير مساوات
- (iv) $3x^2y + 5y^4 - 10$ جو درجو آهي: (a) 4 (b) 5 (c) 3 (d) 10
- (v) $\sqrt{7}$ آهي: (a) هڪ رقمي غير ناطق اظهار جو (b) ته رقمي غير ناطق اظهار جو (c) به رقمي غير ناطق اظهار جو (d) غير ناطق اظهار جي ميل جو
- (vi) ٻن گهڻ رقمي اظهارن $p(x)$ ۽ $q(x)$ جي وٺايت $\frac{p(x)}{q(x)}$ حتي $q(x) \neq 0$ انکي چئبو آهي: (a) هڪ ناطق اظهار (b) هڪ غير ناطق اظهار (c) گهڻ رقمي (d) ميل (conjugate)
- (vii) $\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y}$ جي برابر آهي: (a) $\frac{2x}{x^2-y^2}$ (b) $\frac{2y}{x^2-y^2}$ (c) $\frac{-2x}{x^2-y^2}$ (d) $\frac{-2y}{x^2-y^2}$
- (viii) $2 - \sqrt{3}$ جو ميل آهي: (a) $2 + \sqrt{3}$ (b) $-2 - \sqrt{3}$ (c) $-2 + \sqrt{3}$ (d) $\sqrt{3} - 4$
- (ix) $a^3 - 3ab(a-b) - b^3$ جي برابر آهي: (a) $(a-b)^3$ (b) $(a+b)^3$ (c) $a^3 + b^3$ (d) $a^3 - b^3$
- (x) جيڪڏهن $a+b=5$ ۽ $a-b=3$ ته ab جو ملهه آهي: (a) 4 (b) 5 (c) 3 (d) 6



(xi) $(5 + \sqrt{15})(5 - \sqrt{15})$ جي برابر آهي:

(a) 10 (b) 15 (c) 25 (d) 30

(xii) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ جي برابر آهي:

(a) $(a + b - c)^2$ (b) $(a + b + c)^2$ (c) $(a - b + c)^2$ (d) $(a + b + c)^3$

1. خال ڀريو:

(i) ڪنهن به گهڻ رقميءَ جو درجو _____ آهي.

(ii) غير ناطق اظهار $2 - \sqrt{3}$ جو ميل (Conjugate) _____ آهي.

(iii) ڪنهن به گهڻ رقمي اظهار $2x^3 + x^2 - 4x^4 + 7x - 9$ جو درجو _____ آهي.

(iv) $\frac{\sqrt{x}}{3x+5}$ هڪ _____ اظهار آهي $x \neq \frac{-5}{3}$

(v) $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)$ جي برابر آهي _____

خلاصو

- ♦ هڪ گهڻ رقمي اظهار هڪ بدلجندڙ x ۾ لکي سگهجي ٿو.
- ♦ جيئن $a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \dots + a_{n-1}x^1 + a_n$ هڪ گهڻ رقمي اظهار اڪثر $p(x)$ طور ظاهر ڪبو آهي.
- ♦ هڪ الجبري اظهار جيڪو $\frac{p(x)}{q(x)}$ جي صورت ۾ لکي سگهجي ٿو، جتي $q(x) \neq 0$ ، $q(x)$ ۽ $p(x)$ ٻئي گهڻ رقمي اظهار آهن انکي x ۾ ناطق اظهار چئبو آهي.
- ♦ هڪ الجبري اظهار جيڪو $\frac{p(x)}{q(x)}$ جي صورت ۾ نٿو لکي سگهجي، جتي $q(x) \neq 0$ ، $q(x)$ ۽ $p(x)$ ٻئي گهڻ رقمي اظهار آهن انکي x ۾ غير ناطق اظهار چئبو آهي.
- ♦ هڪ گهڻ رقمي اظهار جيڪو صرف هڪ درجو رکي ٿو انکي هڪ درجي گهڻ رقمي چئبو آهي.
- ♦ هڪ گهڻ رقمي اظهار جيڪو ٻه درجا رکي ٿو انکي ٻه درجي گهڻ رقمي چئبو آهي.
- ♦ هڪ گهڻ رقمي اظهار جيڪو ٽي درجا رکي ٿو انکي ٽه درجي گهڻ رقمي چئبو آهي.

هڪ گهڻ رقمي اظهار جيڪو ٿي يا ٿي کان وڌيڪ درجا رکي ٿو انکي وڌيڪ رقمي چئبو آهي.

الجبري اظهار $\frac{p(x)}{q(x)}$ کي پنهنجي سادي صورت ۾ چئجي ٿو، جيڪڏهن $p(x)$ ۽ $q(x)$

گهڻ رقمي اظهار آهن بنهي جا عددي سرا (منڊ) سڄن عددن سان ۽ انهن کي ڪو به عام جزو (Common Factor) نه آهي.

$$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2) \text{ ۽ } (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$$

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \text{ ۽ } (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

هڪ الجبري اظهار کي غير ناطق اظهار (Surd) چئبو آهي، جنهن کي گهٽ ۾

گهٽ هڪ رقم ٻي مول جي نشانيءَ واري هجي. مثال طور: $\sqrt{2}, \sqrt{a-4}, \sqrt{\frac{3}{10}}$

غير ناطق اظهار (Surd) آهن.

جيڪڏهن $\sqrt[n]{a}$ هڪ غير ناطق اظهار آهي ۽ 'a' مڪمل (nth) وين سگهه نه آهي

ته پوءِ انکي (nth) وين ترتيب جو غير ناطق اظهار (Surd) چئبو آهي.

هڪ غير ناطق اظهار جنهن کي هڪ رقم هجي انکي هڪ رقمي

اظهار (Monomial) چئبو آهي.

هڪ غير ناطق عدد جيڪو ٻن هڪ رقمي ناطق اظهارن جو جوڙ يا فرق رکي يا

هڪ درجي غير ناطق اظهار ۽ ناطق اظهار جو جوڙ هجي انکي ٻه درجي ناطق

اظهار چئبو آهي.

$(\sqrt{a} + c\sqrt{b})$ ۽ $(\sqrt{a} - c\sqrt{b})$ نموني جا اظهار هڪٻئي جا غير ناطق ميل آهن.

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ ۽ } \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \text{ مهيا ڪيل } a > 0 \text{ ۽ } b > 0$$

جيڪڏهن ٻن غير ناطق اظهارن (Surds) جي ضرب اپت هڪ ناطق عدد آهي ته

پوءِ هر هڪ غير ناطق اظهار (Surd) کي هڪٻئي جو ناطق ڪندڙ جزو چئبو آهي.

ڏنل غير ناطق اظهار (surd) جي ضرب جو عمل انجي ناطق ڪندڙ جزي سان ناطق

عدد حاصل ڪرڻ لاءِ ضرب اپت کي غير ناطق اظهار (surd) جو ناطق ٿيڻ چئبو آهي.

4

يونٽ

جزالھڻ
Factorization

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ هيٺين نمونن جي اظهارن جي جزن لهڻ جي عمل کي Recall ڪندا
- ◆ $ka + kb + kc$ (سڀني رقمين ۾ مشترڪ جزا)
- ◆ $ac + ad + bc + bd$ (رقمن جي جوڙي ۾ مشترڪ جزا)
- ◆ $a^2 \pm 2ab + b^2$ (مڪمل چورس)
- ◆ $a^2 - b^2$ (ٻن چورسن جو فرق)
- ◆ $(a^2 \pm 2ab + b^2) - c^2$
- ◆ $(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2$
- ◆ هيٺين نمونن جي اظهارن جا جزا لهڻ.
- ◆ نمونو I: $a^4 + b^4$ ۽ $a^4 + a^2 b^2 + b^4$
- ◆ نمونو II: $x^2 + px + q$
- ◆ نمونو III: $ax^2 + bx + c$
- ◆ نمونو IV:
- ◆ $(ax^2 + bx + c)(ax^2 + bx + d) + k$
- ◆ $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + k$
- ◆ $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + kx^2$
- ◆ نمونو V: $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ ۽ $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- ◆ نمونو VI: $a^3 \pm b^3$
- ◆ پاڇي واري سڌيان کي بيان ڪري ثابت ڪرڻ ۽ مثالن سان وضاحت ڪرڻ
- ◆ پاڇي لهڻ (ونڊ ڪرڻ کان سواءِ) جڏهن مليل گهڻ رقمي، هڪ درجي واري گهڻ رقمي سان ونڊ ٿيل هجي.
- ◆ گهڻ رقمي جي ٻڌڻي جي وضاحت ڪرڻ.
- ◆ جزن وارو سڌيان بيان ۽ ثابت ڪريو
- ◆ مصنوعي ورهاست واري طريقي کي بيان ڪرڻ.
- ◆ ونڊ اپٽ ۽ پاڇي معلوم ڪرڻ جڏهن مليل گهڻ رقمي، هڪ درجي واري گهڻ رقمي سان ونڊ ٿيل هجي.
- ◆ نامعلوم جي قيمت معلوم ڪرڻ، جيڪڏهن گهڻ رقمي جون ٻڌڻيون مليل هجن.
- ◆ نامعلوم جي قيمت معلوم ڪرڻ جيڪڏهن گهڻ رقمي جا جزا مليل هجن.
- ◆ جزن وارو سڌيان استعمال ڪري ٽن درجن واري گهڻ رقمي جا جزا لهڻ.

تعارف:

اسان جزا لهڻ بابت مطالعو ڪنداسين، جنهن جو رياضي ۾ اهم ڪردار آهي. اهي منجهيل اظهارن کي (آسان) سادي اظهارن ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ مددگار آهن.

4.1 جزا لهڻ Factorization

فرض ڪريو ته $p(x), q(x), r(x)$ ۽ $r(x)$ تي گهڻ رڳيون آهن، اهڙي طرح جو هتي $p(x) \times q(x) = r(x)$ آهي. گهڻ رڳي $r(x), p(x), q(x)$ جي ضرب اپت آهي ۽ گهڻ رڳي $p(x)$ ۽ $q(x)$ کي $r(x)$ جا جزا چئبو آهي.

گهڻ رڳين جي جزن جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا.

$$6x^2y^3 = (2 \times 3)(x \times x)(y \times y \times y) \quad (i)$$

$$ax + aby + abcz = a(x + by + bcz) \quad (ii)$$

$$5x + 15xy = 5x(1 + 3y) \quad (iii)$$

$$x - y = (\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2 = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad (iv)$$

4.1.1 هيٺين نمونن جي اظهارن جي جزن لهڻ جي عمل کي ياد ڪرڻ

$$ka + kb + kc \quad (i) \text{ (سڀني رڳن ۾ مشترڪ جزا)}$$

$$ac + ad + bc + bd \quad (ii) \text{ (رڳن جي جوڙي ۾ مشترڪ جزا)}$$

$$a^2 \pm 2ab + b^2 \quad (iii) \text{ (مڪمل چورس)}$$

$$a^2 - b^2 \quad (iv) \text{ (ٻن چورسن جو فرق)}$$

$$(a^2 \pm 2ab + b^2) - c^2 \quad (v)$$

$$(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 \quad (vi)$$

(i) $ka + kb + kc$ نموني جا جزا لهڻ

اچو ته هيٺيان مثال ڏسو.

مثال 01 $10a + 15b - 20c$ جا جزا لهو.

حل: $10a + 15b - 20c$

$5(2a + 3b - 4c)$ (5 عدد اظهار مان common ڪرڻ سان)

مثال 02 $\frac{4}{9} - \frac{8}{12}x - \frac{16}{15}xy$ جا جزا لھو

$$\begin{aligned} & \frac{4}{9} - \frac{8}{12}x - \frac{16}{15}xy \\ &= \frac{4}{3 \cdot 3} - \frac{4 \cdot 2}{3 \cdot 4}x - \frac{4}{3 \cdot 5}xy \end{aligned}$$

حل:

$$\left(\frac{4}{3} \right) \frac{4}{3} \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{4} \right) - x \frac{4}{5} xy$$

(ii) $ac + ad + bc + bd$ نموني جا جزا لھڻ.

ھيٺيان مثال ڏسو.

مثال 01 $3a - ac - 3c + c^2$ جا جزا لھو.

$$\begin{aligned} & 3a - ac - 3c + c^2 \\ &= a(3 - c) - c(3 - c) \\ &= (3 - c)(a - c) \end{aligned}$$

حل:

مثال 02 $9y^2z + 3xyz - 9xy^2 - 3x^2y$ جا جزا لھو.

$$\begin{aligned} & 9y^2z + 3xyz - 9xy^2 - 3x^2y \\ &= 9y^2z + 3xyz - 9xy^2 - 3x^2y \\ &= 3yz(3y + x) - 3xy(3y + x) \\ &= (3y + x)(3yz - 3xy) \\ &= (3y + x) \times 3y(z - x) \end{aligned}$$

حل:

$3y(x + 3y)(z - x)$ گھربل جزا آھن.

(iii) $a^2 \pm 2ab + b^2$ نموني جا جزا لھڻ

اسان کي خبر آھي تہ

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a)^2 + 2(a)(b) + (b)^2 = (a + b)^2$$

۽

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a)^2 - 2(a)(b) + (b)^2 = (a - b)^2$$

اچو ته هيٺيان مثال ڏسون.

مثال 01 $16a^2 + 40ab + 25b^2$ جا جزا لهو.

حل: $16a^2 + 40ab + 25b^2$

$$= (4a)^2 + 2(4a)(5b) + (5b)^2$$

$$= (4a + 5b)^2 \quad [\because a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2]$$

مثال 02 $4p^2 - 28pq + 49q^2$ جا جزا لهو.

حل: $4p^2 - 28pq + 49q^2$

$$= (2p)^2 - 2(2p)(7q) + (7q)^2$$

$$= (2p - 7q)^2 \quad [\because a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2]$$

(iv) $a^2 - b^2$ نموني جا جزا لهو.

اچو ته هيٺيان مثال ڏسون.

مثال 01 $4x^2 - 1$ جا جزا لهو.

حل: $4x^2 - 1$

$$= (2x)^2 - (1)^2$$

$$= (2x - 1)(2x + 1) \quad [\because a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)]$$

مثال 02 $96y^2 - 6z^2$ جا جزا لهو.

حل: $96y^2 - 6z^2$

$$= 6(16y^2 - z^2)$$

$$= 6[(4y)^2 - z^2]$$

$$= 6(4y - z)(4y + z) \quad [\because a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)]$$


مثال 03 $9r^4 - (6s - t^2)^2$ جا جزا لهو.

حل: $9r^4 - (6s - t^2)^2$

$$= (3r^2)^2 - (6s - t^2)^2$$

$$= [3r^2 - (6s - t^2)][3r^2 + (6s - t^2)], \quad [\because a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)]$$

$$= (3r^2 - 6s + t^2)(3r^2 + 6s - t^2)$$



(v) نموني جا جزا لهڻ. $(a^2 \pm 2ab + b^2) - c^2$

اچو ته هيٺيان مثال ڏسون.

مثال 01 $x^2 + 4xy^2 + 4y^4 - 4z^2$ جا جزا لهو.

حل: $x^2 + 4xy^2 + 4y^4 - 4z^2$

$$\begin{aligned}
 &= \{(x)^2 + 2(x)(2y^2) + (2y^2)^2\} - (2z)^2 \\
 &= (x + 2y^2)^2 - (2z)^2 \\
 &= \{(x + 2y^2) + 2z\} \{(x + 2y^2) - 2z\} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\
 &= (x + 2y^2 + 2z)(x + 2y^2 - 2z)
 \end{aligned}$$

مثال 02 $9p^2 - 6pq + q^2 - 9r^2$ جا جزا لهو.

حل: $9p^2 - 6pq + q^2 - 9r^2$

$$\begin{aligned}
 &= (3p)^2 - 2(3p)(q) + q^2 - (3r)^2 \\
 &= (3p - q)^2 - (3r)^2 \\
 &= (3p - q + 3r)(3p - q - 3r) \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)]
 \end{aligned}$$

(vi) نموني جا جزا لهڻ. $(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2$

مثال 01 $(\sqrt{xy})^2 - (\sqrt{z})^2$ جا جزا لهو.

حل: $(\sqrt{xy})^2 - (\sqrt{z})^2$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad = (\sqrt{xy} - \sqrt{z})(\sqrt{xy} + \sqrt{z})$$


مشق 4.1

1. هيٺين جا جزا لهو.

$$x^2 + 3x^2y + 4x^2y^2z \quad (ii) \quad 4x + 16y + 24z \quad (i)$$

$$9qr(s^2 + t^2) + 18q^2r^2(s^2 + t^2) \quad (iv) \quad 3pqr + 6pqt + 3pqs \quad (iii)$$

$$a(x - y) - a^2b(x - y) + a^2b^2(x - y) \quad (vi) \quad \frac{z^2x}{16} - \frac{x^2z^2}{8} + \frac{x^2z^3}{12} \quad (v)$$



2. ہینین جا جزا لھو.

$$9a^2b + 18ab^2 - 6ac - 12bc \quad (\text{ii})$$

$$7x + xz + 7z + z^2 \quad (\text{i})$$

$$r^2 + 9rs - 7rs - 63s^2 \quad (\text{iv})$$

$$6t - 12p + 4tq - 8pq \quad (\text{iii})$$

$$\frac{10xy}{11} + \frac{5xz}{11} - \frac{14yz}{11} - \frac{7xy}{11} \quad (\text{vi})$$

$$\frac{y^2}{4} - \frac{4^2z}{4} - \frac{z^2t}{9} + \frac{z^2tz}{9} \quad (\text{v})$$

3. جزا معلوم کریو.

$$36x^4 + 12x^2 + 1 \quad (\text{ii})$$

$$4a^2 + 12ab + 9b^2 \quad (\text{i})$$

$$81y^2 + 144yz + 64z^2 \quad (\text{iv})$$

$$x^2 + 1 + \frac{1}{4x^2} \quad (\text{iii})$$

$$a^2 + 0.4a + 0.04 \quad (\text{vi})$$

$$625 + 50a^2b + a^4b^2 \quad (\text{v})$$

4. جزا لھو.

$$\frac{9}{4}x^4 - 2 + \frac{4}{9x^4} \quad (\text{ii})$$

$$b^4 - 4b^2c^2 + 4c^4 \quad (\text{i})$$

$$9(p+q)^2 - 6(p+q)r^2 + r^4 \quad (\text{iv})$$

$$2a^3b^3 - 16a^2b^4 + 32ab^5 \quad (\text{iii})$$

$$(a-b)^2 - 18(a-b) + 81 \quad (\text{vi})$$

$$x^2y^2 - 0.1xy + 0.0025 \quad (\text{v})$$

5. جزا لھو.

$$100x^2z^2 - y^4 \quad (\text{iii})$$

$$16x^2 - 25y^2 \quad (\text{ii})$$

$$4a^2 - 9b^2 \quad (\text{i})$$

$$\frac{x^4}{121} - 121y^2 \quad (\text{vi})$$

$$\frac{64}{81}f^2 - \frac{81}{64}g^4 \quad (\text{v})$$

$$\frac{1}{100}x^4 - 100y^4 \quad (\text{iv})$$

6. جزا معلوم کریو.

$$(4a - 9b)^2 - (2a + 5b)^2 \quad (\text{ii})$$

$$(2x + z)^2 - (2x - z)^2 \quad (\text{i})$$

$$(9x^2 - 4y^2)^2 - (4x^2 - y^2)^2 \quad (\text{iv})$$

$$169x^4 - (3t + 4)^2 \quad (\text{iii})$$

$$9x^2 + \frac{1}{9x^2} - 4y^2 - \frac{1}{4y^2} + 4 \quad (\text{vi}) \quad \left(a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} \right) - \left(b^2 - 2 + \frac{1}{b^2} \right) \quad (\text{v})$$

7. جزا معلوم کریو.

$$(4a^2 + 8ab^2 + 4b^4) - 9c^2 \quad (\text{ii})$$


$$(x^2 + 2xy + y^2) - 9z^4 \quad (\text{i})$$

$$4(x^2 + 2xy^2 + y^4) - 9y^6 \quad (\text{iv})$$

$$16d^4 - (c^4 - 2c^2d + d^2) \quad (\text{iii})$$

$$4x^2 - y^2 - 2y - 1 \quad (\text{vi})$$

$$x^2 - y^2 - 4x - 2y + 3 \quad (\text{v})$$



8. جزا لهو.

$$\begin{aligned} (\sqrt{4x})^2 - (\sqrt{9y})^2 & \quad \text{(ii)} & (\sqrt{ab})^2 - (\sqrt{c})^2 & \quad \text{(i)} \\ xzt - \frac{1}{t} & \quad \text{(iv)} & (\sqrt{yz})^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{yz}}\right)^2 & \quad \text{(iii)} \end{aligned}$$

4.1.2 هيٺين نمونن جي اظهارن جا جزا لهو.

نمونو I: $a^4 + a^2b^2 + b^4$ or $a^4 + 4b^4$

هن نموني ۾ آهي الجبري اظهار شامل آهن جيڪي نه مڪمل چورس ۽ نه وري
ٻن چورس جي فرق واري صورت ۾ آهن.

هن نموني جي جزن لهڻ لاءِ هيٺين مثالن ۾ وضاحت ڪيل آهي.

مثال 01 $a^4 + a^2b^2 + b^4$ جا جزا لهو.

حل: $a^4 + a^2b^2 + b^4$


$$= (a^4 + b^4) + a^2b^2 \quad (\text{رقمن کي ترتيب ۾ لکو})$$

$$\begin{aligned} (a^4 + 2a^2b^2 + b^4) - 2a^2b^2 + a^2b^2 &= (a^4 + 2a^2b^2 + b^4) - 2a^2b^2 + a^2b^2 \\ &= \{(a^2)^2 + 2(a^2)(b^2) + (b^2)^2\} - a^2b^2 \\ &= (a^2 + b^2)^2 - (ab)^2 \\ &= \{(a^2 + b^2) - ab\} \{(a^2 + b^2) + ab\} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\ &= (a^2 - ab + b^2)(a^2 + ab + b^2) \quad \text{گهريل جزا آهن.} \end{aligned}$$

مثال 02 $a^4 + 4b^4$ جا جزا لهو.

حل: $a^4 + 4b^4$

$$\begin{aligned} &= (a^2)^2 + (2b^2)^2 \\ &= (a^2)^2 + (2b^2)^2 + 2(a^2)(2b^2) - 2(a^2)(2b^2) \quad [2(a^2)(2b^2) \text{ جوڙ ۽ ڪٽ ڪرڻ سان}] \\ &= \{(a^2)^2 + 2(a^2)(2b^2) + (2b^2)^2\} - 4a^2b^2 \\ &= (a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2 \\ &= \{(a^2 + 2b^2) - 2ab\} \{(a^2 + 2b^2) + 2ab\} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\ &= (a^2 - 2ab + 2b^2)(a^2 + 2ab + 2b^2) \quad \text{گهريل جزا آهن.} \end{aligned}$$



مثال 03 $x^8 + x^4 + 1$ جا جزا لهو.

حل: $x^8 + x^4 + 1$

$$\begin{aligned}
 &= (x^8 + 1) + x^4 \\
 &= \{(x^4)^2 + (1)^2 + 2(x^4)(1)\} - 2(x^4)(1) + x^4 \\
 &= (x^4 + 1)^2 - x^4 \\
 &= (x^4 + 1)^2 - (x^2)^2 \quad [2(x^4)(1) \text{ جوڙ ۽ ڪٽ ڪرڻ سان}] \\
 &= \{(x^4 + 1) - x^2\} \{(x^4 + 1) + x^2\} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\
 &= \{(x^4 + x^2 + 1)\} \{(x^4 - x^2 + 1)\} \\
 &= \{(x^2 + 1)^2 - 2x^2 + x^2\} \{(x^4 - x^2 + 1)\} \\
 &= \{(x^2 + 1)^2 - x^2\} \{(x^4 - x^2 + 1)\}
 \end{aligned}$$

$(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)(x^4 - x^2 + 1)$ گهربل جزا آهن.

نمونو II: $x^2 + px + q$

هن نموني جي اظهار جي چرڻ لهن لاءِ وچين رقم کي ٽوڙبو آهي.

مثال 01 $y^2 + 7y + 12$ جا جزا لهو.

حل: $y^2 + 7y + 12$

$$\begin{aligned}
 &= y^2 + 3y + 4y + 12 \\
 &= y(y + 3) + 4(y + 3) \\
 &= (y + 3)(y + 4)
 \end{aligned}$$

مثال 02 $x^2 + 13xy - 30y^2$ جا جزا لهو.

حل: $x^2 + 13xy - 30y^2$

$$\begin{aligned}
 &= x^2 + 15xy - 2xy - 30y^2 \\
 &= x(x + 15) - 2y(x + 15) \\
 &= (x + 15)(x - 2y)
 \end{aligned}$$

نمونو III: $ax^2 + bx + c, a \neq 0$ جڏهن ته

$ax^2 + bx + c = 0$ جي اظهار جا جزا لهن لاءِ هيٺين قديم جي ضرورت آهي.



(i) ac جي ضرب ايت لھو جڏھن تہ a ، عددي منڍو آھي x^2 جو ۽ c مستقل آھي.

(ii) ٻہ عدد x_1 ۽ x_2 لھو، جيئن تہ $x_1 + x_2 = b$ ۽ $x_1 x_2 = ac$

ھن طريقي جي وضاحت لاءِ ھيٺيان مثال مددگار ثابت ٿيندا

مثال 01 $10x^2 - 19xy + 6y^2$ جا جزا لھو.

حل: $10x^2 - 19xy + 6y^2$

$$\begin{aligned} &= 10x^2 - 15xy - 4xy + 6y^2 \\ &= 5x(2x - 3y) - 2y(2x - 3y) \\ &= (2x - 3y)(5x - 2y) \end{aligned}$$

مثال 02 $4x^2 + 12x + 5$ جا جزا لھو.

حل: $4x^2 + 12x + 5$

$$\begin{aligned} &= 4x^2 + 10x + 2x + 5 \\ &= 2x(2x + 5) + 1(2x + 5) \\ &= (2x + 5)(2x + 1) \end{aligned}$$

مشق 4.2

1. ھيٺين جا جزا لھو.

(ii) $b^4 + b^2 + 1$

(iv) $z^8 + z^4 + 1$

(i) $a^4 + a^2x^2 + x^2$

(iii) $a^8 + a^4x^4 + x^8$

2. جزا لھو.

(ii) $21z^2 - 4z - 1$

(iv) $24a^2 - 18a + 27$

(i) $42x^2 - 8x - 2$

(iii) $9y^2 + 21yz^4 - 8y^2$

3. جزا لھو.

(ii) $36x^4z^4 + 9y^4$

(iv) $4t^4 + 1$

(i) $x^4 + 4y^2$

(iii) $4t^4 + 625$


4. جزا لھو.

(ii) $a^2b^2 - 3ab - 10$

(iv) $x^2y^2z^2 + 2xyz - 24$

(i) $x^2 + 3x - 10$

(iii) $y^2 + 7y - 98$



5. جزا لهو.

(ii) $42z^4 + 50z^2 + 8$

(iv) $3x^2 - 38xy - 13y^2$

(i) $121x^4 + 11x^2 + 2$

(iii) $4x^2 + 12x + 5$

6. جزا لهو.

(ii) $x^4 + x^2 + 25$

(iv) $16a^2 - 97a^2b^2 + 81b^2$

(i) $81x^4 + 36x^2y^2 + 16y^4$

(iii) $y^4 - 7y^2 - 8$

لمونو 17: $(ax^2 + bx + c)(ax^2 + bx + d) + k$

$(x+a)(x+b)(x+c)(x+d) + k$

$(x+a)(x+b)(x+c)(x+d) + kx^2$

اسان هنن نمونن جي اظهارن جي جزن لهڻ جي طريقي کي هيٺين مثالن جي مدد سان واضح ڪنداسين.

مثال 01 $(x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) - 120$ جا جزا لهو

حل: $(x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) - 120$

فرض ڪريو ته $x^2 + 5x = t$ ته پوءِ

$$\begin{aligned}
 & (t+4)(t+6) - 120 \\
 &= t^2 + 10t + 24 - 120 \\
 &= t^2 + 10t - 96 \\
 &= t^2 - 6t + 16t - 96 \quad (\text{جزن ڪرڻ سان}) \\
 &= t(t-6) + 16(t-6) \\
 &= (t-6)(t+16) \\
 &= (x^2 + 5x - 6)(x^2 + 5x + 16) \quad \because t = x^2 + 5x \\
 &= (x^2 - x + 6x - 6)(x^2 + 5x + 16) \\
 &= [x(x-1) + 6(x-1)](x^2 + 5x + 16) \\
 &= (x-1)(x+6)(x^2 + 5x + 16)
 \end{aligned}$$

مثال 02

مثال 02: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 15$ جا جزا لھو.

حل: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 15$

هتي $1+4 = 2+3 = 5$

(جزن کي ترتيب ۾ رکڻ سان) $(x+1)(x+4)(x+2)(x+3) - 15$

$= (x+1)(x+4)(x+2)(x+3) - 15$

$= (x^2+5x+4)(x^2+5x+6) - 15$

جڏهن ته $t = x^2+5x$ $= (t+4)(t+6) - 15$

$= t^2+10t+24-15$

$= t^2+10t+9$

$= (t+1)(t+9)$

$= (x^2+5x+1)(x^2+5x+9) \therefore t = x^2+5x$

مثال 03

مثال 03: $(x+2)(x-2)(x-3)(x+3)+(-2x^2)$ جا جزا لھو.

حل: $(x+2)(x-2)(x-3)(x+3)+(-2x^2)$

$= (x+2)(x-2)(x-3)(x+3)+(-2x^2)$

$= (x^2-2^2)(x^2-3^2)-2x^2$ $[\because (a+b)(a-b)=a^2-b^2]$

$= (x^2-4)(x^2-9)-2x^2$

$= x^4-9x^2-4x^2+36-2x^2$

$= x^4-15x^2+36$

$= x^4-3x^2-12x^2+36$

$= x^2(x^2-3)-12(x^2-3)$

$= (x^2-3)(x^2-12)$

$= [(x)^2-(\sqrt{3})^2][(x)^2-(2\sqrt{3})^2]$

$= (x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})(x-2\sqrt{3})(x+2\sqrt{3})$

مشق 4.3

1. هيٺين جا جزا لهو.

$$\begin{aligned} (x^2+5x+6)(x^2+5x+4)-3 & \text{ (ii)} \\ (x^2-8x+4)(x^2-8x-4)+15 & \text{ (iv)} \\ (x^2-5x+4)(x^2-5x+6)-120 & \text{ (vi)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x^2-4x-5)(x^2-4x-12)-144 & \text{ (i)} \\ (x^2-2x+3)(x^2-2x+4)-42 & \text{ (iii)} \\ (x^2+9x-1)(x^2+9x+5)-7 & \text{ (v)} \end{aligned}$$

2. جزا لهو.

$$\begin{aligned} (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)+24 & \text{ (ii)} \\ (x-3)(x-5)(x-7)(x-9)+15 & \text{ (iv)} \\ (x-1)(x-3)(x-4)(x-5)-255 & \text{ (vi)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-48 & \text{ (i)} \\ (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)-99 & \text{ (iii)} \\ (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)-224 & \text{ (v)} \end{aligned}$$

3. جزا لهو.

$$\begin{aligned} (x-1)(x+1)(x+3)(x-3)-3x^2-23 & \text{ (ii)} \\ (x-2)(x+2)(x-4)(x+4)-14x^2 & \text{ (iv)} \\ (x^2-x-12)(x^2-x-12)-x^2 & \text{ (vi)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x-2)(x-3)(x+2)(x+3)-2x^2 & \text{ (i)} \\ (x-1)(x+1)(x-3)(x+3)+4x^2 & \text{ (iii)} \\ (x+5)(x+2)(x-5)(x-2)+4x^2 & \text{ (v)} \end{aligned}$$

نمونو V: $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ ۽ $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

اسان کي خبر آهي ته

$$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$$

۽

$$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$$

ته مٿي ڏنل نموني جي جزن کي سمجهڻ لاءِ هيٺيان مثال مددگار ٿيندا.

$$64x^3-12x^2+\frac{3x}{4}-\frac{1}{64} \text{ (ii)}$$

$$8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3 \text{ (i) جزا لهو}$$

مثال 01

$$8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3 \text{ حل (i):}$$

$$=(2x)^3+3(2x)^2(y)+3(2x)(y)^2+(y)^3 \quad [\because (a^3+3a^2b+3ab^2+b^3)=(a+b)^3]$$

$$=(2x+y)^3$$

حل (ii): $64x^3 - 12x^2 + \frac{3x}{4} - \frac{1}{64}$

$$= (4x)^3 - 3(4x)^2\left(\frac{1}{4}\right) + 3(4x)\left(\frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^3 \quad [\because (a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3) = (a-b)^3]$$

$$= \left(4x - \frac{1}{4}\right)^3$$

مشق 4.4

1. هيٺين جا جزا لهو.

$$8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3 \quad (\text{ii})$$

$$b^3 + 3b^2c + 3bc^2 + c^3 \quad (\text{i})$$

$$8x^3 + 36x^2 + 54x + 27 \quad (\text{iv})$$

$$64x^3 + 12x^2 + 3x + \frac{1}{64} \quad (\text{iii})$$

$$\frac{8}{27}x^3 + 2x^2y + 3xy + \frac{27}{8}y^3 \quad (\text{vi})$$

$$\frac{1}{27} + \frac{1}{3}y^2 + y^4 + y^6 \quad (\text{v})$$

$$\frac{z^3}{8} + \frac{z^2y}{4} + \frac{zy^2}{6} + \frac{y^3}{27} \quad (\text{viii})$$

$$\frac{64}{9} + \frac{16}{3}x^2 + 4x + x^3 \quad (\text{vii})$$

2. جزا لهو.

$$x^6 - \frac{16}{3}x^4 + 4x^2 - \frac{64}{9} \quad (\text{ii})$$

$$d^3 - 6d^2c + 12dc^2 - 8c^3 \quad (\text{i})$$

$$125z^3 - 75z^2y^2 + 15zy^4 - y^6 \quad (\text{iv})$$

$$\frac{x^3}{125} - \frac{3}{5}x^2y + \frac{3}{25}xy^2 - y^3 \quad (\text{iii})$$

$$\frac{b^6}{27} - \frac{b^4c^2}{4} + \frac{b^2c^4}{6} - \frac{c^6}{8} \quad (\text{vi})$$

$$\frac{z^3}{27} - \frac{z^2y}{3} + zy^2 - 216y^3 \quad (\text{v})$$

$$\frac{8}{27}x^3 - 2x^2y + 3xy - \frac{27}{8}y^3 \quad (\text{viii})$$

$$216 - \frac{9}{2}z^2 + 54z - \frac{z^3}{8} \quad (\text{vii})$$


نمونو VI: $a^3 + b^3$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2),$$

اسان کي خبر آهي ته

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) \quad \text{۽}$$

ته مٿي ڏنل نموني جي جزن کي سمجهڻ لاءِ هيٺيان مثال مددگار ٿيندا.



مثال 01 $8x^3 + 27$ جا جزا لهو

حل: $8x^3 + 27$

$$\begin{aligned}
 &= (2x)^3 + (3)^3 \\
 &= (2x+3)[(2x)^2 - (2x)(3) + (3)^2] \quad [\because a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)] \\
 &= (2x+3)(4x^2 - 6x + 9) \\
 &8x^3 + 27 = (2x+3)(4x^2 - 6x + 9)
 \end{aligned}$$

تنهنڪري

مثال 02 $108x^3 - 256xz^3$ جا جزا لهو

حل: $108x^3 - 256xz^3$

$$\begin{aligned}
 &= 4x(27x^2 - 64z^3) \\
 &= 4x[(3x)^3 - (4z)^3] \quad [\because a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)] \\
 &= 4x(3x-4z)[(3x)^2 + (3x)(4z) + (4z)^2] \\
 &= 4x(3x-4z)(9x^2 + 12xz + 16z^2) \\
 &108x^3 - 256xz^3 = 4x(3x-4z)(9x^2 + 12xz + 16z^2).
 \end{aligned}$$

تنهنڪري

مشق 4.5

1. هيٺين جا جزا لهو.

(iv) $a^3b^3 + 512$

(iii) $a^6 + 1$

(ii) $a^{11} + a^2b^9$

(i) $x^3 + 8y^3$

(viii) $\frac{x^6}{27} + \frac{8}{x^3}$

(vii) $x^2 + x^3y^6z^9$

(vi) $\frac{x^3}{125} + \frac{125}{x^3}$

(v) $a^3b^3 + 27b^6$

2. جزا لهو.

(i) $x^3 - 8y^3$

(ii) $x^9 - 8y^9$

(iii) $1000 - \frac{x^3y^3}{125}$

(iv) $a^6 - b^6$

(viii) $8x^6 - \frac{1}{729}$

(vii) $\frac{27}{x^3} - 8y^6$

(vi) $x^{12} - y^{12}$

(v) $\frac{x^6}{64} - \frac{64}{x^{12}}$

4.2 پاچي ۽ جزن وارو سڌيان

تي يا وڌيڪ درجن وارين گهڻ رقمي اظهارن جي جزن معلوم ڪرڻ لاءِ گهڻو ڪري پاچي ۽ جزن وارا سڌيان استعمال ٿيندا آهن.

4.2.1: پاچي واري سڌيان کي بيان ڪري ثابت ڪريو، ۽ مثالن سان وضاحت ڪريو.

بيان:

جيڪڏهن ڪنهن $n \geq 1$ درجي واري گهڻ رقمي $p(x)$ کي $(x-a)$ سان ونڊ ڪجي ته پاچي $R = p(a)$ ملندي.

اسان $p(x)$ کي $p(x) = q(x)(x-a) + R$ لکي سگهون ٿا. (جنهن کي ونڊ جو الگورٿم چئبو آهي) جڏهن ته R مستقل (پاچي) آهي ۽ $q(x)$ جون درجو $p(x)$ کان هڪ گهٽ آهي. ثابتي:

ونڊ جي الگورٿم تحت

$$p(x) = q(x)(x-a) + R,$$

فرض ڪريو ته $x=a$ ته پوءِ

$$p(a) = q(a) \times (a-a) + R,$$

$$p(a) = q(a) \times 0 + R$$

$$\Rightarrow p(a) = R = \text{پاچي.}$$

4.2.2: پاچي معلوم ڪريو (ونڊ ڪرڻ کان سواءِ) جڏهن مليل گهڻ رقمي هڪ درجي واري

گهڻ رقمي سان ورڊ ٿيل هجي.

هيٺيان مثال، پاچي واري سڌيان استعمال ڪرڻ ۾ اسان لاءِ مددگار ثابت ٿيندا.

مثال 01 پاچي لهو جڏهن $x^2 - 3x + 4$ کي $x-2$ سان ونڊ ڪجي

حل: فرض ڪريو ته $p(x) = x^2 - 3x + 4$

هتي پاچي واري سڌيان مطابق $a=2$ آهي.

$$p(2) = (2)^2 - 3(2) + 4$$

$$= 4 - 6 + 4 = 8 - 6 = 2$$

$$p(2) = R = 2$$

تنهنڪري پاچي آهي 2

مثال 02

k جو مله لهو، جيڪڏهن گهڻ رقمي x^3+kx^2+3x-4 کي $x+2$ سان ونڊ
ڪجي ته پاڇي -2 بچي.

حل: هتي $p(x) = x^3 + kx^2 + 3x - 4$

$$\therefore p(-2) = (-2)^3 + k(-2)^2 + 3(-2) - 4$$

$$\Rightarrow -2 = 4k - 18$$

$$-2 = \text{پاڇي}$$

$$\Rightarrow 4k = -2 + 18$$

$$\Rightarrow 4k = 16$$

$$\Rightarrow k = 4,$$

تنهنڪري k جو مله آهي 4

4.2.3: گهڻ رقمي جي بڙي

جيڪڏهن $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ حقيقي منڊي (coefficient) واري گهڻ رقمي هجي
۽ جيڪڏهن گهڻ رقمي $p(x)$ جو $x=a$ وڃڻ سان $p(a)=0$ ملي ته "a" کي $p(x)$ گهڻي رقمي جي
بڙي چئبو آهي.

$$P(x) = x + 7 \text{ ته پوءِ } -7 \text{ گهڻ رقمي جي بڙي جيئن } P(-7) = -7 + 7 = 0$$

مثال

4.2.4: جزن وارو سڌيان بيان ڪري ثابت ڪريو.


بيان: جيڪڏهن $p(a) = 0$ ته هڪ درجي گهڻ رقمي $p(x)$ کي $x-a$ سان ونڊ ڪجي ته پوءِ
ثابتي: فرض ڪريو ته $q(x)$ کي $x-a$ سان ونڊ ڪجي ته پوءِ

$$p(x) = (x-a)q(x) + R$$

$$R = p(a) \text{ پاڇي واري سڌيان مطابق}$$

$$p(x) = q(x)(x-a) + p(a) \text{ تنهنڪري.}$$

جيڪڏهن $p(a)=0$ هجي ته پوءِ $p(x) = q(x)(x-a)$ ٿيندو. جڏهن ته $(x-a)$ گهڻ رقمي $p(x)$ جو هڪ
جزو آهي



هينيان مثال جزن واري سڌيان کي استعمال ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندا.

مثال 01 معلوم ڪريو ته $x+2$ ، جزو آهي $x^3 + \frac{9}{2}x^2 + 3x - 4$ جو يا نه

حل: فرض ڪريو ته $p(x) = x^3 + \frac{9x^2}{2} + 3x - 4$

$$\begin{aligned}\therefore R &= p(-2) = (-2)^3 + \frac{9}{2}(-2)^2 + 3(-2) - 4 \\ &= -8 + 18 - 6 - 4 \\ &= -18 + 18 = 0 \Rightarrow R = 0,\end{aligned}$$

پاڇي $0 =$

$x+2$ جزو آهي $P(x)$ جو

مثال 02 معلوم ڪريو ته $x+3$ جزو آهي $x^3 - x^2 - 8x + 12$ جو.

حل: فرض ڪريو ته $p(x) = x^3 - x^2 - 8x + 12$

$$\begin{aligned}R &= p(-3) = (-3)^3 - (-3)^2 - 8(-3) + 12 \\ &= -27 - 9 + 24 + 12\end{aligned}$$


$$R = p(-3) = -36 + 36 = 0$$

$x+3$ جزو آهي $x^3 - x^2 - 8x + 12$ جو

مشق 4.6

پاڇي وارو سڌيان استعمال ڪري پاڇي لهو جڏهن

- (i) $x^3 - 6x^2 + 11x - 8$ کي $(x-1)$ سان ونڊ ڪجي
- (ii) $x^3 + 6x^2 + 11x + 8$ کي $(x+1)$ سان ونڊ ڪجي
- (iii) $x^3 - x^2 - 26x + 40$ کي $(x-2)$ سان ونڊ ڪجي
- (iv) $x^3 - 3x^2 + 4x - 14$ کي $(x+2)$ سان ونڊ ڪجي
- (v) $(2y-1)^3 + 6(3+4y) - 9$ کي $(2y+1)$ سان ونڊ ڪجي
- (vi) $4y^3 - 4y + 3$ کي $(2y-1)$ سان ونڊ ڪجي
- (vii) $(2y+1)^3 - 6(3-4y) - 10$ کي $(2y-1)$ سان ونڊ ڪجي
- (viii) $x^4 + x^2y^2 + y^4$ کي $(x-y)$ سان ونڊ ڪجي



4. m جو مله لهو، جيڪڏهن $p(y) = my^3 + 4y^2 + 3y - 4$ ۽ $q(y) = y^3 - 4y + m$ کي $(y-3)$ سان ونڊ
ڪجي ته ساڳي ڀاڱي ٻڃي.

5. جيڪڏهن گهڻ رقمي $4x^3 - 7x^2 + 6x - 3k$ کي $(x+2)$ سان پورو ونڊي سگهجي ته k جو مله لهو.

6. جيڪڏهن گهڻ رقمي $3y^2 - 4ry - 4r^2$ جو جزو آهي $(y+2)$ ته r جو مله لهو.

4.3 مصنوعي ورهاست (Synthetic Division)

مصنوعي ورهاست، گهڻ رقمي کي، هڪ درجي گهڻ رقمي سان ونڊ ڪرڻ جو طريقو آهي.

4.3.1: مصنوعي (Synthetic) ورهاست وارو طريقو بيان ڪريو.

مصنوعي ورهاست واري طريقي کي هيٺ ڏنل مثالن جي مدد سان بيان ڪيو ويو آهي.

مثال 01: مصنوعي ورهاست کي استعمال ڪري گهڻ رقمي $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 7$

کي $(x-1)$ سان ونڊ ڪريو.

حل: هتي، $x=1 \Rightarrow x-1=0$ (ضرب ڪندڙ آهي)

گهڻ رقمي جا عدد سر (منڊا) لکو

تنهنڪري

1	1	-3	5	7	(قطار 1)
		1	-2	3	(قطار 2)
	1	-2	3	10=R	(قطار 3)

تفصيل

قدم I: گهڻ رقمي $P(x)$ جا عددي سر (منڊا) ۽ منتقل پهرين قطار ۾ وڌنديائي ترتيب ۾ لکو.

قدم II: پهريون عددي سرو (منڊو) 3 قطار ۾ ان جي هيٺيان (1 قطار) ساڳي جاء تي لکو.

قدم III: ضرب ڪندڙ 1 ۽ عددي سري 1 جي ضرب اپت کي ٻئي عددي سري جي هيٺيان
قطار 2 ۾ لکو ۽ جوڙ ڪري، ان جو جوڙ قطار 3 ۾ لکو ۽ ساڳي عمل کي دهرايو.

ته پوءِ $q(x) = x^2 - 2x + 3$ ۽ $p(1) = R = 10$



نوٽ: $q(x)$ جو درجو = $[p(x) \text{ جو درجو} - 1]$ $3-1=2$

ڪريو ته 3 قطار جو آخري رڪن، پاڇي آهي.

4.3.2 مصنوعي ورهاست کي استعمال ڪري

(a) ونڊ اپٽ ۽ پاڇي معلوم ڪريو جڏهن مليل گهٽ رقمي هڪ درجي واري گهٽ رقمي سان ونڊ ٿيل آهي.

(b) نامعلوم جي قيمت معلوم ڪريو، جيڪڏهن گهٽ رقمين جون ٻڙيو مليل هجن.

(c) نامعلوم جي قيمت معلوم ڪريو جيڪڏهن گهٽ رقمي جا جزا مليل هجن.

مثال 01 ونڊ اپٽ ۽ پاڇي معلوم ڪريو جڏهن،

اسان کي مليل آهي ته $p(x) = x^4 - 12x^3 + 50x^2 - 84x + 49$ کي هڪ درجي گهٽ رقمي $x-5$ سان ونڊ ڪجي.

حل: اسان کي مليل آهي ته $p(x) = x^4 - 12x^3 + 50x^2 - 84x + 49$

۽ هڪ درجي گهٽ رقمي $x-a = x-5$, $a=5$ ضرب ڪندڙ $p(5) = R = ?$ ۽ $q(x) = ?$ آهي.

ونڊ اپٽ ۽ پاڇي معلوم ڪرڻ لاءِ اسان مصنوعي ورهاست استعمال ڪنداسين.

5	1	-12	50	-84	49	(قطار 1)
		5	-35	75	-45	(قطار 2)
	1	-7	15	-9	4 = R	(قطار 3)

ته پوءِ $q(x) = x^3 - 7x^2 + 15x - 9$ ۽ $R=4$ گهربل ونڊاپٽ ۽ پاڇي آهن.


نوٽ: $R \neq 0$ تنهنڪري $(x-5)$ مليل گهٽ رقمي $p(x)$ جو جزو نه آهي.

مثال 02 m جي ڪهڙي ملهه لاءِ 1 گهٽ رقمي جي ٻڙي آهي.

حل: مليل آهي ته $p(x) = x^3 - mx^2 + x - 1$

هتي ضرب ڪندڙ $a=1$ آهي

ته مصنوعي ورهاست واري طريقي مطابق اسان وٽ



1	1	$-m$	1	-1	(قطار 1)
		1	$1-m$	$2-m$	(قطار 2)
	1	$1-m$	$2-m$	$1-m = R,$	(قطار 3)

جيئن ته 1 گھڻ رقمي جي ٻڙي آهي تنهنڪري $x-1$ هڪ جزو آهي

هتي $R=0$

$$\Rightarrow \begin{aligned} 1-m &= 0 \\ m &= 1 \end{aligned}$$

ته پوءِ

ته پوءِ گھڻ رقمي جي ٻڙي لاءِ m برابر ٿيندي 1 جي.

مشق 4.7

1. مصنوعي ورهاست واري طريقي سان هيٺ ڏنل گھڻ رقمين کي ونڊ ڪريو ۽ انهن

جي ونڊ اپت ۽ پاڇي پڻ معلوم ڪريو.


- (i) $p(x)=x^3-x^2+x-1$ by $x-1$ (ii) $p(x)=x^3-x^2-x-1$ by $x+1$
 (iii) $p(x)=x^3-6x^2+11x-6$ by $x+2$ (iv) $p(x)=x^3+6x^2-11x-6$ by $x-2$
 (v) $p(x)=x^4-x^3+x^2-x-1$ by $x+2$ (vi) $p(x)=x^4+x^3-x^2+x-1$ by $x-1$
 (vii) $p(x)=x^5+x^3-2x^2-3$ by $x+3$ (viii) $p(x)=x^5-x^4+x^3-3x^2+6x-6$ by $x-3$
 (ix) $p(x)=2x^4-2x^3+100x^2-168x+95$ by $x-2$
 (x) $p(x)=6x^4-72x^3+300x^2-564x+270$ by $x-5$

2. K جي ڪهڙي ملهه لاءِ، گھڻ رقمي $p(x)=x^3+x^2-14x-k$ جو جزو $x-2$ ٻڙي آهي.

3. m جي ڪهڙي ملهه لاءِ $x^3+mx^2-7x-10$ جو جزو $x-2$ ٿيندو.

4. m جي ڪهڙي ملهه لاءِ $x^3-7x^2+6x-3m$ جو $x+2$ جزو آهي.

5. k جي ڪهڙي ملهه لاءِ $P(x)=2x^3-4mx^2+x-1$ گھڻ رقمي -1 جي، ٻڙي آهي.



4.4 تہ درجي گھڻ رقمين جا جزا لهڻ

اسان اڳ ۾ هڪ درجي ۽ ٻه درجي گھڻ رقمين کي حل ڪرڻ جا طريقا پڙهي آيا آهيون. هاڻ اسان جزن واري سڌيان کي استعمال ڪري تہ درجي گھڻ رقمين جو ملهه لهنداسين.

4.4.1 جزن وارو سڌيان استعمال ڪري تہ درجن گھڻ رقمين جا جزا لهڻ تہ درجي گھڻ

رقمين جا جزا، جزن واري سڌيان سان لهڻ جي لاءِ، اهو ضروري آهي تہ گھڻ رقمين جو هڪ جزو يا وڌيڪ ٻڙيو معلوم هجن. اچو تہ هيٺيان مثال ڏسون

مثال 01 $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ جا جزا لهو

حل: فرض ڪريو تہ $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

6 جا جزا آهن $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

$$p(1) = (1)^3 - 6(1)^2 + 11(1) - 6$$

$$p(1) = 1 - 6 + 11 - 6$$


$$p(1) = 0$$

تنهنڪري $P(x)$ جو $x-1$ هڪ جزو آهي

مصنوعي ورهاست ذريعي ونڊ

1	-6	11	-6	(قطار 1)
	1	-5	6	(قطار 2)
1	-5	6	0	(قطار 3)

$$\begin{aligned} p(x) &= (x-1)(x^2 - 5x + 6) \\ &= (x-1)\{x^2 - 2x - 3x + 6\} \\ &= (x-1)\{x(x-2) - 3(x-2)\} \end{aligned}$$



مثال 02

جا جزا لھو $x^3 - 4x^2 + x + 6$ حل: جيڪڏھن $x-1$ جزو آھي $P(x)$ جو تہ پوءِ

$$\begin{aligned} p(1) &= (1)^3 - 4(1)^2 + 1 + 6 \\ &= 1 - 4 + 1 + 6 \\ &= 4 \neq 0 \end{aligned}$$

تنھنڪري $x-1$ جزو نہ آھي $P(x)$ جوجيڪڏھن $x+1$ جزو آھي $P(x)$ جو تہ پوءِ

$$\begin{aligned} p(-1) &= (-1)^3 - 4(-1)^2 + 1(-1) + 6 \\ &= -1 - 4 - 1 + 6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

تنھنڪري $x+1$ جزو آھي $P(x)$ جو

مصنوعي ورھاست جي طريقي سان

-1	1	-4	1	6	(قطار 1)
	-1	5		-6	(قطار 2)
	1	-5		6	(قطار 3)
				0	

$$\begin{aligned} p(x) &= (x+1)(x^2 - 5x + 6) \\ &= (x+1)\{x^2 - 2x - 3x + 6\} \\ &= (x+1)\{x(x-2) - 3(x-2)\} \\ p(x) &= (x+1)(x-2)(x-3) \end{aligned}$$

مشق 4.8

جزن واري طريقي سان جزا معلوم ڪريو.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. $x^3 - x^2 + x - 1$ | 2. $x^3 - x^2 - x - 1$ | 3. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ |
| 4. $x^3 + 6x^2 - 11x - 6$ | 5. $x^3 + x^2 - x - 1$ | 6. $x^3 - 2x^2 + x - 1$ |
| 7. $6x^3 + 7x^2 - x - 2$ | 8. $x^3 + 8x^2 + 19x + 12$ | 9. $2x^3 + 9x^2 + 10x + 3$ |
| 10. $x^3 + 7x^2 + 14x + 8$ | 11. $x^3 + 9x^2 + 26x + 24$ | 12. $x^3 + 12x^2 + 44x + 48$ |

ورجایل مشق 4

صحیح ۽ غلط سوال

ہینیان جملا غور سان پڑھو ۽ صحیح بیان لاء T، غلط بیان لاء F تي گول لڳايو.

T/F	$x^2+x-6=(x+3)(x-2)$	(i)
T/F	$a^3+27=(a+3)(a^2-3a+9)$	(ii)
T/F	$b^3-8=(b-2)(b^2+2b+4)$	(iii)
T/F	$a^4-b^4=(a-b)(a+b)(a+b)^2$	(iv)
T/F	$a^6+b^6=(a^3+b^3)(a^3-b^3)$	(v)
T/F	$a^5+b^5=(a+b)^5$	(vi)

ہینین جملن کي مکمل کریو.

$16x^2-y^4=(4x-y^2)$	(i)
$x^3-64y^3=(x-4y)$	(ii)
$x^2+5x+6=(x+2)$	(iii)
$x^2+y^2=(x-y)^2$	(iv)
$a^3+27b^3=(a+3b)$	(v)

صحیح جواب تي ($a^2+2ab+b^2-c$) نکر کرو.(i) $a^2+2a-24$ جا جزا آھن

(a) $a+4, a-6$	(b) $a-4, a+6$
(c) $a+3, a-8$	(d) $a+8, a-3$

(ii) $a^2+2ab+b^2-c^2$ جا جزا آھن

(a) $(a-b+c)(x-b-c)$	(b) $(a+b+c)(a-b-c)$
(c) $(a+b+c)(a+b-c)$	(d) $(a+b+c)(a-b-c)$

جي سادي صورت آهي. $\frac{1}{x+y} + \frac{y}{x^2-y^2} =$ (v)

(a) $\frac{y+1}{x^2-y^2}$

(b) $\frac{x}{x^2-y^2}$

(c) $\frac{y}{x^2-y^2}$

(d) $\frac{y-1}{x^2-y^2}$

m جو مله لھو، جڏهن x^2+4x+m مڪمل چورس آھي. (vi)

(a) 8
(c) 4

(b) -8
(d) -4

خلاصو

- جزا لهڻ هڪ عمل آهي، جنهن ۾ اسان ڏنل گهڻ رقمي (اظهار) کي ٻه يا ٻن کان وڌيڪ اظهارن جي ضرب اپت ۾ ظاهر ڪندا آهيون.
- فارمولا:

$$ka + kb + kc = k(a + b + c) \quad (i)$$

$$\underline{ac + ad} + \underline{bc + bd} = a(c + d) + b(c + d) = (a + b)(c + d) \quad (ii)$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a)^2 + 2(a)(b) + (b)^2 = (a + b)^2 \quad (iii)$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a)^2 - 2(a)(b) + (b)^2 = (a - b)^2 \quad (iv)$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad (v)$$

- پاڇي ۽ وزن وارا سڌيان، ٻه اهم سڌيان آهن، هي اهڙي قسم جي گهڻ رقمين کي حل ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن، جن کي فارمولا جي مدد سان حل ڪري نه سگهيو آهي.

$$(ii) a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3 \quad (i) a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$$

$$(iv) a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2). \quad (iii) a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

- گهڻ رقمين جون پڙيون

جيڪڏهن ڪو مخصوص عدد، گهڻ رقمي $P(x)$ ۾ بدلجندڙ x جو متبادل آهي، جيئن $P(a)$ جي قيمت پڙي آهي، ته پوءِ a کي گهڻ رقمي (Px) جو پڙي چئبو آهي.

- وزن وارو سڌيان

جن واري سڌيان کي هن ريت بيان ڪري سگهيو آهي

جيڪڏهن $p(a) = 0$ ته هڪ درجي گهڻ رقمي $(x - a)$ ، گهڻ رقمي $p(x)$ جو هڪ جزو آهي. مصنوعي ورهاست واري طريقي جي وضاحت

قدم I: گهڻ رقمي $P(x)$ جا عددي سڙا (منڊا) ۽ مستقل (Constant) پهرين قطار ۾ ننڍو وڌائي ترتيب ۾ لکو.

قدم II: پهريون عددي سڙو (منڊو)، 3 قطار ۾ ان جي هيٺان 1 قطار جي ساڳي جاءِ تي لکو.

قدم III: عددي سڙي ۽ ان جي ضربيندڙ 2 جي ضرب اپت کي قطار 2 جي هيٺان لکو ۽ جوڙ ڪري ان جو جوڙ قطار 3 ۾ لکو ۽ ساڳي عمل کي ورجايو.

آلجبري هيرا ڦيري

ALGEBRAIC
MANIPULATION

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي مطالعي کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ♦ آلجبري اظهارن جو جزن ذريعي وڏو عام پورو ونڊيندڙ (H.C.F) ۽ ننڍي عام ڀڄ ايت معلوم ڪندا.
- ♦ ونڊ ذريعي، وڏو عام پورو ونڊيندڙ ۽ ننڍي عام ڀڄ ايت ظاهر ڪندا.
- ♦ وڏي عام پوري ونڊيندڙ ۽ ننڍي عام ڀڄ ايت جي وچ ۾ تعلق بابت ڄاڻي سگهندا.
- ♦ وڏو عام پورو ونڊيندڙ ۽ ننڍي عام ڀڄ ايت سان تعلق رکندڙ روزمره زندگي جا حساب حل ڪري سگهندا.
- ♦ وڏو عام پورو ونڊيندڙ ۽ ننڍي عام ڀڄ ايت کي استعمال ڪري، جوڙ، ڪٽ، ضرب ۽ ونڊ تي مشتمل اڻپوري اظهارن کي حل ڪري سگهندا.
- ♦ آلجبري اظهارن جو جزن ۽ ونڊ ذريعي ٻيومول معلوم ڪري سگهندا.

تعارف:

آلجبري هيرا ڦيري (manipulation)، آلجبري اظهارن جي هيراڦيري سان تعلق رکي ٿي جي اظهار اڪثر ڪري سادي صورت ۾، يا اهڙي صورت ۾ هوندو جنهن کي آساني سان حل ڪري سگهجي، اها آلجبري اظهارن جي حسابن کي حل ڪرڻ لاءِ اهم ۽ بنيادي مهارت آهي.

هن يونٽ ۾ اسان جنرل ۽ وند ذريعي آلجبري اظهارن جي وڏي عام پوري ونديندڙ ۽ ننڍي عام پينچ اپٽ کي، ۽ ان جي روزمره زندگي ۾ استعمال تي بحث ڪنداسين.

5.1 وڏو عام پورو ونديندڙ (HCF) / (GCD) ۽ ننڍي عام پينچ اپٽ (LCM)

5.1.1: آلجبري اظهار جي جنرل ذريعي وڏو عام پورو ونديندڙ ۽ ننڍي عام پينچ اپٽ معلوم ڪريو.

(a) جنرل ذريعي وڏو عام پورو ونديندڙ لهڻ

مليل اظهار جو وڏو عام پورو ونديندڙ معلوم ڪرڻ لاءِ پهريائين اسان هر هڪ گهڻ رقمي جا جزا معلوم ڪنداسين، ان کانپوءِ اسان مشترڪ جنرل جي ضرب ڪنداسين. مشترڪ جنرل جي هن ضرب اپٽ کي، جنرل ذريعي وڏو عام پورو ونديندڙ چئبو آهي.

نوٽ: جيڪڏهن ڪوبه مشترڪ جزو نه هجي ته پوءِ و.ع.پ. و.ا. ٿيندو آهي.

مثال 01

هيٺين اظهارن جو جنرل ذريعي و.ع.پ. و.ا. ٿيو.

$$x^2 + 12x + 35 \text{ ۽ } x^2 + x - 20 \quad (i)$$

$$x^2 + 4x + 3 \text{ ۽ } (x+1)^2, x^2 - 1 \quad (ii)$$

حل: (i) اسان ڏنل اظهارن $x^2 + 12x + 35$ ۽ $x^2 + x - 20$ جا جزا الڳ الڳ ڪنداسين، جيڪي هن ريت آهن.

$$\begin{aligned} x^2 + x - 20 &= x^2 + 5x - 4x - 20 \\ &= x(x+5) - 4(x+5) \\ &= (x+5)(x-4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 + 12x + 35 &= x^2 + 7x + 5x + 35 \\ &= x(x+7) + 5(x+7) \\ &= (x+5)(x+7) \end{aligned}$$

ٻنهي اظهارن ۾ مشترڪ جزو آهي $(x+5)$.

تنهنڪري و.ع.پ. و.ا. ٿيندو $(x+5)$

حل: (ii) اسان ڏنل اظهارن x^2-1 , $(x+1)^2$ ۽ x^2+4x+3 جا جزا لهنداسين، جيڪي هيٺ ڏجن ٿا.

$$(x+1)^2 = (x+1)(x+1)$$

$$x^2-1 = (x+1)(x-1)$$

$$\text{۽ } x^2+4x+3 = x^2+3x+x+3$$

$$= x(x+3) + 1(x+3)$$

$$= (x+3)(x+1)$$

تنهي ڏنل اظهارن ۾ مشترڪ جزو $(x+1)$ آهي.

تنهنڪري و ع پ و ٿيندو $(x+1)$

هيٺين اظهارن جو جزو ذريعي و ع پ و لهو.

مثال 02

$$a^3-b^3, a^6-b^6$$

حل:

$$a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$$

$$a^6-b^6 = (a^2)^3 - (b^2)^3$$

$$= (a^2 - b^2)\{(a^2)^2 + a^2b^2 + (b^2)^2\}$$

$$= (a-b)(a+b)\{(a^2)^2 + 2a^2b^2 + (b^2)^2 - a^2b^2\}$$

$$= (a-b)(a+b)\{(a^2 + b^2)^2 - (ab)^2\}$$

$$= (a-b)(a+b)(a^2 + b^2 - ab)(a^2 + b^2 + ab)$$

$$\text{H.C.F} = (a-b)(a^2 + b^2 + ab) = a^3 - b^3$$

(b) جزو ذريعي ننڍي عام پنج ايت لهڻ

ٻه يا ٻن کان وڌيڪ گهڻ رقمين جي ن ع پ ا، ننڍي درجي وارو اهڙو اظهار آهي جيڪو مليل گهڻ رقمي سان ونڊ جي سگهندو.

جزو ذريعي ن ع پ ا لهڻ لاءِ اسان هيٺين فارمولا استعمال ڪنداسين.

ن ع پ ا = مشترڪ جزو جي ضرب x غير مشترڪ جزو جي ضرب.

$$x^3-8 \text{ ۽ } x^2+x-6 \text{ جي ن ع پ ا لهو.}$$

مثال 01

اسان هاڻ x^3-8 ۽ x^2+x-6 جا جزا لهنداسين.

حل:


$$\therefore x^3-8 = (x)^3 - (2)^3 = (x-2)(x^2+2x+4)$$

$$\text{۽ } x^2+x-6 = x^2+3x-2x-6 = x(x+3) - 2(x+3)$$

$$= (x+3)(x-2)$$

مشترڪ جزو آهي $(x-2)$

غير مشترڪ جزا آهن $(x+3)(x^2+2x+4)$



ن ع پ ا = مشترک جزا × غیر مشترک جزا

$$(x-2)(x^2+2x+4)(x+3)=(x^3-8)(x+3)=1$$

مثال 2: x^3-1 ۽ x^3-2x^2+x جي ننڍي عام پنج ايت لھو.

اسان ڏنل اظهارن x^3-1 ۽ x^3-2x^2+x جا جزا لھنداسين.

$$\therefore x^3-1=(x)^3-(1)^3=(x-1)(x^2+x+1)$$

$$\text{۽ } x^3-2x^2+x=x(x^2-2x+1)=x(x-1)^2$$

ن ع پ ا = مشترک جزا × غیر مشترک جزا

$$x(x-1)^2(x^2+x+1)=1$$

5.1.2 وڏو عام پورو ونڊيندڙ ۽ ننڍي عام پنج ايت جي وچ ۾ تعلق بابت ڄاڻڻ. ٻن

گھڻ

رقمين $P(x)$ ۽ $q(x)$ جي صورت ۾ و ع پ و ۽ ن ع پ ا، جو تعلق هيٺين

طرح بيان ڪيو آھي.

$$p(x) \times q(x) = 1 \text{ ن ع پ و } \times$$

مثال 1: هيٺ ڏنل گھڻ رقيمين $P(x)$ ۽ $q(x)$ جي، ن ع پ ا ۽ و ع پ و لھو ۽

ن ع پ ا ۽ و ع پ و جي پاڻ ۾ تعلق جي چڪاس / تصديق ڪريو.

$$p(x) = x^2 - 5x + 6 \text{ ۽ } q(x) = x^2 - 9$$

حل: سڀ کان پھريائين، ڏنل گھڻ رقيمين $P(x)$ ۽ $q(x)$ جا ننڍي عام جزا لھو

$$p(x) = x^2 - 5x + 6$$

$$= x^2 - 3x - 2x + 6$$

$$= x(x-3) - 2(x-3)$$

$$= (x-3)(x-2)$$

$$\text{۽ } q(x) = x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$$

$$\text{و ع پ و } = (x-3)$$

$$(x-2)(x-3)(x+3) = (x-2)(x^2-9) = 1 \text{ ن ع پ ا}$$

هان $P(x)$ ۽ $q(x)$ جي ضرب ايت لھو

$$\text{so, } p(x) \times q(x) = (x^2-5x+6) \times (x^2-9) \dots (i)$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = (x-2)(x-3)(x+3) \times (x-3)$$

$$\Rightarrow = (x^2-5x+6) \times (x^2-9) \dots (ii)$$

(i) ۽ (ii) جي مليل نتيجن مان اسان کي معلوم ٿيو ته

$$P(x) \times q(x) = 1 \text{ ن ع پ و } \times$$

تنھنڪري تصديق ٿي وئي.

مثال 2:

هيٺين گهڻ رقمين جي فارمولا جي مدد سان ن ع پ ا، لھو

$$q(x) = x^2 + 8x + 12 \text{ ۽ } p(x) = x^2 + 14x + 48$$

حل: پھريائين اسان $P(x)$ ۽ $q(x)$ جو و ع پ و لھنداسين


$$\begin{aligned} p(x) &= x^2 + 14x + 48 \\ &= x^2 + 8x + 6x + 48 \\ &= x(x+8) + 6(x+8) \\ &= (x+6)(x+8) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{۽ } q(x) &= x^2 + 8x + 12 \\ &= x^2 + 6x + 2x + 12 \\ &= x(x+6) + 2(x+6) \\ &= (x+2)(x+6) \end{aligned}$$

تنھنڪري $P(x)$ ۽ $q(x)$ جو و ع پ و آھي $x+6$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= \frac{p(x) \times q(x)}{\text{HCF}} \\ &= \frac{(x^2 + 14x + 48) \times (x^2 + 8x + 12)}{(x+6)} \\ &= \frac{(x+6)(x+8)(x+2)(x+6)}{(x+6)} \end{aligned}$$

$$\text{LCM} = (x+2)(x+6)(x+8).$$



5.1.3: جزن يا ونڊ ذريعي و ع پ و ۽ ن ع پ ا کي ظاهر ڪرڻ.

ٻه يا ٻن کان وڌيڪ آڱري اظهارن جو ونڊ ذريعي و ع پ و لھڻ جو لاءِ هيٺيان مثال سمجھڻ ۾ مدد ڪندا.

مثال 1: هيٺ ڏنل گھڻ رقمين جو ونڊ ذريعي و ع پ و معلوم ڪريو.

$$2x^3 + 9x^2 + 11x + 2 \text{ ۽ } 2x^3 + 7x^2 + 4x - 4$$

حل: اصلوڪي ونڊ جي طريقي سان اسان کي ملندو.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2x^3 + 7x^2 + 4x - 4 \overline{) 2x^3 + 9x^2 + 11x + 2} \\ \underline{-2x^3 + 7x^2 + 4x + 4} \\ 2x^2 + 7x + 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x \\ 2x^2 + 7x + 6 \overline{) 2x^3 + 7x^2 + 4x - 4} \\ \underline{-2x^3 + 7x^2 + 6x + 0} \\ -2x - 4 \end{array}$$

2- کي (common) ڪرڻ سان

$$\begin{array}{r} 2x+3 \\ x+2 \overline{) 2x^2 + 7x + 6} \\ \underline{-2x^2 + 4x + 0} \\ 3x + 6 \\ \underline{-3x + 6} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

گهربل و ع پ و آهي $x+2$

مثال 2: هيٺ ڏنل گھڻ رقمين جو ونڊ ذريعي و ع پ و معلوم ڪريو.

$$x^2 + 4x + 3 \text{ ۽ } x^2 + 2x + 1, x^2$$

حل: پهريائين اسان ٻن اظهارن جو و ع پ و لهنداسين ۽ پوءِ ان جو اتي اظهار

سان و ع پ و لهنداسين،

هاڻ اصلوڪي ونڊ جي طريقي سان اسان کي ملندو

$$\begin{array}{r} 1 \\ x^2 + 2x + 1 \overline{) x^2 + 4x + 3} \\ \underline{x^2 + 2x + 1} \\ 2x + 2 \end{array}$$

اسان $+2$ کي (common) خارج ڪرڻ سان

وري.

$$\begin{array}{r}
 x+1 \\
 x+1 \overline{) x^2 + 2x + 1} \\
 \underline{-x^2 \pm x + 0} \\
 x+1 \\
 \underline{-x \pm 1} \\
 0 \quad 0
 \end{array}$$

ته $x^2 + 2x + 1$ سان $x+1$ ۽ $x^2 + 4x + 3$ جو و ع پ و آهي $x+1$
 هاڻ اسان $x+1$ ۽ $x^2 - 1$ جو و ع پ و لهنداسين

$$\begin{array}{r}
 x-1 \\
 x+1 \overline{) x^2 - 1} \\
 \underline{-x^2 \pm x} \\
 -x - 1 \\
 \underline{+x + 1} \\
 0 \quad 0
 \end{array}$$

تنهي گهڻ رقمين جو و ع پ و آهي $(x+1)$

هاڻ اسان ونڊ ذريعي ن ع پ و لهنداسين

په يا بن کان وڌيڪ الجبري اظهارن (گهڻ رقمين) جي ونڊ ذريعي ن ع پ
 ا معلوم ڪرڻ لاءِ هيٺين فارمولا استعمال ڪنداسين

$$\frac{\text{ٻن گهڻ رقمين جي ضرب ايت}}{\text{ٻن گهڻ رقمين جو و ع پ و}} = \text{L.C.M}$$

مثال 3:

$x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ ۽ $x^3 - 4x + 3$ جي ن ع پ و آهي

حل:

$x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ ۽ $x^3 - 4x + 3$ جي طريقي سان و ع پ و آهي
 پهريائين عام ونڊ جي طريقي سان و ع پ و آهي

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 4x + 3 \overline{) x^3 - 6x^2 + 11x - 6} \\
 \underline{-x^3 \quad \pm 4x \pm 3} \\
 -6x^2 + 15x - 9
 \end{array}$$

$-6x^2 + 15x - 9$ مان -3 کي خارج ڪرڻ سان $2x^2 - 5x + 3$ ملندو

هاڻ $2x^2 - 5x + 3$ by 2 سان ضرب ڪرڻ سان

$$\begin{array}{r}
 x+5 \\
 2x^2 - 5x + 3 \overline{) 2x^3 - 8x + 6} \\
 \underline{-2x^3 \pm 3x \pm 5x^2} \\
 5x^2 - 11x + 6
 \end{array}$$

2 سان ضرب ڪرڻ سان ملندو $10x^2 - 22x + 12$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 2x^2 - 5x + 3 \overline{) 10x^2 - 22x + 12} \\ \underline{-10x^2 \quad 25x + 15} \\ 3x - 3 \end{array}$$

(3x-3) مان 3 خارج ڪرڻ سان ملندو (x-1)

$$\begin{array}{r} 2x-3 \\ x-1 \overline{) 2x^2 - 5x + 3} \\ \underline{-2x^2 \quad 2x} \\ -3x + 3 \\ \underline{3x + 3} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\text{HCF} = x-1$$

اسان کي خبر آهي ته $\frac{p(x) \cdot q(x)}{\text{HCF}}$

$$\text{L.C.M} = \frac{(x^3 - 6x^2 + 11x - 6)(x^3 - 4x + 3)}{x-1}$$

هاڻ $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ کي $x-1$ سان ونڊ ڪريو.

$$\begin{array}{r} x-1 \overline{) x^3 - 6x^2 + 11x - 6} \\ \underline{-x^3 \quad mx^2} \\ -5x^2 + 11x \\ \underline{-5x^2 \quad \pm 5x} \\ 6x - 6 \\ \underline{-6x \pm 6} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\text{L.C.M} = (x^3 - 4x + 3)(x^2 - 5x + 6)$$

5.1.4 و ع پ ع ۽ ن ع پ ا، سام تعلق رکندڙ روزمره زندگي جا حساب حل ڪريو.

مثال 1: ردا وٽ ڪپڙن جا ٻه ٽڪڙا آهن، هڪ 45 انچ ۽ ٻيو 90 انچ ويڪرو آهي. هوءَ ٻنهي پٽين کي برابر ويڪر ۾ ڪٽڻ چاهي ٿي. ته ڪيتري ويڪر واريون پٽيون ڪٽي سگهندي.

حل: هي حساب و ع پ و جي ذريعي حل ڪري سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته هوءَ ڪپڙي کي ممڪن ويڪرن پٽين ۾ ڪٽڻ يا تقسيم ڪري ٿي تنهنڪري 45 ۽ 90 جو و ع پ و ٿيندو

$$45 = 3 \times 3 \times 5$$

$$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

و ع پ و = مشترڪ جزن جي ضرب اپت

$$3 \times 3 \times 5 =$$

$$45 =$$

ته پوءِ ردا هر هڪ ٽڪر 45 انچن جي ويڪر جو ڪٽي.

مثال 2: سرفراز هر 8 ڏينهن کان پوءِ ۽ عمران هر 4 ڏينهن کان پوءِ ورزش ڪن ٿا. سرفراز ۽ عمران ٻنهي اڃا ورزش ڪئي آهي، ته ڪيترن ڏينهن کان پوءِ هو گڏجي ورزش ڪندا.

حل: هي حسان ن ع پ ا جي ذريعي حل ڪري سگهيو، ڇاڪاڻ ته اسان ورزش جو وقت معلوم ڪرڻ جي ڪوشش پيا ڪريون، اهو 8 ۽ 4 جي ن ع پ ا آهي.

$$8 = 2 \times 2 \times 2$$

$$4 = 2 \times 2$$

ن ع پ ا = مشترڪ جزن جي ضرب اپت x غيرمشتڪ جزن جي ضرب اپت

$$2 \times 2 \times 2 =$$

$$8 =$$

تنهنڪري اهي وري 8 ڏينهن کان پوءِ گڏجي ورزش ڪندا.

مشق 5.1

1. هيٺين اظهارن جو جزن ذريعي وڌو عام پورو ونڊيندڙ لھو.

- (i) $72x^4y^5z^2$ and $120x^3y^6z^8$ (ii) $18r^3s^4t^5$, $120r^4s^3t^8$ and $210r^7s^7t^3$
 (iii) $x^2-3x-18$ and x^2+5x+6 (iv) $4x^2-9$ and $2x^2-5x+3$
 (v) $(2a^2-8b^2)$, $(4a^2+4ab-24b^2)$ and $(2a^2-12ab+16b^2)$
 (vi) x^3+x^2+x+1 and x^3+3x^2+3x+1

2. هيٺين اظهارن جو ونڊو وسيلي وڌو عام پورو ونڊيندڙ لھو.

- (i) x^2+3x+2 and $3x^2-3x-6$
 (ii) $2x^3+15x^2+31x+12$ and $3x^3+23x^2+50x+24$
 (iii) $4x^3-2x^2-100x-50$ and $x^4+10x^3-16x^2-250x-225$
 (iv) $x^2+xy-2y^2$, $x^2+3y+2y^2$ and $x^3+3x^2y+2xy^2+2y^3$

3. هيٺين اظهارن جي جزن وسيلي ننڍي عام پنج ايت لھو.

- (i) $27a^4b^5c^2$ and $81ab^2c^8$ (ii) $24p^2q^3r^4$, $104p^5q^4r^5$ and $300p^3qr^8$
 (iii) $21x^2-14x$ and $3x^2-5x+2$ (iv) $x^2+11x+28$ and x^2+x-12
 (v) $6x^2+11x+3$, $2x^2-5x-11$ and $3x^2-11x-4$
 (vi) x^2-y^2 , x^3-y^3 and $x^4+x^2y^2+y^4$

4. ونڊ وسيلي ننڍي عام پنج ايت لھو.

- (i) $x^2-25x+100$ and x^2-x-20
 (ii) $3x^2+14x+8$ and $6x^2+x-2$
 (iii) $x^2-y^2-z^2-2yz$ and $y^2-z^2-x^2-2xz$
 (iv) $3x^3+9x^2-84x$ and $4x^4-24x^3+32x^2$

5. جيڪڏهن $x^2-11x+24$ ۽ $x+6$ جو و.ع پ و. (x-3) آهي ته ان جي ن ع پا لھو.

6. $x^2+8x+15$ ٻن اظهارن جو و.ع پ و. ۽ ن ع پا (x+3) ۽ $(x^3+7x^2+7x-15)$ آهي،

جيڪڏهن هڪ اظهار آهي ته ٻيو اظهار لھو.

7. ٻن ٻه درجي گھڻ رقمين جو و.ع پ و. ۽ ن ع پا، ترتيبوار $3x-2$ ۽ x^3+7x^2-4

آھن ته ٻنهي اظهارن جي ضرب ايت معلوم ڪريو.

8. و.ع پ و. ۽ ن ع پا جي وچ ۾ تعلق جي تصديق ڪرو.

(HCF × LCM = p(x) q(x)) آهي جڏهن ته $p(x) = x^2 - 8x - 20$ ۽

$q(x) = x^2 - 15x + 50$ آهي.

9. هڪ وادي ڪاٺ جا ڪجهه تختا ورتا، جن مان ڪجهه 12 س م ۽ ڪجهه 18 س م ڊگها آهن. هو انهن کي اهڙي طرح ڪٽڻ چاهي ٿو ته جيئن هن وٽ آساني سان استعمال ڪرڻ جي لاءِ هڪجيتري ماپ وارا تختا هجن. ڪاٺ جو ضايع ڪرڻ کان سواءِ هن کي ڪيتري ماپ جا تختا ڪٽڻ گهرجن.
10. ترين A ۽ ترين B حيدرآباد ۾ صبح جو 10:30 تي بيهن ٿيون. ترين A هر 12 منٽن کان پوءِ ۽ ترين B هر 14 منٽن کان پوءِ بيهن ٿيون. ٻڌايو ته اهي ٻئي گڏ ڪڏهن بيهنديون.

5.2 الجبري اڻپورن تي بنيادي عمل

جيڪڏهن $p(x)$ ۽ $q(x)$ الجبري اظهار آهن ۽ $q(x) \neq 0$ ته پوءِ $\frac{p(x)}{q(x)}$ هڪ الجبري اڻپور سڏبو آهي.

الجبري اڻپور جي سادي صورت، هڪ اهڙو اڻپور آهي، جنهن جي انس ۽ چيد ۾ 1 کانسواءِ ڪوبه مشترڪ جزو نه هجي. الجبري اڻپور ۾ بنيادي عمل $(+, -, \div, \times)$ جو استعمال عام اڻپور وانگر ٿيندو آهي.

هيٺين مثالن ۾ اسان و x ۽ y جي استعمال واري بنيادي عملي وارن اڻپوري اظهارن کي سادي صورت ۾ ڪرڻ بابت وضاحت ڪنداسين.

5.2.1 وڏو عام پورو ونڊينڊڙ ۽ ننڍي عام پنج اپت جي استعمال وسيلي، جوڙ، ڪٽ، ضرب

۽ ونڊ تي مشتمل اڻپوري اظهارن کي گهٽ ڪرڻ.

مثال 01 سادي صورت ۾ آڻيو. $\frac{x^2 - x - 6}{2x^2 - 5x - 3} + \frac{1}{4x^2 - 1}$


حل:

$$\frac{x^2 - x - 6}{2x^2 - 5x - 3} + \frac{1}{4x^2 - 1}$$

$$= \frac{x^2 - 3x + 2x - 6}{2x^2 - 6x + x - 3} + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)}$$

$$= \frac{x(x-3) + 2(x-3)}{2x(x-3) + 1(x-3)} + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)}$$

$$= \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(2x+1)} + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} \quad x \neq 3$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{(x+2)}{(2x+1)} + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} \\
 &= \frac{(x+2)(2x-1)+1}{(2x-1)(2x+1)} \\
 &= \frac{2x^2 - x + 4x - 2 + 1}{(2x-1)(2x+1)} = \frac{2x^2 + 3x - 1}{(2x-1)(2x+1)} \\
 &\frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{2x^2+x-6} \text{ سادي صورت ۾ آڻيو}
 \end{aligned}$$

مثال 02

$$\begin{aligned}
 &\frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{2x^2+x-6} \\
 &= \frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{2x^2+4x-3x-6} \\
 &= \frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{2x(x+2)-3(x+2)} \\
 &= \frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{(x+2)(2x-3)} \\
 &= \frac{2(2x-3)-(x-4)}{(x+2)(2x-3)} \\
 &= \frac{4x-6-x+4}{(x+2)(2x-3)} \\
 &= \frac{3x-2}{(x+2)(2x-3)} \\
 &= \frac{3x-2}{2x^2+x-6}
 \end{aligned}$$

حل:

$$\frac{ab^2+2a}{ab-6+2b-3a} \times \frac{b^2-6b+9}{b^3+2b} \text{ سادي صورت ۾ آڻيو}$$

مثال 03

$$\begin{aligned}
 &\frac{ab^2+2a}{ab-6+2b-3a} \times \frac{b^2-6b+9}{b^3+2b} \\
 &= \frac{a(b^2+2)}{b(a+2)-3(a+2)} \times \frac{b^2-3b-3b+9}{b(b^2+2)} \\
 &= \frac{a}{(a+2)(b-3)} \times \frac{b(b-3)-3(b-3)}{b} \\
 &= \frac{a}{(a+2)(b-3)} \times \frac{(b-3)(b-3)}{b}
 \end{aligned}$$

حل:

$$= \frac{a}{(a+2)(b-3)} \times \frac{(b-3)(b-3)}{b}$$

$$= \frac{a(b-3)}{b(a+2)} \quad \begin{array}{l} \text{جڏهن ته } p+q \neq 0 \\ \text{۽ } r+s \neq 0 \end{array}$$

مثال 4: سادي صورت ۾ آڻيو. $\frac{p^2 - q^2}{r^2 + 2rs + s^2} \div \frac{2(p+q)}{3(r+s)s}$

حل:

$$\frac{p^2 - q^2}{r^2 + 2rs + s^2} \div \frac{2(p+q)}{3(r+s)s}$$

$$= \frac{(p+q)(p-q)}{(r+s)^2} \div \frac{2(p+q)}{3(r+s)s}$$

$$= \frac{(p+q)(p-q)}{(r+s)^2} \times \frac{3(r+s)s}{2(p+q)}$$

$$= \frac{3s(p-q)}{2(r+s)}, \quad \begin{array}{l} \text{جڏهن ته } p+q \neq 0 \\ \text{۽ } r+s \neq 0 \end{array}$$

مشق 5.2

1. هيٺين کي سادي صورت ۾ آڻيو.

(i) $\frac{4x}{x^2 + 2x + 1} + \frac{3}{x+1}$

(ii) $\frac{3}{x(2x+1)} + \frac{6x+7}{3x(x+1)}$

(iii) $\frac{3x-1}{x^2 + 2x + 1} - \frac{4x^2 - 1}{x^2 - 2x - 3}$

(iv) $\frac{1}{x+1} - \frac{2}{x+2} + \frac{3}{x+3}$

(v) $\frac{x^2 + 4x + 3}{5} \times \frac{10}{x+1}$

(vi) $\frac{x^2 - 4x - 21}{x^2 - 6x - 7} \div \frac{x+9}{x+1}$

(vii) $\left[\frac{3}{x+1} + \frac{1}{x+2} \right] \div \left[\frac{2}{x+3} - 1 \right]$

(viii) $\left(\frac{1}{x^2 - 9} \right) \div \left(\frac{1}{x+3} \right) - \frac{3}{x-2}$

(ix) $\frac{1}{x^2 + 8x + 15} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} - \frac{1}{x^2 + x - 12}$

(x) $2 \left(\frac{x^2 + 7x + 12}{x^2 - 16} + \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 4x + 4} \right) \times \frac{x^2 - 2x - 8}{2x + 8x^2 + 4}$

5.3 آڄيري اظهار جو ٻيو مول

5.3.1 آڄيري اظهار جو جزن ۽ ونڊ ذريعي ٻيو مول لهو.

آڄيري اظهارن جو ٻيو مول لهڻ لاءِ اسان ٻن طريقن بابت بحث ڪنداسين.

(a) جزن ذريعي (b) ونڊ ذريعي

(a) جزن ذريعي ٻيو مول لهڻ جو طريقو

مثال 1: آڄيري اظهار $49x^2 + 126xy + 81y^2$ جو ٻيو مول جزن ذريعي لهو.

$$\begin{aligned}
 & 49x^2 + 126xy + 81y^2 \\
 &= (7x)^2 + 2(7x)(9y) + (9y)^2, \\
 &= (7x + 9y)^2,
 \end{aligned}$$

تنهنڪري

$$\sqrt{49x^2 + 126xy + 81y^2} = \sqrt{(7x + 9y)^2} = 7x + 9y$$

(b) ونڊ ذريعي ٻيو مول لهڻ جو طريقو

مثال 02: آڄيري اظهار $4x^4 + 12x^3 - 19x^2 - 42x + 49$ جو ونڊ ذريعي ٻيو مول لهو.

حل: طريقو هيٺ واضح ڪيو ويو آهي.

	$2x^2 + 3x - 7$
$2x^2$	$4x^4 + 12x^3 - 19x^2 - 42x + 49$
$+ 2x^2$	$\pm 4x^4$
$4x^2 + 3x$	$12x^3 - 19x^2 - 42x + 49$
$+ 3x$	$\pm 12x^3 \pm 9x^2$
$4x^2 + 6x - 7$	$-28x^2 - 42x + 49$
$- 7$	$28x^2 \quad 42x \pm 49$
$4x^2 + 6x - 14$	$0 \quad 0 \quad 0$

تنهنڪري

$$\sqrt{4x^4 + 12x^3 - 19x^2 - 42x + 49} = 2x^2 + 3x - 7.$$

مثال 03 a جو اهڙو ملهه لھو جيڪو $36x^4 + 36x^3 + 57x^2 + 24x + a$ کي هڪ مڪمل

چورس بڻائي.

حل: وٺڻ واري طريقي سان اسان کي

$$\begin{array}{r|l}
 6x^2 & 36x^4 + 36x^3 + 57x^2 + 24x + a \\
 +6x^2 & \pm 36x^4 \\
 \hline
 12x^2 + 3x & 36x^3 + 57x^2 - 24x + a \\
 +3x & \pm 36x^3 \pm 9x^2 \\
 \hline
 12x^2 + 6x + 4 & 48x^2 + 24x + a \\
 +4 & \pm 48x^2 \pm 24x \pm 16 \\
 \hline
 12x^2 + 6x + 8 & a - 16
 \end{array}$$

مليل اظهار مڪمل چورس ٿيندو جيڪڏهن

$$a - 16 = 0 \Rightarrow a = 16,$$

تنهنڪري $a = 16$ ڏنل اظهار کي مڪمل چورس بڻائيندو.

مثال 04 $x^4 + 4x^3 + 10x^2 + 5$ ۾ ڇا جوڙ ڪجي جو هڪ مڪمل چورس ملي.

حل: وٺڻ واري طريقي سان اسان کي

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 & x^4 + 4x^3 + 10x^2 + 5 \\
 x^2 & \pm x^4 \\
 \hline
 2x^2 + 3x & 4x^3 + 0x^2 + 0x + 5 \\
 +3x & \pm 4x^3 \pm 4x^2 \\
 \hline
 2x^2 + 4x + 3 & 6x^2 + 0x + 5 \\
 +3 & \pm 6x^2 \pm 0x \pm 9 \\
 \hline
 2x^2 + 4x + 6 & -12x - 4
 \end{array}$$

يا $-(12x + 4)$

تنهنڪري $12x + 4$ جي جوڙ ڪرڻ سان ڏنل اظهار مڪمل چورس ٿيندو.

مشق 5.3

1. هيٺين آڻجبري اظهارن جو ٻيو مول جزن وسيلي لھو.

(i) $36x^2 - 60xy + 25y^2$

(ii) $9x^2 + \frac{1}{x^2} + 6$

(iii) $4x^4y^4 - \frac{12x^3y^3}{z^2} + \frac{9x^2y^2}{z^4}$

(iv) $36(3 - 2x)^2 - 40(3 - 2x)y + 16y^2$

(v) $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 4\left(x - \frac{1}{x}\right) + 2$

(vi) $(4x^2 - 4x + 1)(9x^2 - 54x + 81)$

(vii) $(x^2 - 2x + 1)(x^2 - 6x + 9)$

(viii) $(x^2 + 8x + 15)(x^2 + 7x + 10)(x^2 + 5x + 6)$

2. هيٺين آڻجبري اظهارن جو ٻيو مول ونڊ ذريعي لھو.

(i) $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$

(ii) $25x^4 + 40x^3 + 26x^2 + 8x + 1$

(iii) $4x^4 + 8x^3 + 20x^2 + 16x + 16$

(iv) $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 47 - \frac{14y}{x} + \frac{14x}{y}$

(v) $x^2 - 2x + 3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$

(vi) $x^2 + \frac{y^2}{9} + 9z + \frac{2xy}{3} + 2yz + 6xz$

(vii) $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 8\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) + 12$

(viii) $x^6 + \frac{1}{x^6} - 4\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) + 6, x \neq 0$

3. $4x^4 + 4x^3 + 17x^2 + 8x + 9$ ۾ ڇا جوڙ ڪجي، جو هڪ مڪمل چورس بڻائي.

4. $9x^6 - 12x^5 + 4x^4 - 18x^3 - 12x^2 + 18$ مان ڇا ڪٽ ڪجي جو هڪ مڪمل چورس بڻائي.

5. جو اهڙو ملهه جيڪو $9x^4 + 12x^3 + 34x^2 + mx + 25$ کي هڪ مڪمل

چورس بڻائي.

6. p ۽ q جي ڪهڙن ملهن لاءِ $x^4 + 8x^3 + 30x^2 + px + q$ اظهار هڪ مڪمل چورس ٿيندو.

ورجایل مشق 5

1. غلط ۽ صحيح سوال

هينين جملن کي غور سان پڙهو ۽ صحيح بيان لاءِ "T" غلط بيان لاءِ "F" تي گول لڳايو.

T / F (i) $y^2 - 4$ ۽ $y - 2$ جو و ع پ و $y - 2$ آهي.

T / F (ii) $a^2 - 1$ ۽ $a^3 - 1$ جو و ع پ و $a + 1$ آهي.

T / F (iii) $x^3 + 1$ ۽ $x + 1$ جي ن ع پ ا، $x^3 + 1$ آهي.

T / F (iv) $x^2 + y^2$ ۽ $x^2 - y^2$ جي ن ع پ ا، $x^4 - y^4$ آهي.

T / F (v) $a^2 + 5a + 6$ جو و ع پ و $a^2 + 4a + 3$ آهي.

2. خال ڀريو.

(i) گهڻن رڻمين جو و ع پ و معلوم ڪرڻ لاءِ _____ طريقا آهن.

(ii) ٻن اظهارن جي ن ع پ ا x و ع پ و = _____ آهي.

(iii) $y^2 - 5y$ ۽ $y + 6$ جو و ع پ و _____ آهي.

(iv) $y^2 + 5y + 6$ ۽ $y^2 + 3y + 2$ جي ننڍي عام پنج اپت _____ آهي.

(v) $y^2 - \frac{1}{y^2}$ ۽ $y + \frac{1}{y}$ جو و ع پ و _____ آهي.

3. صحيح جواب تي (✓) تڪ لڳايو

(i) $x^3 - 8y^3$ ۽ $x^2 - 4xy + 4y^2$ جو و ع پ و آهي.

(a) $x - 4y$ (b) $x^2 + 2xy + y^2$

(c) $x + 2y$ (d) $(x - 2y)$

(ii) $(2y + 3z)^5$ ۽ $(2y + 3z)^3$ جي ن ع پ ا آهي.

(a) $2y + 3z$ (b) $(2y + 3z)^3$

(c) $(2y + 3z)^2$ (d) $(2y + 3z)^5$

(iii) $x^3 - y^3$ ۽ $x^2 + xy + y^2$ جو و ع پ و آهي.


(a) $x + y$ (b) $x^2 + xy + y^2$

(c) $x - y$ (d) $(x - y)^2$

(iv) $(x - y)^4$ ۽ $(x - y)^3$ جي ن ع پ ا آهي.

(a) $(x - y)$ (b) $(x - y)^3$

(c) $(x - y)^4$ (d) $(x - y)^7$



(v) $\frac{1}{x+y} + \frac{y}{x^2-y^2}$ جي سادي صورت آهي.

(a) $\frac{y+1}{x^2-y^2}$

(b) $\frac{x}{x^2-y^2}$

(c) $\frac{y}{x^2-y^2}$

(d) $\frac{x+y}{x^2-y^2}$

(vi) $\frac{y}{25x^2-y^2} - \frac{1}{5x-y}$ جي سادي صورت آهي.

(a) $\frac{5x}{25x^2-y^2}$

(b) $\frac{5x}{5x^2-y}$

(c) $\frac{-5x}{5x+y}$

(d) $\frac{-5x}{25x^2-y^2}$

(vii) $:\frac{a^3x^3+a^3y^3}{a^2(x+y)} =$

(a) ax^2+ay^2

(b) x^2+y^2

(c) $a(x^2-xy+y^2)$

(d) $a(x^2+xy+y^2)$

(viii) $:\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b} =$

(a) $\frac{a^2+b^2}{a-b}$

(b) $\frac{a^2-b^2}{a^2-b^2}$

(c) $\frac{a+b}{a^2-b^2}$

(d) $\frac{a-b}{a^2-b^2}$

(ix) $\frac{\text{HCF}}{\text{P} \times \text{Q}} = \frac{\text{P} \times \text{Q}}{\text{HCF}}$ ن ع پ ا

(a) $\frac{\text{HCF}}{\text{P} \times \text{Q}}$

(b) $\frac{\text{P} \times \text{Q}}{\text{HCF}}$

(c) $\frac{\text{P}}{\text{HCF}}$

(d) $\frac{\text{Q}}{\text{HCF}}$

(x) x^3+1 ۽ x^2-x+1 جي ن ع پ ا آهي.

(a) $x+1$

(b) x^2-x+1

(c) x^3+1

(d) x^2+x+1

خلاصو



♦ الجبري اظهارن جو و ع پ و ۽ ننڍي عام پنج ايت معلوم ڪرڻ لاءِ ٻه طريقا آهي.

(1) جزن ذريعي (2) ونڊ ذريعي

♦ ٻن اظهارن جي ن ع پ ا $\times$ و ع پ و = ٻن اظهارن جي ضرب ايت

♦ ن ع پ ا ۽ و ع پ و جي مدد سان الجبري اظهارن جي جوڙ، ڪٽ ضرب ۽ ونڊ معلوم ڪري سگهجي ٿي.

♦ الجبري اظهارن جو ٻيومول معلوم ڪرڻ لاءِ ٻه طريقا آهن.

(i) جزن واري طريقي سان ٻيومول

(ii) ونڊ واري طريقي سان ٻيومول.

KARACHIED

هڪ درجي مساواتون ۽ اڻ برابري

Linear Equation and Inequalities

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ هڪ بدلجندڙ (variable) واري هڪ درجي مساوات (equation) دهرائيندا.
- ◆ ناطق عددي سرن (منڊي) سان هڪ درجي مساواتون حل ڪندا.
- ◆ ٻئي مول جي نشانين واريون هڪ درجي مساواتون ساديون ڪندا ۽ انهن جو حل لهندا.
- ◆ قطعي ملهه (Absolute Value) بيان ڪري سگهندا.
- ◆ هڪ بدلجندڙ ۾ قطعي ملهه واريون مساواتون حل ڪندا.
- ◆ اڻ برابري ($>$, $<$) ۽ ($\geq$, $\leq$) واضح ڪندا.
- ◆ اڻ برابري جون خاصيتون سڃاڻي سگهندا، جهڙوڪ: (تہ رخي، متعدي، جوڙاپٽ ۽ ضرب اپٽ)
- ◆ ناطق عددي سرن (منڊي) واريو هڪ درجي غير مساواتون حل ڪندا.

6.1 هڪ درجي مساواتون

6.1.1 هڪ متغير (بدلجندڙ) (Variable) واري هڪ درجي مساوات (Equation) دهرايو.

جيڪڏهن هڪ کليل جملي ۾ "=" شامل هجي ته اهڙي جملي کي مساوات چئبو آهي. هڪ متغير (بدلجندڙ) (Variable) سان هڪ درجي مساوات جيئن: $ax+b=0$ ۽ $a \neq 0$ مساواتون آهن. جتي متغير (بدلجندڙ) (Variable) کي "1" سگهه آهي جيڪا عام طور تي ظاهر نه ڪبي آهي.

6.1.2 ناطق عددن واريون هڪ درجي مساواتون حل ڪريو.

اڻ ڄاتل متغير (بدلجندڙ) (Variable) جيڪو مساوات ۾ ڏنل آهي انجي مله لاءِ مساوات درست ٿي وڃي ته انکي حل يا مساوات جو مول چئبو آهي.

مثال 02 حل ڪيو $\frac{2}{3}(x+3) = 3 + \frac{5x}{9}$

حل $\frac{2}{3}(x+3) = 3 + \frac{5x}{9}$

$9 \times \frac{2}{3}(x+3) = 9 \times 3 + 9 \times \frac{5x}{9}$

ٻنهي پاسن 9 ضرب ڪرڻ سان

$\Rightarrow 3 \times 2(x+3) = 27 + 5x$

$\Rightarrow 6(x+3) = 27 + 5x$

$\Rightarrow 6x + 18 = 27 + 5x$

$\Rightarrow 6x - 5x = 27 - 18$

$\Rightarrow x = 9$

جيئن ته {9} حل سيٽ آهي.

مثال 01 حل ڪيو $3x-1=5$

حل $3x-1=5$

$\Rightarrow 3x = 5+1$

$\Rightarrow x = \frac{6}{3}$

$\Rightarrow x = 2$

جيئن ته {2} حل سيٽ آهي.


مثال 03 پيءُ جي عمر پٽ جي عمر کان تيرهوڻي آهي. اها چئن سالن کانپوءِ صرف

پنجوڻي ٿي وڃي ٿي ته ٻنهي جون موجوده عمريون ٻڌايو.

فرض ڪريو ته پٽ جي موجوده عمر x سال آهي

۽ پيءُ جي موجوده عمر $13x$ سال آهي

ڏنل شرط مطابق $\therefore 13x + 4 = 5(x + 4)$



$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow 13x + 4 = 5x + 20 \\
 &\Rightarrow 13x - 5x + 4 = 5x - 5x + 20 \\
 &\Rightarrow 8x + 4 = 20 \\
 &\Rightarrow 8x + 4 - 4 = 20 - 4 \\
 &\Rightarrow 8x = 16 \\
 &\Rightarrow \frac{8x}{8} = \frac{16}{8} \\
 &\Rightarrow x = 2
 \end{aligned}$$

ٻنهي پاسن کان $5x$ ڪٽ ڪرڻ سان

ٻنهي پاسن کان 4 ڪٽ ڪرڻ سان

جيئن ته پٽ جي موجوده عمر 2 سال

۽ پيءُ جي عمر $13 \times 2 = 26$ سال آهي.

مثال 04 جڏهن هڪ عدد جي $\frac{1}{3}$ حصي ۾ 16 جوڙ ڪرڻ سان جواب اصل عدد جو $2\frac{1}{3}$

اچي ته عدد لھو.

فرض ڪريو ته عدد x آهي،

حل:

$$16 + \frac{1}{3}x = 2\frac{1}{3}x$$

$$\Rightarrow 16x + \frac{1}{3}x = \frac{7}{3}x$$

$$\Rightarrow 16 = \frac{7}{3}x - \frac{1}{3}x$$

$$\Rightarrow 16 = \left(\frac{7}{3} - \frac{1}{3}\right)x$$

$$\Rightarrow 16 = \left(\frac{7-1}{3}\right)x$$

$$\Rightarrow 16 = \frac{6}{3}x$$

$$\Rightarrow 16 \times 3 = 6x$$

$$\Rightarrow \frac{48}{6} = x \Rightarrow x = 8$$

6.1.3 مساوات جنهن ۾ مول شامل آهن، هڪ درجي مساوات جي نموني سادي

ڪريو ۽ انهن جو حل لھو.

هڪ بدلجندڙ واري مساوات جنهن ۾ مول اظھار شامل هجن انکي مول

مساوات (Radical Equation) چئبو آھي.

مثال طور: $(3\sqrt{t} - \sqrt{t+1} = 2)$ ۽ $\sqrt{x} = 8$ مول مساواتون آهن.

هيٺين مثال جي مدد سان مساواتون حل ڪري سگهجن ٿيون.

مثال 01 حل ڪيو. $\sqrt{2x+11} = \sqrt{3x+7}$

حل:

$$\sqrt{2x+11} = \sqrt{3x+7}$$

$$\therefore (\sqrt{2x+11})^2 = (\sqrt{3x+7})^2$$

$$\Rightarrow 2x+11 = 3x+7$$

$$\Rightarrow 2x-3x = 7-11$$

$$\Rightarrow -x = -4$$

$$\Rightarrow x = 4$$

جيئن ته 4 حل سيٽ آهي.

چڪاس: مساوات ۾ $x=4$ جو ملهه وجهڻ سان

$$\sqrt{2(4)+11} = \sqrt{3(4)+7}$$

$$\sqrt{8+11} = \sqrt{12+7}$$

$$\sqrt{19} = \sqrt{19}$$

نوٽ: ڪنهن وقت مليل جزمولي مساوات کي مطمئن نه ڪندي آهي ته انکي ٻاهريان جز چئبو آهي.

مشق 6.1

1. هيٺيون مساواتون حل ڪريو:

(i) $\frac{1}{4}x = 5$

(ii) $\frac{x}{4} = -3$

(iii) $-5 = \frac{-x}{6}$

(iv) $\frac{-x}{8} = -5$

(v) $y - \frac{2}{5} = -\frac{1}{3}$

(vi) $2y - \frac{3}{5} = \frac{1}{2}$

(vii) $\frac{2x-4}{5} = \frac{5x-12}{4}$

(viii) $\frac{3x}{5} + 7 = \frac{2x}{3}$

(ix) $\frac{3x}{5} + 7 = \frac{2x}{3} + \frac{4x}{5}$

(x) $\frac{6}{2x-5} - \frac{4}{x-3} = 0$


(xi) $\frac{7x-4}{15} = \frac{7x+4}{10}$

(xii) $\frac{3x-2}{10} = \frac{7x-3}{15} - 2$

(xiii) $\frac{12x-3}{12} = \frac{12x+3}{8}$

(xiv) $\frac{1}{4}x + x = -3 + \frac{1}{2}x$

(xv) $\frac{1}{3} + 2m = m - \frac{3}{2}$



1. جڏهن هڪ عدد ۾ 25 جوڙ ڪري نتيجي کي اڌ ڪجي ٿو ته جواب اصل عدد جي ٽيڻ ٿئي ٿو، ٻڌايو ته عدد ڪهڙو آهي؟
2. هڪ عدد ۾ 4 جوڙ ڪرڻ سان نتيجو اصل عدد جي ٽيڻ مان 10 ڪٽ ڪرڻ جي برابر ٿئي ٿو، ٻڌايو ته عدد ڇا آهي.
3. بلال عليءَ کان 6 سال وڏو آهي، هاڻي کان 5 سال بعد سندن عمرين جو جوڙ 40 ٿيندو ته ٻنهي جي عمر ڪيتري آهي.
4. هيٺين مساواتن جو حل سيٽ لهو ۽ جوابن جي چڪاس پڻ ڪريو.

$$\begin{array}{lll} \text{(i)} \quad 6 + \sqrt{x} = 7 & \text{(ii)} \quad \sqrt{x-9} = 1 & \text{(iii)} \quad \sqrt{\frac{y}{4}} - 2 = 3 \\ \text{(iv)} \quad \sqrt{4x+5} = \sqrt{3x-7} & \text{(v)} \quad \frac{\sqrt{3y+12}}{7} = 3 & \text{(vi)} \quad \sqrt{x+9} = 7 \\ \text{(vii)} \quad \sqrt{25y-50} = \sqrt{y+3} & \text{(viii)} \quad \sqrt{x}-8 = 1 & \text{(ix)} \quad 10\sqrt{x+20} = 100 \end{array}$$

6.2 قطعي ملهه واريون مساواتون

6.2.1 قطعي ملهه جي وضاحت:

هڪ حقيقي عدد x جو قطعي ملهه $|x|$ لکيو آهي. جيڪو ٻڙيءَ کان عدد تائين جو مفاصلو آهي، اهو ٻڙيءَ جي کاٻي پاسي هجي يا ساڄي پاسي هجي، تنهنڪري قطعي ملهه ڪڏهن به کاتو نه ٿيندو آهي.

جيڪڏهن x ڪو حقيقي عدد آهي، ته پوءِ x جو قطعي ملهه يا مقدار $|x|$ ظاهر ڪيو آهي، انکي هيٺين ريت بيان ڪبو.

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{جڏهن } x > 0 \\ 0, & \text{جڏهن } x = 0 \\ -x, & \text{جڏهن } x < 0 \end{cases}$$

$$|-5| = 5, | +7 | = 7, \left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}, |0| = 0$$

نوٽ: - عدد جو قطعي ملهه هميشه غير کاتو ٿيندو آهي.

6.2.2 مساواتون حل ڪريو، هڪ بدلجندڙ ۾ قطعي ملهه شامل آهن.

هيٺيان مثال قطعي ملهه تي مشتمل مساواتن کي حل ڪرڻ کي سمجهڻ ۾ مدد ڪندا.

مثال 01 $|5x - 3| - 2 = 3$

حل:

مليل $|5x - 3| - 2 = 3$

$\Rightarrow |5x - 3| = 5$

قطعي مله جي وصف مطابق

يا $5x - 3 = 5$ يا $5x - 3 = -5$

$\Rightarrow 5x = 5 + 3$ يا $5x = -5 + 3$

$\Rightarrow 5x = 8$ يا $5x = -2$

$\Rightarrow x = \frac{8}{5}$ يا $x = -\frac{2}{5}$

تنهنڪري حل سيٽ آهي $\left\{\frac{8}{5}, -\frac{2}{5}\right\}$

مثال 02 $|5x - 3| + 7 = 3$ جو حل سيٽ لھو:

حل:

مليل $|5x - 3| + 7 = 3$

$\Rightarrow |5x - 3| = -5$

قطعي مله جي قائدي مطابق حقيقي عددن جو مقدار ڪڏهن به ڪاٽو نٿو ٿي سگهي.

تنهنڪري حل سيٽ $\{ \}$ خالي سيٽ آهي

مثال 03 حل ڪريو $|5x - 3| - 2 = 3$ جڏهن ته $x \in W$

حل:

مليل $|5x - 3| - 2 = 3$

$\Rightarrow |5x - 3| = 5$

مقدار جي قائدي مطابق

$5x - 3 = \pm 5$

تنهنڪري $5x - 3 = 5$ يا $5x - 3 = -5$


$\Rightarrow 5x = 5 + 3$ يا $5x = -5 + 3$

$\Rightarrow 5x = 8$ يا $5x = -2$

$\Rightarrow x = \frac{8}{5}$ يا $x = -\frac{2}{5}$

$-\frac{2}{5} \notin W$ ۽ $\frac{8}{5} \notin W$

اهڙيءَ طرح حل سيٽ $\{ \}$ خالي سيٽ آهي.



مثال 04 حل ڪريو $|2y-5|+2=7$

مليل $|2y-5|+2=7$

$$\Rightarrow |2y-5|=7-2$$

$$\Rightarrow |2y-5|=5$$

قائدي مطابق

تنهنڪري	$2y-5=5$	يا	$2y-5=-5$
$\Rightarrow$	$2y=5+5$	يا	$2y=-5+5$
$\Rightarrow$	$2y=10$	يا	$2y=0$
$\Rightarrow$	$y=\frac{10}{2}$	يا	$y=\frac{0}{2}$
$\Rightarrow$	$y=5$	يا	$y=0$

تنهنڪري حل سيٽ $\{5, 0\}$ آهي

مشق 6.2

هيٺين غير مساواتن جو حل سيٽ لھو:

1. $|2x+1|=6$
2. $|5x-12|=7$, where $x \in W$
3. $\left|\frac{2x}{7}\right|=12$
4. $\left|\frac{2x+1}{3}\right|=8$
5. $|5x-3|-8=4$, where $x \in N$
6. $\left|\frac{5x+1}{7}\right|-3=8$
7. $\left|\frac{2x+3}{4}\right|+2=7$
8. $\left|\frac{3x+6}{12}\right|+1=3$, where $x \in Z$
9. $\frac{3}{2}=|7x+8|$
10. $\left|\frac{2x-3}{5}\right|-12=5$

6.3 هڪ درجي مساواتون

هڪ اهڙو الجبري اظهار جنهن ۾ برابر نه هئڻ جي نشاني " $\neq$ " هجي انکي غير مساوات چئبو آهي.

6.3.1 غير مساواتن ۾ ($\geq$, $\leq$) ۽ ($>$, $<$) نشانيون استعمال ڪيون آهن.





هيٺ اڻ برابري واريون نشانيون ڏجن ٿيون

' $<$ ' ننڍو آهي

' $>$ ' وڏو آهي

' $\leq$ ' ننڍو آهي يا برابر آهي

' $\geq$ ' وڏو آهي يا برابر آهي



نوٽ: خالي گول "O" ظاهر ڪري ٿو ته عدد شامل نه آهي ۽ رنگيل گول "●" عدد شامل هئڻ کي ظاهر ڪري ٿو.

6.3.2 اڻ برابري جون خاصيتون سڃاڻو، (ٽه رخي، متعدي، جوڙايت، ضرب ايت). هيٺ ڪجهه غير مساواتن جا مثال آهن:

(i) (Trichotomy Property) ٽه رخي خاصيت

ٻن حقيقي عدد a ۽ b لاءِ هيٺين مان هڪ ۽ صرف هڪ بيان صحيح آهي.

$$a > b \text{ يا } a = b \text{ , } a < b$$

(ii) (Transitive Property) متعدي خاصيت

ٽن حقيقي عددن a ، b ۽ c لاءِ

$$a < b \text{ ۽ } b < c \Rightarrow a < c$$

$$a > b \text{ ۽ } b > c \Rightarrow a > c$$

(iii) (Additive Property) جوڑ ایت واري خاصیت

تن حقيقي عددن لاء:

جيڪڏهن $a > b$ ته پوءِ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a + c > b + c$ جيڪڏهن $a < b$ ته پوءِ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a + c < b + c$

(iv) (Multiplicative Property) ضرب ایت واري خاصیت

(a) جيڪڏهن $a > b$ ته پوءِ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, ac > bc$ ۽ $c > 0$ يا جيڪڏهن $a < b$ ته پوءِ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, ac < bc$ ۽ $c > 0$ (b) جيڪڏهن $a > b$ ته پوءِ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, ac < bc$ ۽ $c < 0$ يا جيڪڏهن $a < b$ ته پوءِ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, ac > bc$ ۽ $c < 0$

6.4 هڪ درجي غير مساواتون حل ڪرڻ

6.4.1 حقيقي عددي سرڻ سان هڪ درجي غير مساواتون حل ڪرڻ.

هيٺيان مثال اسانجي مدد ڪندا حل سمجهڻ ۽ عددي ليڪ تي ظاهر ڪرڻ ۾.

مثال 01 $3x + 1 < 7 \quad \forall x \in W$ کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو:

حل: گهربل

$$3x + 1 < 7 \quad \forall x \in W$$

$$3x - 1 < 7 - 1$$


$$3x < 6$$

$$x < \frac{6}{3}$$

$$x < 2$$

جيتوڻيڪ، حل سيٽ $\{x | x \in W \text{ and } x < 2\} = \{0, 1\}$ آهي.

حل کي عددي ليڪ تي هيٺين ريت ظاهر ڪبو آهي.



مثال 02 $x - 11 \leq 9 - 4x \quad \forall x \in \mathbb{Z}$ کي عددي ليک تي ظاهر ڪريو:

حل

مليل $x - 11 \leq 9 - 4x \quad \forall x \in \mathbb{Z}$

$$x - 11 \leq 9 - 4x$$


$$x + 4x \leq 9 + 11$$

$$5x \leq 20$$

$$x \leq \frac{20}{5}$$

$$x \leq 4$$

تنهنڪري، حل سيٽ $\{x | x \in \mathbb{Z} \text{ and } x \leq 4\} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ آهي.
حل کي عددي ليک تي هيٺين ريت ظاهر ڪبو آهي.



مثال 03 $2x + 5 > 7 \quad x \in \mathbb{Z}$ جو حل سيٽ لھو، عددي ليک تي پڻ ظاهر ڪريو:

حل

مليل $2x + 5 > 7 \quad x \in \mathbb{Z}$

هيءَ غير مساوات هيٺين ريت ظاهر ڪبي آهي.

$$2x > 7 - 5$$

$$2x > 2 \quad \text{يا}$$

$$x > 1 \quad \text{يا}$$

تنهنڪري حل سيٽ $\{x | x \in \mathbb{Z} \wedge x > 1\}$ آهي.
عددي ليک تي هيٺين ريت ظاهر ڪبو آهي.



مثال 04 $-6 < 2x + 1 < 11, \quad \forall x \in \mathbb{Z}$ جو حل سيٽ لھو، عددي ليک تي پڻ ظاهر ڪريو:

حل

مليل $-6 < 2x + 1 < 11, \quad \forall x \in \mathbb{Z}$

هيءَ غير مساوات هيٺين ريت ظاهر ڪبي آهي.


$$-6 < (2x + 1) \quad \text{۽} \quad 2x + 1 < 11$$

$$-6 - 1 < 2x \quad \text{۽} \quad 2x + 1 < 11 - 1 \quad \text{يا}$$

$$-7 < 2x \quad \text{۽} \quad 2x < 10 \quad \text{يا}$$

$$x < 5 \quad \text{يا} \quad -\frac{7}{2} < x$$

تنهنڪري حل سيٽ $\{x | x \in \mathbb{Z} \wedge -\frac{7}{2} < x < 5\} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ آهي.
عددي ليڪ تي هيٺين ريت ظاهر ڪبو آهي.



مثال 05 عائشه چئن مان ٽن ٽيسٽن ۾ 78، 72 ۽ 86 اسڪور ڪيو، چوٿين ٽيسٽ ۾ ڪيترو اسڪور ڪرڻ گهرجي جو سراسري 80 اسڪور ٿئي.
فرض ڪريو ته چوٿين ٽيسٽ جو اسڪور x آهي.

$$\frac{78 + 72 + 86 + x}{4} \geq 80$$

$$78 + 72 + 86 + x \geq 320$$

$$236 + x \geq 320$$

$$x \geq 320 - 236$$

$$x \geq 84$$

عائشه کي 80 جي سراسري برقرار رکڻ لاءِ چوٿين ٽيسٽ ۾ 84 اسڪور ڪرڻ گهرجي.

مشق 6.3

هيٺين غير مساواتن جو حل سيٽ لهو ۽ عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو.

(i) $2x - 7 > 6 + x, \forall x \in \mathbb{N}$

(ii) $7x - 6 > 3x + 10, \forall x \in \mathbb{R}$

(iii) $\frac{y + 5}{20} < \frac{25 - 4y}{10}, \forall y \in \mathbb{N}$

(iv) $|2x + 3| < x + 2, \forall y \in \mathbb{N}$

(v) $|2y + 8| < 11, \forall y \in \mathbb{R}$

(vi) $5(2y - 3) > 6(y - 8), \forall y \in \mathbb{R}$

عليءَ پنهنجي ٻن ٽيسٽن ۾ ترتيبوار 66 ۽ 72 مارڪون اسڪور ڪيون، هن کي ٽئين ٽيسٽ لاءِ ڪيترون مارڪون اسڪور ڪرڻ گهرجن. جيڪڏهن هڪ اضافي انعام جي قابل ٿيڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ سراسري 75 مارڪون گهربل هجن.

7 ننڍو آهي هڪ عدد جي ٽي دفعا جوڙايت جي ۽ 5 گهٽ ۾ گهٽ آهي 11 کان، ان صورت کي مطمئن ڪندڙ سڀ عدد لهو.

مشق ورڃايو 6

1.

صحيح ۽ غلط سوال

هيٺين جملن کي غور سان پڙهو ۽ صحيح بيان جي صورت ۾ "T" تي گول ٻايو ۽ غلط جي صورت ۾ "F" تي.

T/F (i) $ay + b = 0$ جتي $a = 0$ هڪ درجي مساوات آهي.

T/F (ii) $3y - 2 < 7 \wedge y \in \mathbb{N}$ جو حل سيٽ $\{4, 5, 6, \dots\}$ آهي.

T/F (iii) $\sqrt{y} + 1 = 3$ جو حل سيٽ $\{4\}$ آهي.

T/F (iv) $|4y| = 8$ جو حل سيٽ $\{2, -2\}$ آهي.

T/F (v) $-2 \leq x \leq 2, x \in \mathbb{R}$ جو حل سيٽ $\{-2, 0, 2\}$ آهي.

2.

خال ڀريو:

(i) $2y = -y$ جو حل سيٽ _____ آهي.

(ii) $\sqrt{y+5} = 5$ جو حل سيٽ _____ آهي.

(iii) $|x| - 4 = 0$ جو حل سيٽ _____ آهي.

(iv) $\sqrt{x+5} + 2 = 4$ جو حل سيٽ _____ آهي.

(v) $0 < y + 2 < 5$ جو حل سيٽ _____ آهي جڏهن $y \in$ _____.

3.

صحيح جوابن تي ٽڪ (✓) جو نشان لڳايو.

(i) هڪ متغير (بدلجندڙ) (Variable) ۾ هڪ درجي مساوات جو حل سيٽ آهي.

(a) هڪ عنصر (b) ٻه عنصر

(c) ٽي عنصر (d) هڪ کان وڌيڪ عنصر

(ii) $|-20|$


(a) $= 20$ (b) < 20

(c) $= -20$ (d) > 20

(iii) $x \leq 4$ جو مطلب آهي

(a) $x < 4$ (b) $x = 4$

(c) $x < 4$ or $x = 4$ (d) $x > 4$ or $x = 4$



(iv) $\sqrt{y} = 10$ جو حل سيٽ آهي:

- (a) {100} (b) {10}
(c) {-10} (d) {-10, 10}

(v) $\sqrt{y+4} + 2 = 8$ آهي هڪ:

- (a) هڪ درجي مساوات (b) مولتي مساوات
(c) كعبي مساوات (d) ٻه درجي مساوات

(vi) $5-3y = -7$ جو حل سيٽ آهي:

- (a) {-4} (b) {1, 4}
(c) {4} (d) {12}

(vii) $\sqrt{5y+5} + 5 = 10$ جو حل سيٽ آهي:

- (a) {±4} (b) {5}
(c) {4} (d) {-4}

(viii) $\left| \frac{5y}{3} \right| = 5$ جو حل سيٽ آهي:


- (a) {3} (b) {-5, 5}
(c) {3, -3} (d) {-3}

(ix) $|-y| = 0$ جو حل سيٽ آهي:

- (a) {1} (b) {-1}
(c) {0} (d) {}

(x) جيڪڏهن $x > 0$, $y > 0$ ۽ $x - y < 0$ ته پوءِ

- (a) $x < y$ (b) $x + y < 0$
(c) $x > y$ (d) $y - x < 0$



خلاصو



◆ $ax + b = 0$ جهڙي هڪ مساوات جتي $a, b \in \mathbb{R}$ ۽ $a \neq 0$ هجي انکي هڪ درجي مساوات چئبو آهي.

◆ هڪ مساوات جنهن ۾ مول جي نشاني هجي انکي مولي مساوات غير ناطق (Irrational equation) چئبو آهي، مولي مساوات جي باهرين بنيادن جي صورت ۾ حل جي چڪاس ضروري آهي.

◆ جيڪڏهن $x \in \mathbb{R}$ ته پوءِ $|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x & < 0 \end{cases}$

◆ جيڪڏهن $x, y \in \mathbb{R}$ پوءِ

(i) $|x| \geq 0$ (ii) $|-x| = |x|$ (iii) $|xy| = |x| \cdot |y|$
 (iv) $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ (v) $|x| = b$ then $x = b$ or $x = -b$

◆ غير مساوات لاءِ اسين $<, >, \leq, \geq$ استعمال ڪندا آهيون:

◆ هڪ درجي آڻجبري اظهار جنهن ۾ غير برابريءَ جي نشاني هجي

انکي هڪ درجي غير برابري يا غير مساوات چئبو آهي.

◆ غير مساوات جون خاصيتون:

(i) $a < b$ يا $a = b$ يا $a > b$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ ته رخي مساوات (Trichotomy)

(ii) $a > b$ ۽ $b > c \Rightarrow a > c$ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ معتدي مساوات (Transitive)

(iii) $a > b$ ۽ $c > 0 \Rightarrow ac > bc$ ۽ $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ ضرب ۽ ونڊ جي خاصيت.

(Multiplication and Division Properties)



سڌي ليڪ ۾ گراف ۽ ان جا استعمال

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

- ◆ هن يونٽ کي مڪمل ڪرڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته،
 - ◆ حقيقي عددين جي جوڙي کي ترتيبوار جوڙي جي صورت ۾ سڃاڻي سگهن.
 - ◆ مختلف مثالن سان هڪ ترتيبوار (جوڙي جي سڃاڻپ ڪري سگهن جهڙي طرح (2, 3) کي امتحاني هال ۾ ظاهر ڪيل جاءِ جي صورت ۽ انهن جي ٻي قطار ۽ ٽي ڪالم جي صورت ۾ ڪاٽ ڪن.
 - ◆ ڪارٽيسي مٿاڇري / عام مٿاڇري تي گوني ڪندڙ ٽڪنڊي تي ڪپيندڙ ٻن ليڪن کي O نقطي وٽ اڏوڙ ڪرڻ کي ڳان ڪري سگهن.
 - ◆ مستطيلي مٿاڇري تي $-x$ محور ۽ $-y$ محور کي ترتيبوار ٽڪو "O" کي اصل ٽڪي طور ۽ محدود محور ڪري سڃاڻپ ڪن.
 - ◆ مستطيلي مٿاڇري تي، ترتيب ڏنل جوڙي کي جاميٽري جي ٽڪن طور ظاهر ڪري سڃاڻپ ڪن ته
 - ◆ a کي $-x$ محدود (يا abscissa) $-x$ محدود
 - ◆ b کي $-y$ محدود (يا ordinate) $-y$ محدود
 - ◆ ٽڪن جي ڏنل سينن کي ملائي مختلف جاميٽري جون شڪلون ٺاهي سگهن (ليڪ ٽڪر، ٽڪنڊو مستطيل وغيره).
 - ◆ ٻن بدلجندڙن جي هڪ درجي مساوات جي مليل جوڙي ۾ رڻن جي جدول ٺاهي سگهن.
 - ◆ ڏنل اظهار جو گراف حاصل ڪرڻ لاءِ ٽڪن جا جوڙا ظاهر ڪري سگهن.
 - ◆ گراف ٺاهڻ لاءِ مناسب پئمانو چونڊي سگهن.
 - ◆ گراف ٺاهي سگهن.
 - ◆ $y = c$ نموني جي مساوات جو
 - ◆ $x = a$ نموني جي مساوات جو
 - ◆ $y = mx + c$ نموني جي مساوات جو
 - ◆ $y = mx$ نموني جي مساوات جو
 - ◆ x ۽ y جي رڻن لاءِ مليل جدول مان گراف ٺاهي سگهن.
 - ◆ روزمره زندگي سان تعلق رکندڙ حساب حل ڪري سگهن.
 - ◆ سڌي تناسب ۾ مليل ٻن مقدارن جي تبديل ٿيندڙ گراف کي سڌي ليڪ جي گراف ۾ ٻڌائي سگهن.
 - ◆ هڪ مقدار جي ٻي مقدار سان مشابھت رکندڙ گراف کي پڙهي ۽ سڃاڻي سگهن.
 - ◆ تبديل ڪرڻ جي نمونن جا گراف پڙهي سگهن.
 - ◆ ميل ۽ ڪلوميٽر
 - ◆ ايڪٽر ۽ هيڪٽر
 - ◆ سينٽي گريڊ ۽ فارنھائيٽ
 - ◆ پاڪستاني ۽ ٻين ملڪن جو چالو سڪو وغيره.
 - ◆ همزاد هڪ درجي مساوات ٻن بدلجندڙن سان، گراف جي طريقي سان حل ڪري سگهن.

7.1 کارٽيسي مٿاڇرو ۽ سڌي ليڪ جا گراف

7.1.1 حقيقي عدد جي جوڙي جي ترتيب ڏنل جوڙي جي صورت ۾ سڃاڻپ ڪريو.

ترتيب ڏنل جوڙو ٻن حقيقي عددن جي جوڙو آهي، جنهن کي خاص ترتيب سان ننڍين ڏنگين ۾ لکيو ويندو آهي. هي ٻه رخي جڳهه ۾ شين جي جڳهه کي ظاهر ڪرڻ ۾ مدد ڪندو آهي.

7.1.2 مختلف مثالن سان ترتيب ڏنل جوڙي جي سڃاڻپ ڪريو، جيئن (2, 3) ترتيب ڏنل جوڙو، امتحان هال ۾ سيٽ کي ڏيکارڻ لاءِ ظاهر ڪري ٿو ته ٻي قطار ۽ ٽيون ڪالم آهي.



اڇو ته پنهنجي چوڌاري موجود شين جا مثال ڏسون، هنن مثالن سان اسان، شين کي قطار ۽ ڪالم ۾ موجود جڳهه کي ظاهر ڪريون ٿا جيڪي ترتيب ڏنل جوڙو ناهين ٿيون. ترتيب ڏنل جوڙو ڪنهن شيء يا جڳهه جي حالت جي نشاندهي ڪري ٿو.

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1	 (1,1)	 (1,2)	 (1,3)
Row 2	 (2,1)	 (2,2)	 (2,3)
Row 3	 (3,1)	 (3,2)	 (3,3)

مثال 01

ترتيب ڏنل جوڙو (2, 3) شاگرد جي امتحان هال ۾ موجود جڳهه کي ظاهر ڪري ٿو. جيئن ٻي قطار ۽ ٽيون ڪالم ساڳي طرح هر شاگرد منفرد ترتيب سان ظاهر ٿيل آهي.

مثال 02


	C1	C2	C3	C4	C5	C6
R1						
R2						
R3						

جيڪڏهن هڪ هاري باغ ۾ هڪ جيتري مفاصلي تي وڻ پوکڻ جي منصوبه بندي ڪري ٿو، ته پوءِ (2, 6) ظاهر ڪري ٿو ته ٻي قطار ۽ ڇهون ڪالم جو وڻ باغ ۾.

7.1.3 کارتیسی/ یام مٿاڇري تي ٻہ عددی لیكون کنهن گوني کنب کي O


ٽپکي تي کپين ٿيون بیان کریو.

کارتیسی محددی نظام مشتمل حصي ٻن حقیقی عددن جي لیکن تي جیڪي گوني کنب تي "O" ٽپکي وٽ پاڻ کي کپين ٿيون. ان تي مشتمل هوندو آهي هي ٻہ عددی لیكون هڪ سڌي سطح جي تعریف کن ٿيون جن کي کارتیسی مٿاڇرو چئبو آهي.




7.1.4 مستطیلی مٿاڇري ۽ اصل ٽپڪو "O" ۽ محددی محور (فقی ۽ عمودی

محور x - محور ۽ y - محور) جي سڃاڻپ کریو.



کارتیسی محددی نظام ۾، افقی عددی لیک کي x - محور ۽ عمودی عددی لیک کي y - محور چئبو آهي. اهو نقطو جتي ٻئي لیكون هڪٻئي کي کپين ته ان کي اصل ٽپڪو چئبو آهي، جنهن کي O سان ظاهر کیو ويندو آهي.


ملیل شکل ۾ افقی لیک XX' ، x - محور آهي ۽ عمودی لیک YY' ، y - محور آهي، نقطو جتي ٻئي لیكون پاڻ ۾ ملن ٿيون ان کي مٿاڇري جو اصل چئبو آهي جیڪو "O" آهي.



7.1.5 مستطيلي مٽاچري تي ترتيب ڏنل جوڙي کي جاميٽري جي ٽپڪن طور ظاهر ڪري، سڃاڻپ ڪريو.

- a کي $-x$ محدد (يا abscissa) $-x$ محدد
- b کي $-y$ محدد (يا ordinate) $-y$ محدد


عام طور تي ڪوبه ٽپڪو ڪارٽيسي مٽاچري تي ترتيب ڏنل جوڙي (a, b) جي صورت ۾ ظاهر ڪري سگهيو آهي، جنهن ۾ a $-x$ محدد (abscissa) ۽ b $-y$ محدد (ordinate) آهي.



مٽاچري تي ٽپڪن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ اسان کي $-x$ محدد، جيڪو افقي مفاصلو آهي $-y$ محور کان ۽ $-y$ محدد جيڪو عمودي مفاصلو آهي $-x$ محور کان ضروري معلوم هجي.

$-x$ محور ۽ $-y$ محور ڪارٽيسي مٽاچري کي چئن حصن (چوٿن) ۾ ورهائين ٿا جن جا رومن عددي عدد I، II، III ۽ IV آهن. ڪارٽيسي مٽاچري کي xy مٽاچر پڻ چئبو آهي.

- پهرين چوٿي I ۾ ٻئي $-x$ محدد ۽ $-y$ محدد وادو آهن $x > 0$ ۽ $y > 0$.
 - ٻئي چوٿي II ۾ x محدد ڪاٽو ۽ $-y$ محدد وادو آهي $x < 0$ ۽ $y > 0$.
 - ٽئين چوٿي III ۾ x محدد ۽ $-y$ محدد ڪاٽو آهن $x < 0$ ۽ $y < 0$.
 - چوٿين چوٿي IV ۾ x محدد وادو ۽ $-y$ محدد ڪاٽو آهي $x > 0$ ۽ $y < 0$.
 - اصل ٽپڪي تي $x = y = 0$ تنهنڪري اصل نقطي جا محدد $(0, 0)$ آهن.
- گراف ڪيڏ جو طريقي جڏهن هڪ ٽپڪو ڪارٽيسي مٽاچري (xy مٽاچري) تي اچو ته هيٺين مثالن ذريعي سڪون ته ڪيئن هڪ ٽپڪو ڪارٽيسي



مٽاچري تي ظاهر ڪجي.

$(2, 3)$ کي ظاهر ڪرڻ جي لاءِ، اصل ٽپڪي کان شروع ڪريو ۽ 2 ايڪا ساڄي طرف $-y$ محور کان ۽ پوءِ 3 ايڪا مٿي $-x$ محور کان حرڪت ڪريو جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. اسان P ٽپڪي تي پهچي وياسين جيڪو $(2, 3)$ کي ظاهر ڪري ٿو.



مثال 01

هيٺين ٽيڪن جا x محددِي ۽ $-y$ محددِي ظاهر ڪريو. اهو پڻ ٻڌايو ته ڪهڙي چوٽي ۾ اهي موجود آهن، ٽيڪا پڻ ظاهر ڪريو.

- A (1, 2) (i) B (-2, 3) (ii)
C (3, 0) (iii) D (0, -3) (iv)

پڻمانو: 5 ننڍا چورس = 1 ايڪو

- A (1, 2) (i)

هتي $-x$ محددِي 1 ايڪو ۽ محددِي 2 ايڪا آهن.
جيئن ته $x > 0$ ۽ $y > 0$ مليل ٽيڪا پهرين چوٽي ۾ آهن.

- B (-2, 3) (ii)

هتي $-x$ محددِي -2 ايڪا ۽ $-y$ محددِي 3 ايڪا آهن.

جيئن ته $x > 0$ ۽ $y > 0$ تنهنڪري مليل ٽيڪا ٻئي چوٽي ۾ آهن.


- C (3, 0) (iii)

هتي $-x$ محددِي -3 ايڪا ۽ $-y$ محددِي 0 ايڪا آهي. تنهنڪري C ٽيڪو $-x$ محور تي آهي جيڪو اصل کان ساڄي طرف آهي.

- D (0, -3) (iv)

هتي $-x$ محددِي 0 ايڪا، $-y$ محددِي 3 ايڪا آهن. تنهنڪري D ٽيڪو $-y$ محور تي آهي جيڪو اصل کان هيٺ آهي.

7.1.6 مختلف جاميٽري جون شڪليون (ليڪ ٽڪر ٽڪنڊو ۽ مستطيل وغيره)




هيٺين ڪلاس ۾ اسان ڪيترن ئي جاميٽري جي شڪلين جي باري ۾ پڙهي آيا آهيون ۽ پڻ ڏنل معلومات مطابق ڪيئن ٿا ٺاهجي. هاڻ اسان مختلف جاميٽري جون شڪليون گراف پيپر تي مليل ٽيڪن مطابق ٺاهينداسين.

مثال 01


ليڪ ٽڪر AB ٺاهيو جنهن جا آخري ٽيڪا A (1, 1) ۽ B (6, 5) آهن.

طريقو: پڻمانو: 5 ننڍا چورس = 1 ايڪو.

پهرئين اسان گراف پيپر تي ليڪ جي ٽيڪن جي نشاندهي ڪنداسين، پوءِ انهن کي ليڪ ٽڪر AB حاصل ڪرڻ لاءِ ملائينداسين، جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.




مثال 02 ٽڪنڊو ABC ٺاهيو جنهن جا ڪنڊ وارا ٽپڪا $A(-2, 1)$, $B(1, 5)$ ۽ $C(4, 2)$ آهن.



طريقو:

پٿمانو: 5 ننڍا چورس $1 =$ ايڪو.
پهرئين اسان A , B ۽ C جي ٽپڪن جي نشاندهي ڪنداسين، پوءِ انهن کي ملائي $\triangle ABC$ حاصل ڪنداسين، جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

مثال 03 هڪ مستطيل ٺاهيو جنهن جا ڪنڊ وارا ٽپڪا $A(-5, 1)$, $B(-5, 4)$, $C(5, 4)$ ۽ $D(5, 1)$ آهن.



طريقو:

پٿمانو: 5 ننڍا چورس $1 =$ ايڪو.
 $A(-5, 1)$, $B(-5, 4)$, $C(5, 4)$ ۽ $D(5, 1)$ ٽپڪن جي گراف ٺهي تي نشاندهي ڪريو. هاڻ ٽپڪن A , B , C ۽ D کي پاڻ ۾ ملايو، نتيجو $ABCD$ مستطيل آهي.


7.1.7 ٻن بدلجندڙن ۾ هڪ درجي مساوات کي حل ڪرڻ لاءِ رڻمن جي جوڙن جي جدول کي ٺاهڻ.

هن جي هيٺين مثالن جي مدد سان وضاحت ڪري سگهجي ٿي.
فرض ڪريو ته $x + y = 5$, x ۽ y ٻن بدلجندڙن جي هڪ درجي مساوات هجي x ۽ y جي ڪجهه رڻمن لاءِ جدول ٺاهيو.
ملايل آهي ته $x + y = 5$ جنهن $y = 5x$ لکي سگهجي ٿو.
هاڻ جدول تيار ڪيو، x جون رڻمون وجهو ۽ y جي قيمتون حاصل ڪريو.

مثال 01

حل:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	8	7	6	5	4	3	2	...



مشق 7.1

1. هيٺين ٽپڪن مان x -محددي ۽ y -محددي جي وضاحت ڪريو.

- i. $A(-2, 2)$ ii. $B(5, -1)$ iii. $C(4, 0)$
iv. $D(-5, -6)$ v. $E(3, 4)$ vi. $F(-\sqrt{8}, \sqrt{8})$

2. هيٺيان ٽپڪا ڪهڙي چوٽائي ۾ موجود آهي واضح ڪريو.

- i. $A(2, -1)$ ii. $B(-3, 3)$ iii. $C(2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$
iv. $D(-2, -4)$ v. $E(5, 4)$ vi. $F(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$

3. x ۽ y متاچري ۾ هيٺين ٽپڪن A , B , C ۽ D کي ٺاهيو.

- i. $A(2, 1)$, $B(3, 2)$, $C(-3, 4)$, $D(-4, -5)$
ii. $A(2, 0)$, $B(0, 2)$, $C(3, -3)$, $D(-3, 3)$
iii. $A(0, 0)$, $B(-3, -3)$, $C(5, -6)$, $D(-6, 5)$

4. ٽپڪن $A(4, 6)$ ۽ $B(-6, 8)$ کي ملائي، ليڪ ٽڪر $\overline{AB}$ ٺاهيو.

5. ٽپڪن $A(-1, 4)$ ۽ $B(-3, 6)$ کي $(3, -2)$ کي ملائي ٽڪنڊو ABC ٺاهيو.

6. ٽپڪن $A(0, 1)$, $B(4, -3)$, $C(8, 5)$ ۽ $D(4, 7)$ کي ملائي $ABCD$ مستطيل ٺاهيو.

7. ٽپڪن $O(0, 0)$, $A(5, 0)$, $B(5, 5)$ ۽ $C(-2, -3)$ کي ملائي $OABC$ چورس ٺاهيو.

8. ٽپڪن $O(0, 0)$, $A(3, -4)$, $B(1, -7)$ ۽ $C(-2, -3)$ کي ملائي $OABC$ هڪ

پوروچوٽ چوڪنڊو ٺاهيو.

9. هيٺين هڪ درجي مساوات جي لاءِ x ۽ y جي ڪجهه رڻن جي جدول ٺاهيو.

- i. $x + y - 2 = 0$ ii. $2x - y - 2 = 4$
iii. $\frac{1}{2}(x + 2y) - 6 = 0$ iv. $\frac{2}{3}(x - 2y) = -2$

7.1.8 مليل اظهار جو گراف حاصل ڪرڻ لاءِ رڻن جا جوڙ ظاهر ڪريو.

فرض ڪريو ته هڪ درجي مساوات $y = 2x$ ٻن بدلجندڙن تي مشتمل آهي جتي x

کي آزاد (Independent) ۽ y کي منحصر (Dependent) بدلجندڙ چئبو آهي.

ڇاڪاڻ ته y جي رڻ جو دارومدار x جي رڻ تي آهي.

مسلسل مساوات جو گراف ٺاهڻ جي لاءِ اسان x ۽ y جي جدول ٺاهينداسين ۽ هي


ترتيب ڏنل جوڙ انهي جي محددي متاچري تي رکنداسين، ٻه ٽپڪا ليڪ کي

واضح ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي، تنهن هوندي به ممڪن غلطي کان بچڻ خاطر ٻن

کان وڌيڪ ٽپڪا پڻ ظاهر ڪري سگهجن ٿا.

x	0	1	2	3	4	...
y	0	2	4	6	8	...

لاڳيتو ترتيب ڏنل جوڙن x, y کي گراف ۾ جوڙ ڪندي اهو واضح آهي ته y جي رقم x جي رقم کان ٻيڻي آهي ۽ ان کان پوءِ هڪ ئي ليڪ تي موجود تنهن کي ڏيکارڻ لاءِ اسان هڪ ليڪ ٺاهينداسين گراف تير جا نشان اهو ظاهر ڪن ٿا، گراف تي ٻنهي پاسي نه ڪٽندڙ ليڪ آهي. هيٺيون گراف ائين ڏسڻ ۾ اچي ٿو شڪل ۾ ڏسو.



7.1.9 گراف ٺاهڻ جي لاءِ مناسب پئماني جي چونڊ ڪريو.

پئماني جي اهڙي طرح چونڊ ڪجي جو مواد آساني ظاهر ڪري ۽ پڙهي سگهجي.

هڪ مساوات جو گراف ٺاهڻ جي لاءِ اسان هڪ پئماني چونڊينداسين. مثال طور هڪ ننڍو چورس هڪ يونٽ کي ظاهر ڪندو يا 2 ننڍا چورس 1 يونٽ کي ظاهر ڪندا وغيره، ان جي چونڊ پني جي پڪيڙ ڏسي ڪبي. ڪنهن وقت ٻنهي x ۽ y محددن جي لاءِ اسان ساڳي پئماني جي چونڊ ڪنداسين اسان مختلف پئماني، x ۽ y محددن جي رقمن کي ڏسي چونڊ ڪنداسين.

7.1.10 گراف ٺاهيو.


- $y = c$ جي نموني جي مساوات جو.
 - $x = a$ واري نمونگ جي مساوات جو.
 - $y = mx$ واري نمونگ جي مساوات جو.
 - $y = mx + c$ واري نمونگي جي مساوات جو.
- (i) 7.1.10 $y = c$ نموني واري مساوات جو گراف ٺاهڻ.

مثال 01

گراف ٺاهيو جڏهن $y = 4$

پٿمانو: 5 ننڍا چورس = 1 ايڪو

گراف ٺاهڻ جي لاءِ جدول ٺاهيو.



x	-3	-2	-1	0	1	2	3	..
y	4	4	4	4	4	4	4	...

 $y = 4$ مساوات جو گراف شڪل ۾

ڏيکاريل آهي

نوٽ:

 $y = c$ جو گراف $-x$ محور جي پوروچوٽ آهي.

(ii) 7.1.10


 $x = a$ نموني واري مساوات جو گراف ٺاهڻ.

مثال 01

 $x = 3$ مساوات جو گراف ٺاهيو.

پٿمانو: 5 ننڍا چورس = 1 ايڪو.

طريقو:




x	-3	-3	-3	-3	-3	...
y	-2	-1	0	1	2	...

مساوات جو گراف شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

نوٽ:

 $x = a$ جو گراف $-y$ محور جي پوروچوٽ آهي.



7.1.10 (iii) $y = mx$ نموني واري مساوات جو گراف ٺاهڻ.


$y = mx$ مساوات ۾ y جي رقم (يا $-y$ محدود) m ۽ ضرب پت آهي جڏهن ته m هڪ مستقل حقيقي عدد آهي.

مثال 01 جيڪڏهن $y = 2x$ ته m جو ملهه لھو ۽ گراف ٺاهيو.

حل:

پڻمانو: 5 ننڍا چورس $= 1$ ايڪو.
گراف جي لاءِ جدول ٺاهيو.

x	-2	-1	0	1	2	...
y	-4	-2	0	2	4	...



نوٽ:

$y = mx$ جو گراف هميشه اصل ٽپڪي مان گذرندو.

7.1.10 (iv) $y = mx + c$ نموني واري مساوات جو گراف ٺاهڻ.


$y = mx + c$ مساوات ۾ m ۽ c حقيقي عدد آهن ۽ $m =$ گهيري لاهي، $y =$ ليڪ کي جدا ڪندڙ.

مثال 01 $y = -2x + 3$ جو گراف ٺاهيو.

پڻمانو: 3 ننڍا چورس $= 1$ ايڪو.

گراف ڪيڏ ڪاءِ جدول ٺاهيو.

x	-2	-1	0	1	2	3	...
y	7	5	3	1	-1	-3	...




نوٽ:

$y = mx + c$ جو گراف هميشه $-y$ محور کي $y = c$ تي ڪپيندو.

7.1.11 جدا جدا رڦمن جي ڏنل جدول گراف ٺاهڻ.

جدا جدا مليل رڦمن جي جدول جو گراف ٺاهڻ جي لاءِ x ۽ y کي ٽپڪن جي صورت ۾ ملائبو آهي جيڪي گراف پني تي ظاهر ڪيون آهن.




مثال 01

هيٺ ڏنل جدول ۾ مليل ٽپڪن جو گراف ٺاهيو.

x	1	2	3	4	...
y	-1	2	5	8	...

مليل جدول ۾ $A(1, 1)$, $B(2, 2)$, $C(3, 5)$ ۽ $D(4, 8)$ آهي ته اسان گراف پني تي گراف ٺاهينداسين.
پئمانو: 5 ننڍي چورس $= 1$ ايڪو.

طريقو:




7.1.12 روزمرو زندگي سان تعلق رکهندڙ حسابن کي حل ڪريو.

هڪ درجي مساوات کي روزمرو زندگي جي حسابن سان نموني طور عددن کي استعمال ڪري سگهجي ٿو، جهڙوڪ وقت جي عرصي ۾ توهان ڪيترا پئسا ٺاهي سگهو ٿا يا سائيڪل هلائڻ وارو گهر سرح تي پيدلنگ ڪرڻ سان ڪيتري مفاصلي تائين سفر ڪري سگهي ٿو. محددي مٿاڇري تي اهڙن تعلقن جو گراف ٺاهڻ جي لاءِ اسان اڪثر ڪري حساب ۽ انهن جي حل بابت سوچيندا آهيون.

مثال 01

ڪنهن ماڻهو جو وزن y ڪلوگرامن ۾، عمر x سالن ۾ مساوات $y = 2x + 3$ جي صورت ۾ بيان ڪيل آهي. عمر ۽ وزن جو مساوات مطابق گراف ٺاهيو.



عمر (x)	1	2	3	4	5	...
وزن (y)	5	7	9	11	13	...

مشق 7.2

1. هيٺ ڏنل مساوات جي جدول ٺاهيو، جيڪا رڻمن جي جوڙي $x + y = 6$ کي مطمئن ڪري.

2. هيٺ مليل جدول مان مناسب پڻمانو وٺي گراف ٺاهيو.

x	0	-1	4	-4
y	2	4	5	-5

3. هيٺين جو گراف ٺاهيو.

i. $y = 3$

ii. $x = 3$

iii. $y = 0$

iv. $y = 2x + y$

v. $x = 3.5$

vi. $-y = 2x$

4. هيٺ ڏنل جدول مان غائب ٿيل محدود معلوم ڪريو

نمبر شمار	مساوات	$-x$ محدود	$-y$ محدود
(i)	$y = \frac{1}{2}x$	4	0
(ii)	$x = \frac{2}{3}y$	1	$\frac{3}{2}$
(iii)	$2x + 4y = 8$	0	$\frac{1}{4}$
(iv)	$2x + y = 6$	1	0
(v)	$x - y = 2$	1	0
(vi)	$x - 3y = 6$	3	-1

5. هڪ ماڻهو جو وزن y ڪلوگرامن، عمر x سالن ۾ مساوات $y = 2x$ جي صورت ۾ ظاهر ڪئي وئي آهي ته هيٺين جدول مان عمر - وزن جو گراف ٺاهيو.

6. عائشہ بن ڦيٽن واري گاڏي لاڳيتو 20 ڪلوميٽر في ڪلاڪ سان هلائي سگهي ٿي. هن صورت جو مفاصلي ۽ وقت جو گراف ٺاهيو.
- (a) 100 ڪلوميٽر سواري ڪرڻ لاءِ عائشہ کي گهربل وقت.
- (b) ٽوٽل 3 ڪلاڪن ۾ عائشہ جو طءُ ڪيل مفاصلو.


7.2 تبديل ڪرڻ جا گراف:

7.2.1 سڌي تناسب ۾ مليل ٻن مقدارن سان تبديل ٿيندڙ گراف، هڪ سڌي ليڪ جي گراف، هڪ سڌي ليڪ جي گراف طور سمجهائڻ.

هن سڌي تناسب سان تعلق رکندڙ ٻن مقدارن جي تبديل ٿيڻ سان تبديل ٿيندڙ گراف کي سڌي ليڪ ۾ گراف طور فرض ڪنداسين. اسان ترتيب ڏنل جوڙن کي پيش ڪنداسين جيڪي $y = x - 5$ مساوات جي صورت ۾ گراف تي موجود آهن انهن جي رقم کي اسان هيٺ ڏنل جدول مطابق معلوم ڪنداسين.


x	0	1	2	3	4	5
y	-5	-4	-3	-2	-1	0
(x, y)	(0, -5)	(1, -4)	(2, -3)	(3, -2)	(4, -1)	(5, 0)

مليل هڪ درجي مساوات مطابق گراف جي ٽيڪن کي ظاهر ڪريو، جنهن ۾ هر x -محدد ۾ ايڪي جي تبديلي جو y -محدد جي رقم جي تبديلي سان تناسب آهي.



7.2.2 هڪ مقدار جو تعلق ٻي مقدار سان آهي مليل گراف کي پڙهي ڄاڻ حاصل ڪرڻ.


سمجهو ته $y = x - 5$ هڪ درجي مساوات جي مدد سان اسان x جون رقمون ۽ y جون رقمون تناسب سان پڙهي سگهون ٿا.



y جي ڏنل رقم مان اسان x سان تعلق رکندڙ رقم پڙهي سگهون ٿا.
 $y = x - 5$ کي $x = y - 5$ جي مساوات ۾ ۽ تعلق رکندڙ گراف پڻ ناهي سگهون ٿا.
 تبديل ٿيل گراف ۾ اسان x کي y جي جز ۾ ظاهر ڪري سگهون ٿا. جيئن هيٺ
 ڏنل آهي $y = x - 5$

y	-5	-4	-3	-2	-1	0
x	0	1	2	3	4	5
(y, x)	(-5, 0)	(-4, 1)	(-3, 2)	(-2, 3)	(-1, 4)	(0, 5)

x جو تبديل ٿيل گراف y جي نسبت سان گراف پني تي ٺهيل آهي.




7.2.3 تبديل ڪرڻ جي نموني جا گراف پڙهو

- ميل ۽ ڪلوميٽر
- ايڪٽر ۽ هيڪٽر
- سينٽي گريڊ ۽ فارنهيٽ
- پاڪستاني سڪو ۽ ٻين ملڪن جا سڪا وغيره.

جيڪڏهن مقدارن ۾ وڌڻ يا گهٽ ٿيڻ جو تعلق آهي ته، ان تعلق جو گراف سٺي ليڪ ۾ ٿيندو، جيڪو ٻنهي مقدارن جي حد کي ڏيکاريندو گڏيل محدد محور تي.

(i) ميل ۽ ڪلوميٽر جي تبديلي جو گراف پڙهن.

اچو ته ميل ۽ ڪلوميٽر جي گراف جو نموني بابت بحث ڪريون، ٻئي ايڪا مفاصلي جا هجن. جيڪڏهن ميل جو مفاصلو x محور تي آهي ته ڪلوميٽر جو مفاصلو y محور تي ٿيندو. اچو ته هيٺيون مثال ڏسون.



مثال

هينيان ميلن ۽ ڪلوميٽرن جي تبديلي جا گراف پڙهو.

(i) 2 ميل ڪلوميٽرن ۾

(ii) 5 ميل ڪلوميٽرن ۾

(iii) 3 ميل ڪلوميٽرن ۾


(iv) 7 ميل ڪلوميٽرن ۾

۽ ڏنل پٿمانا استعمال ڪري تبديل ڪريو.

ميلن ۽ ڪلوميٽرن ۾ تبديلي جو گراف

پٿمانو: 5 ننڍا چورس = 1 ميل x محور تي

5 ننڍا چورس = 1 ڪلوميٽر y محور تي



حل: (i) 2 ميل ڪلوميٽرن ۾

پڙهنداسين ته

2 ميل ≈ 3.20 ڪلوميٽرن جي

(ii) 5 ميل ڪلوميٽرن ۾

مٿئين گراف کي مليل پٿماني مطابق پڙهنداسين ته

5 ميل ≈ 8 ڪلوميٽرن جي

(iii) 3 ڪلوميٽر ميلن ۾


مٿئين گراف جي مليل پٿماني مطابق پڙهنداسين ته

3 ڪلوميٽر ≈ 1.8 ميل

(iv) 7 ڪلوميٽر ميلن ۾

مٿئين گراف کي مليل پٿماني مطابق پڙهنداسين ته

7 ڪلوميٽر ≈ 4.20 ميل



(ii)

هڪٽرن ايڪڙن ۾ تبديلي کي پڙهو.


اچو ته هيڪٽر ۽ ايڪڙن جي نموني جي گراف تي بحث ڪريون، ٻئي زمين جي ايراضي جا ايڪڙ آهن جيڪڏهن هيڪٽر جو مفاصلو $-x$ محور تي ظاهر ڪجي ۽ ايڪڙن جو مفاصلو $-y$ محور تي، ته اچو هيٺيان مثال ڏسون.

مثال:

- هيٺيان هيڪٽر ۽ ايڪڙن جي تبديلي جا گراف پڙهو.
- (i) 2 هيڪٽرن کي ايڪڙن ۾
 - (ii) 6 هيڪٽرن کي ايڪڙن ۾
 - (iii) 10 ايڪڙن کي هيڪٽرن ۾
 - (iv) 8 ايڪڙن کي هيڪٽرن ۾
- ۽ ڏنل پئمنا استعمال ڪري تبديل ڪريو.

هيڪٽرن ۽ ايڪڙن ۾ تبديل ٿيندڙ گراف

پئمنا: 5 نندا چورس = 1 هيڪٽر $-x$ محور تي
2 نندا چورس = 1 هيڪٽر $-y$ محور تي



حل:

(i) 2 هيڪٽرن کي ايڪڙن ۾

مٿئين گراف کي مليل پئماني مطابق پڙهنداسين ته
2 هيڪٽر $\equiv$ 5 ايڪڙن ۾

(ii)


6 هيڪٽر، ايڪڙن ۾

مٿئين گراف کي مليل پئماني مطابق پڙهنداسين ته
6 هيڪٽر $\equiv$ 5 ايڪڙ جي

(iii)

10 ايڪڙ، هيڪٽر ۾

مٿئين گراف کي مليل پئماني مطابق پڙهنداسين ته
10 ايڪڙ $\equiv$ 4 هيڪٽر



(iv) 8 ايڪڙ، هيڪٽرن ۾

مثئين گراف کي مليل پئماني مطابق پڙهنداسين ته

8 ايڪڙ $\equiv 3.20$ هيڪٽر

(iii) سينٽي گريڊ جو فارنھائيٽ ۾ تبديلي جو گراف پڙهو.

اچو ته سينٽي گريڊ ۽ فارنھائيٽ گراف جي نموني تي بحث ڪريون. ٻئي گرمي جي درجي جا ايڪا آهن. جيڪڏهن سينٽي گريڊ $-x$ محور تي ظاهر ڪجي ۽ فارنھائيٽ کي $-y$ محور تي ظاهر ڪجي، ته پوءِ اچو ته هيٺيان مثال ڏسون.

مثال: هيٺيان سينٽي گريڊ ۽ فارنھائيٽ جي تبديلي جا گراف پڙهو.

(i) 1° سينٽي گريڊ کي فارنھائيٽ ۾

(ii) 3° سينٽي گريڊ کي فارنھائيٽ ۾

(iii) 36° فارنھائيٽ کي سينٽي گريڊ ۾


(iv) 37° فارنھائيٽ کي سينٽي گريڊ ۾

۽ ڏنل پئماني استعمال ڪري تبديل ڪريو.

سينٽي گريڊ ۽ فارنھائيٽ ۾ تبديل ٿيندڙ گراف


پئماني: 5 ننڍا چورس $= 1$ سينٽي گريڊ $-x$ محور تي

5 ننڍا چورس $= 1$ فارنھائيٽ $-y$ محور تي

حل: (i) 1° سينٽي گريڊ کي فارنھائيٽ ۾

مثئين گراف کي مليل پئماني مطابق پڙهنداسين ته


1° سينٽي گريڊ $\equiv 33.8^{\circ}$ کي فارنھائيٽ جي




- (ii) 3^u سينتي گريد کي فارنھائيٽ ۾
 مٿئين گراف کي مليل پٿماني مطابق پڙهنداسين ته
 3^u سينتي گريد $\cong 31.8^c$ کي فارنھائيٽ جي
- (iii) 36^u فارنھائيٽ کي سينتي گريد ۾
 مٿئين گراف کي مليل پٿماني مطابق پڙهنداسين ته
 36^c فارنھائيٽ $\cong 2.2^u$ سينتي گريد
- (iv) 37^u فارنھائيٽ کي سينتي گريد ۾
 مٿئين گراف کي مليل پٿماني مطابق پڙهنداسين ته
 37^c فارنھائيٽ $\cong 2.8^u$ سينتي گريد جي
- (iv) سڪي جي تبديلي جو گراف پڙهو.

مثال 1: هيٺيان گراف، آمريڪي ڊالر ۽ پاڪستاني رپيو جي تبديلي جا پڙهو.

- (i) 2 آمريڪي ڊالر کي رپين ۾
 (ii) 5 آمريڪي ڊالر کي روپين ۾
 (iii) 10 رپين کي آمريڪي ڊالر ۾
 (iv) 24 رپين کي آمريڪي ڊالر ۾
- ۽ ڏنل پٿمنا استعمال ڪري تبديل ڪريو.
- آمريڪي ڊالر ۽ پاڪستاني رپين جي تبديلي جو گراف
- پٿمانو: 5 ننڍا چورس = 1 آمريڪي ڊالر x -محور تي
 5 ننڍا چورس = 120 پاڪستاني رپيو y -محور تي



- (i) حل: 2 آمريڪي ڊالر کي رپين ۾
 مٿئين گراف کي مليل پٿماني مطابق پڙهنداسين ته
 2 آمريڪي ڊالر $\cong 240$ رپين جي



(ii) 5 آمريڪي ڊالرن کي رپين ۾

مٿئين گراف کي مليل پئمان مطابق پڙهنداسين ته
5 آمريڪي ڊالر $\cong$ 600 رپين جي

(iii) 360 پاڪستاني رپين کي ڊالرن ۾

مٿئين گراف کي مليل پئمان مطابق پڙهنداسين ته
360 رپيو $\cong$ 3 ڊالر ۾

(iv) 720 پاڪستاني رپين کي ڊالرن ۾

مٿئين گراف کي مليل پئمان مطابق پڙهنداسين ته
720 پاڪستان رپيه $\cong$ 6 ڊالرن جي

7.3 گرافي طريقي سان ٻن بدلجندڙ تي مشتمل مساوات جو حل:

7.3.1 ٻن بدلجندڙ واري هڪ درجي مساوات کي گرافي طريقي سان حل ڪريو.

اسان اڳ ۾ ئي ٻن هڪ درجي مساوات کي آڱري طريقي سان حل ڪرڻ سکي
آيا آهيون. هاڻ اسان هن حصي ۾ ٻن هڪ درجي مساواتن کي ٻن بدلجندڙن سان
گرافي طريقي سان حل ڪرڻ سکنداسين. هتي ٻن ليڪن جي ڪپيندڙ ٽپڪو
مساوات جو حل سيٽ هوندو آهي.

مثال 01 مليل مساواتن جو گرافي طريقي سان حل سيٽ معلوم ڪريو.

$$x + y = 3 \quad \text{۽} \quad x - y = 5$$

حل: مليل مساواتن هن طرح آهن.

$$x + y = 3 \rightarrow (1)$$

$$\text{۽} \quad x - y = 5 \rightarrow (2)$$

هنن مساواتن کي اسان y جي جزي لاءِ هن طرح لکنداسين



$$y = 3 - x \rightarrow (3)$$

$$y = x - 5 \rightarrow (4)$$

هاڻ هر هڪ هڪ درجي مساوات لاءِ الڳ جدول ٺاهيو.

جدول مساوات (3) جي لاءِ هيٺ ڏنل آهي.

x	-1	0	1	2	3	4	...
y	4	3	2	1	0	-1	...



جدول مساوات (4) جي لاءِ هيٺ ڏنل آهي.

x	-1	0	1	2	3	4	...
y	-6	-5	-4	-3	-2	-1	...

هاڻي ٻنهي جدولن ۾ مليل ٽپڪن کي استعمال ڪري سڌيون ليڪون ٺاهيو.

اسان ڏسنداسين ته مليل مساواتن جون سڌيون ليڪون l_1 ڪي ٿي l کي ٽپڪي $(4, -1)$ تي تنهنڪري حل سيٽ آهي $\{4, -1\}$.

مثال مليل مساوات $y = 2x + 4$ ۽ $y = 2x - 2$ جو گراف جي صورت ۾ حل سيٽ معلوم ڪريو.

مليل مساواتون هن ريت آهن.

$$y = 2x + 4 \rightarrow (1)$$


$$\text{۽ } y = 2x - 2 \rightarrow (2)$$

هن هر هڪ هڪ درجي مساوات جي لاءِ الڳ جدول ٺاهيو. مساوات (i) جي لاءِ جدول هيٺ ڏنل آهي.

x	-1	0	1	2	3	4
y	2	4	6	8	10	12

مساوات (ii) جي لاءِ جدول هيٺ ڏنل آهي.

x	-1	0	1	2	3	4
y	-4	-2	0	2	4	6




هاڻي هنن ٽپڪن کي ٻنهي مساواتن لاءِ ظاهر ڪريو. ۽ پوءِ هنن ٽپڪن کي ملائي به ليڪون ٺاهيو.

اسان ڏسي سگهون ٿا ته هنن مساواتن مان حاصل ٿيل ٻنهي سڌين ليڪن ۾ ڪابه مشترڪه ٽپڪو نه آهي. ان جو مطلب ته هي ليڪون پاڻ کي ڪٿي ڪنهن به ٽپڪي تي نه ٿيون ڪپين تنهنڪري ان جو حل سيٽ خالي سيٽ آهي. حل سيٽ $\{ \}$ آهي.




مشق 7.3




- 1 ميل ۽ ڪلوميٽر جا مليل تبديل ٿيل گراف پڙهو.
- 1 ميل کي ڪلوميٽرن ۾
 - 3 ميلن کي ڪلوميٽرن ۾
 - 2 ڪلوميٽرن کي ميلن ۾
 - 8 ڪلوميٽرن کي ميلن ۾
- ۽ مليل پئماني کي استعمال ڪري تبديل ڪريو.

ميلن ۽ ڪلوميٽرن جي وچ ۾ تبديل ٿيل گراف



- پئماني: 5 ننڍا چورس = 1 ميل $-x$ محور سان
5 ننڍا چورس = 1 ميل $-y$ محور سان
- 2 هيڪٽر ۽ ايڪڙن جا مليل تبديل ٿيل گراف پڙهو
- 2 هيڪٽرن کي ايڪڙن ۾
 - 5 هيڪٽرن کي ايڪڙن ۾
 - 5 ايڪڙن کي هيڪٽرن ۾
 - 15 ايڪڙن کي هيڪٽرن ۾
- ۽ مليل پئماني کي استعمال ڪري تبديل ڪريو.

هيڪٽرن ۽ ايڪڙن جي وچ ۾ تبديل ٿيل گراف




- پئماني: 5 ننڍا چورس = 1 هيڪٽر $-x$ محور سان
2 ننڍا چورس = 1 ايڪڙ $-y$ محور سان
- 3 سينٽي گريڊ ۽ فارنهيٽ جا مليل، تبديل ٿيل گراف پڙهو.


- 2° سينٽي گريڊ کي فارنهيٽ ۾
- 80° سينٽي گريڊ کي فارنهيٽ ۾
- 32° فارنهيٽ کي سينٽي گريڊ ۾
- 36.4° فارنهيٽ کي سينٽي گريڊ ۾

سينٽي گريڊ فارنهيٽ جي وچ ۾ تبديل ٿيل گراف

- پئماني: 5 ننڍا چورس = 1 سينٽي گريڊ $-x$ محور سان
5 ننڍا چورس = 1 فارنهيٽ $-y$ محور سان



4. پاکستانی روپين ۽ سعودي ريالن جا مليل، تبديل ٿيل گراف پڙهو.



- (i) 3 سعودي ريال کي روپين ۾
 - (ii) 5.2 سعودي ريال کي روپين ۾
 - (iii) 150 روپين کي سعودي ريالن ۾
 - (iv) 78 روپين کي سعودي ريالن ۾
- ۽ مليل پئماني کي استعمال کري تبديل کريو.

پاکستاني روپين ۽ سعودي ريالن ۾ تبديل ڪرڻ جو گراف.

پئماني: 5 نڍيا چورس = 1 سعودي ريال x محور سان
5 نڍيا چورس = 30 روپيه y محور سان

5. هيٺين همزاد مساواتن کي گراف جي طريقي سان حل کريو.

i. $3x - 11 = y$; $x - 3y = 9$

ii. $x + y = 4$; $2x - 1 = 5y$

iii. $2x = y + 5$; $x = 2y + 1$

iv. $y = 3x - 5$; $x + y = 11$

v. $2x + y = 3$; $x - y = 0$


vi. $2x + 2 = y$; $y = x - 1$

vii. $5 = x + 4y$; $2x + 3y = 0$

viii. $3x = 5y - 2$; $3x + 5y = 8$

ix. $\frac{x+2}{5} + y = 6$; $y = 2x - 12$

x. $3x - 2y = 13$; $2x + 3y = 13$



ورجایل مشق 7

صحيح ۽ غلط جواب.

1.

هيٺيان جملا غور سان پڙهو ۽ T يا F تي گول لڳايو جيڪو به هجي.

- (i) ڪارٽيسي مٿاڇري کي xy مٿاڇرو پڻ چئبو آهي. T/F
- (ii) ٻي چوٽائي ۾ ٻئي x ۽ y محدد مثبت هوندا آهن. T/F
- (iii) ٽپڪو $(1, -2)$ پهرئين چوٽائي ۾ هوندا آهن. T/F
- (iv) ٽپڪو $(-3, -4)$ چوٿين چوٽائي ۾ هوندا آهن. T/F

2.

هيٺين مان صحيح جواب تي (✓) تل لڳايو.


- (i) ٽپڪو $(-3, -4)$ ظاهر ٿيل هوندو آهي. (a) پهرئين چوٽائي ۾ (b) ٻئي چوٽائي ۾ (c) ٽئين چوٽائي ۾ (d) چوٿين چوٽائي ۾
- (ii) ٻه محدد محور جي ڪنڊ تي ڪپيندا آهن. (a) 45° (b) 90° (c) 180° (d) 270°
- (iii) ليڪ $y = 4$ پورو چوٽو آهي. (a) $-x$ محور (b) $-y$ محور (c) ٻنهي محورن تي (d) ڪوبه نه
- (iv) ليڪ $x = 5$ پورو چوٽو آهي. (a) $-x$ محور (b) $-y$ محور (c) ٻنهي محورن تي (d) ڪوبه نه
- (v) ليڪ $x = 5$ جي $-x$ محور تي ٽپڪو آهن. (a) $(-5, 5)$ (b) $(0, -5)$ (c) $(-5, 0)$ (d) $(5, 0)$
- (vi) ليڪ $x = 2$ جي $x = 5$ جو حل سيٽ آهي. (a) $\{(2, 5)\}$ (b) $\{(2, 5)\}$ (c) $\{(0, 5)\}$ (d) $\{ \}$
- (vii) محدد محور پاڻ ۾ _____ آهن. (a) عمود (b) پورو چوٽو (c) 30° تي ڪپيندڙ (d) 45° تي ڪپيندڙ



خلاصو



- ♦ ترتيب ڏنل جوڙو، ڪارٽيسي مٿاڇري تي ٽپڪي جي جڳهه کي ظاهر ڪندو آهي.
- ♦ ٻه طرفي ڪارٽيسي محددي نظام، ٻن عمودي ليڪن $-x$ ۽ $-y$ محور سان تعريف ڪيو ويندو آهي ٻئي محور هڪ ٻئي کي مخصوص ٽپڪي تي اڏو اڌ ڪندا جنهن کي اصل $(0, 0)$ چئبو آهي.
- ♦ مٿاڇرو چئن چوٿائين ۾ محور سان ورهايل آهي.
- ♦ ڪارٽيسي مٿاڇري کي xy مٿاڇرو پڻ چئبو آهي.
- ♦ پهرين چوٿي I ۾ ٻئي $-x$ محددي ۽ $-y$ محددي واڌو آهن $x > 0$ ۽ $y > 0$.
- ♦ ٻئي چوٿي II ۾ x محددي ڪاٽو ۽ $-y$ محددي واڌو آهي $x < 0$ ۽ $y > 0$.
- ♦ ٽئين چوٿي III ۾ x محددي ۽ $-y$ محددي ڪاٽو آهن $x < 0$ ۽ $y < 0$.
- ♦ چوٿين چوٿي IV ۾ x محددي واڌو ۽ $-y$ محددي ڪاٽو آهي $x > 0$ ۽ $y < 0$.
- ♦ اصل ٽپڪي تي $x = y = 0$ تنهنڪري اصل نقطي جا محددي $(0, 0)$ آهن.
- ♦ عام طرح سان ڪارٽيسي مٿاڇري ۾ ٽپڪن کي ترتيب ڏنل جوڙن (a, b) جي صورت ۾ ظاهر ڪيو آهي، جڏهن ته a ، $-x$ محددي (abscissa) ۽ b ، y محددي (ordinate) آهي.
- ♦ $x = a$ جو گراف $-y$ محور جي پورو چوٽ آهي.
- ♦ $y = c$ جو گراف $-x$ محور جي پورو چوٽ آهي.
- ♦ $y = mx$ جو گراف هميشه اصل مان گذرندو آهي.
- ♦ $y = mx + c$ جو گراف $-y$ محور کي $y = c$ ۾ ڪٽيندو آهي.



په درجي مساوات (Quadratic Equation)

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هي يونٽ مڪمل ڪرڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ هڪ بدلجندڙ ۾ په درجي مساوات حل ڪري سگهندا.
- ◆ جزن وسيلي
- ◆ مڪمل چورس بنائڻ
- ◆ مڪمل چورس بنائڻ جو طريقو استعمال ڪري په درجي فارمولا حاصل ڪندا په درجي فارمولو استعمال ڪري په درجي مساوات حل ڪندا.
- ◆ $ax^2 + bx + c = 0$ نموني مساوات کي په درجي مساوات ۾ تبديل ڪري چوٽائي يا چوٽائي درجي جي مساوات.
- ◆ $ap(x) + \frac{c}{p(x)} = b$ صورت واري مساوات کي حل ڪري سگهندا، جڏهن ته a ۽ b ۽ c عدد آهن.
- ◆ ٻنهي طرفن واري مساوات جي صورت $a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$ کي حل ڪري سگهندا. جڏهن ته a ۽ b ۽ c عدد آهن.
- ◆ سگهن واريو مساواتون، جنهن جي بدلجندڙ تي سگهه نما هجن، حل ڪري سگهندا.
- ◆ مساوات جي صورت $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = k$ کي حل ڪري سگهندا جڏهن ته $a + b = c + d$ $k \neq 0$
- ◆ مساوات ڏنل صورت ۾ حل ڪندا.
- ◆ $\sqrt{(ax + b)} = cx + d$.
- ◆ $\sqrt{(x + a)} + \sqrt{(x + b)} = \sqrt{(x + c)}$
- ◆ $\sqrt{(x^2 + px + m)} + \sqrt{(x^2 + px + n)} = q$.

8.1 ٻه درجي مساوات ۽ انهن جو حل

8.1.1 وضاحت ڪري پوءِ ٻه درجي مساوات جي معياري صورت جي تعريف ڪريو.

ٻه درجي گهڻ رقمي مساوات کي ٻه درجي مساوات چئبو آهي.
ٻه درجي مساوات جي معياري صورت $ax^2+bx+c=0$ آهي جڏهن ته $a \neq 0$ ۽ $a, b, c \in \mathbb{R}$

هن صورت ۾ "a" عددي سرو آهي x^2 جو، b عددي سرو آهي x جو ۽ c مستقل جزو آهي.

$ax^2+bx+c=0$ ۾ جيڪڏهن $a=0$ ته اها گهٽجي هڪ درجي مساوات $bx+c=0$ ٿيندي ۽ جيڪڏهن $b=0$ ته پوءِ اها، خالص ٻه درجي صورت $ax^2+c=0$ ۾ ٿيندي.

هيٺيان مثال ٻه درجي مساوات جا آهن.

$$(i) \quad 4x^2+4x+1=0 \quad (\text{ٻه درجي مساوات جي معياري صورت})$$

$$(ii) \quad x^2-4=0 \quad (\text{خالص ٻه درجي مساوات})$$

8.1.2 هڪ بدلجندڙ ۾ ٻه درجي مساوات جو حل ڪريو.

• جزن ذريعي

• مڪمل چورس بڻائڻ ذريعي

هتي اسان ٻه درجي مساوات کي حل ڪرڻ لاءِ ٻن طريقن کي غور ڪريون ٿا.
(a) جزن ڪرڻ جو طريقو (b) مڪمل چورس بڻائڻ جو طريقو

(a) جزن ڪرڻ جو طريقو

مثال 01 حل ڪريو.

$$(i) \quad x^2+2x-15=0 \quad (ii) \quad 2x^2-5x=12$$

$$x^2+2x-15=0 \quad \text{حل (i):}$$

$$\Rightarrow x^2+5x-3x-15=0$$


$$\Rightarrow x(x+5)-3(x+5)=0$$

$$\Rightarrow (x-3)(x+5)=0$$

$$\Rightarrow x-3=0 \quad \text{يا} \quad x+5=0$$

$$\Rightarrow x=3 \quad \text{يا} \quad x=-5$$

تنهنڪري حل سيٽ آهي $\{-5, 3\}$



$$2x^2 - 5x = 12$$

حل (ii):

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2x^2 - 5x - 12 &= 0 \\ \Rightarrow 2x^2 - 8x + 3x - 12 &= 0 \\ \Rightarrow 2x(x - 4) + 3(x - 4) &= 0 \\ \Rightarrow (x - 4)(2x + 3) &= 0 \\ \Rightarrow x - 4 = 0 \quad \text{or} \quad 2x + 3 = 0 \\ \Rightarrow x = 4 \quad \text{or} \quad x = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

تنهنڪري حل سيٽ آهي $\left\{-\frac{3}{2}, 4\right\}$

مثال 02 خالص ٻه درجي مساوات $4m^2 - 1 = 0$ ، جنهن واري طريقي سان حل ڪريو.

$$4m^2 - 1 = 0$$

حل:

$$\begin{aligned} \Rightarrow (2m)^2 - (1)^2 &= 0 \\ \Rightarrow (2m - 1)(2m + 1) &= 0 \quad [a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\ \Rightarrow 2m - 1 = 0 \quad \text{or} \quad 2m + 1 = 0 \\ \Rightarrow 2m = 1 \quad \text{or} \quad 2m = -1 \\ \Rightarrow m = \frac{1}{2} \quad \text{or} \quad m = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

تنهنڪري حل سيٽ آهي $\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$

(b) مڪمل چورس بڻائڻ وارو طريقو

طريقي جي وضاحت هيٺ ڪجي ٿي.

- (i) پهريائين مساوات کي معياري صورت $ax^2 + bx + c = 0$ ۾ لکو
- (ii) مساوات کي ٻنهي پاسن کان x^2 جي عددي منڍي، جيڪو 1 کان مختلف هجي، ان سان ونڊڪريو.
- (iii) مستقل رقم کي ساڄي پاسي ٽپايو.
- (iv) ٻنهي طرف $\left(x + \frac{1}{2}\right)$ جو عددي منڍو $\left(\frac{1}{2}\right)$ جوڙ ڪريو.
- (v) کاٻي طرف واري رقم کي چورس ۾ لکو ۽ ساڄي طرف واري رقم کي مختصر ڪيو.



(vi) مليل مساوات جي ٻنهي طرفن جو ٻيو مول وٺو، حاصل ٿيندڙ مساوات کي، حل ڪريو ۽ حل سيٽ لکو.

مثال 01 حل ڪريو $2x^2 + 8x - 1 = 0$

$$2x^2 + 8x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 8x = 1 \quad \dots (i)$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x = \frac{1}{2} \quad \dots (ii)$$

مساوات (i) کي 2 سان ونڊ ڪرڻ سان

مساوات جي ٻنهي طرفن $= 4$ جوڙ $\left[\frac{1}{2} \times 4\right]^2$ ڪريو. ته اسان کي ملندو

$$x^2 + 4x + 4 = \frac{1}{2} + 4$$

$$\Rightarrow x^2 + 2(2)x + (2)^2 = \frac{1}{2} + (2)^2$$

$$\Rightarrow (x+2)^2 = \frac{1}{2} + 4$$

$$\Rightarrow (x+2)^2 = \frac{9}{2}$$

$$\Rightarrow x+2 = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow x+2 = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow x+2 = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow x = -2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-4 + 3\sqrt{2}}{2}$$

$$x+2 = -\frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$x+2 = \frac{-3\sqrt{2}}{2}$$

$$x = -2 - \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \frac{-4 - 3\sqrt{2}}{2}$$

ته حل سيٽ آهي $\left\{ \frac{-4 + 3\sqrt{2}}{2}, \frac{-4 - 3\sqrt{2}}{2} \right\}$

مشق 8.1

1. هيٺيون ٻه درجي مساواتون جن کي واري طريقي سان حل ڪريو.

(i) $x^2 + 5x + 6 = 0$ (ii) $6x^2 - x - 1 = 0$ (iii) $x^2 - 11x + 30 = 0$
 (iv) $x^2 - 2x = 0$ (v) $x^2 - 2x - 15 = 0$ (vi) $12x^2 - 41x + 24 = 0$
 (vii) $(x-5)^2 - 9 = 0$ (viii) $(3x+4)^2 - 16 = 0$

2. هيٺين مان هر هڪ مڪمل چورس بڻائڻ واري طريقي سان حل ڪريو.

(i) $x^2 + 6x + 1 = 0$ (ii) $(3x+2)(x+2) = 6 - 2(x+1)$. (iii) $3x^2 - 8x = -1$
 (iv) $24x^2 = -10x + 21$ (v) $2(x^2 - 3) - 3x = 2(x+3)$ (vi) $2x^2 + 4x - 1 = 0$

3. مساوات $3x^2 + bx - 8 = 0$ انهن جي جن مان 2 هڪ جز هجي.

(i) b جو ملهه ڇا آهي.

(ii) مساوات جو ٻيو جزو ڪهڙو آهي.

8.2 ٻه درجي فارمولا

مليل مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ کي حل ڪرڻ لاءِ اسان هيٺيون ٻه درجي فارمولا $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ استعمال ڪنداسين. جنهن کي ٻه درجي فارمولا چئبو آهي.

8.2.1: مڪمل چورس بڻائڻ وارو طريقو استعمال ڪري ٻه درجي فارمولا حاصل ڪريو.

ٻه درجي مساوات معياري صورت ۾ لکو.

(i) $ax^2 + bx + c = 0$. . .

مساوات (i) کي ٻنهي طرف a سان ونڊ ڪرڻ سان حاصل ٿيندو.

$$\frac{ax^2}{a} + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = \frac{0}{a}$$

$$\therefore x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = 0$$

مستقل جزي $\frac{c}{a}$ کي ساڄي پاسي ٽپائڻ سان

$$\therefore x^2 + \frac{bx}{a} = -\frac{c}{a} \quad \text{. . . (ii)}$$

مساوات ۾ ٻنهي طرفن $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ جوڙ ڪرڻ سان

$$\begin{aligned}
\therefore x^2 + \frac{bx}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\
\Rightarrow x^2 + 2\left(\frac{b}{2a}\right)x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \\
\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{-4ac + b^2}{4a^2} \\
\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\
\Rightarrow x + \frac{b}{2a} &= \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
\Rightarrow x &= -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
\Rightarrow x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
\end{aligned}$$

8.2.2: ٻه درجي مساوات ڪر حل ڪرڻ لاءِ ٻه درجي فارمولا جو استعمال

مثال 01 ٻه درجي فارمولا استعمال ڪري حل ڪريو.

$$(i) 2x^2 - 5x - 3 = 0$$

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

حل (i):

هتي $a = 2, b = -5, c = -3$

ٻه درجي فارمولا استعمال ڪرڻ سان

$$\begin{aligned}
\therefore x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
\therefore x &= \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(2)(-3)}}{4} \\
\Rightarrow x &= \frac{5 \pm \sqrt{25 - (-24)}}{4} \\
\Rightarrow x &= \frac{5 \pm \sqrt{49}}{4} \\
\Rightarrow x &= \frac{5 \pm 7}{4}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x = \frac{5+7}{4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{12}{4}$$

$$\Rightarrow x = 3$$

$$x = \frac{5-7}{4}$$

$$x = \frac{-2}{4}$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

تہ جزا آھن 3 ۽ $-\frac{1}{2}$

تہ حل سیٹ آھي $\left\{3, -\frac{1}{2}\right\}$

$$x^2 + x + 1 = 0$$

حل (ii):

ھتي $a = 1, b = 1, c = 1$ آھي.

بہ درجي فارمولا استعمال ڪرڻ سان

$$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{(1)^2 - 4(1)}}{2(1)}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2},$$

تہ حل سیٹ آھي $\left\{\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right\}$

مشق 8.2

ھيٺيون مساواتون بہ درجي فارمولا استعمال ڪري حل ڪريو.

(i) $x^2 - 2x = 15$

(ii) $10x^2 + 19x - 15 = 0$

(iii) $x^2 = -x + 1$

(iv) $2x = 9 - 3x^2$

(v) $9x^2 = 12x - 49$

(vi) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - 1 = 0$

(vii) $3x^2 - 2x + 2 = 0$

(viii) $6x^2 - x - 1 = 0$

(ix) $4x^2 - 10x = 0$

(x) $x^2 - 1 = 0$

(xi) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(xii) $\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x-4} = 4$

8.3 ٻه درجي صورت ۾ گهٽجندڙ جهڙيون مساواتون

مساواتن جا ڪيترا ئي نمونا آهن جيڪي ٻه درجي نه آهن پر انهن کي ٻه درجي صورت ۾ ڪو مناسب نعمل بدل وٺي گهٽائي سگهجي ٿو.

8.3.1: $ax^4 + bx^2 + c = 0, a \neq 0$ نموني جي مساوات ٻه درجي صورت ۾ گهٽجڻ جهڙن

مساواتن کي حل ڪريو. چوٽائي درجي جي مساوات

فرض ڪريو ته $ax^4 + bx^2 + c = 0$ ، چوٽائي يا چوٽائي درجي جي مساوات آهي ۽ ٻه درجي صورت $ay^2 + by + c = 0$ ۾ گهٽائي سگهجي ٿي. هي طريقو هيٺين مثالن سان سمجهايو ويو آهي.

مثال چوٽائي درجي جي مساوات $4x^4 - 25x^2 + 36 = 0$ کي حل ڪريو.

$$4x^4 - 25x^2 + 36 = 0 \quad \dots (i)$$

هن مساوات کي لکي سگهجي ٿو

$$(x^2)^2 - 25x^2 + 36 = 0 \quad \dots (ii)$$

$y = x^2$ مساوات (ii) ۾ لکڻ سان اسان کي ملندو

$$4y^2 - 25x^2 + 36 = 0$$

هتي $a = 4, b = -25, c = 36$ آهي.

$$\therefore y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$$\therefore y = \frac{-(-25) \pm \sqrt{(-25)^2 - 4(4)(36)}}{2(4)}$$

$$y = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 576}}{2(4)} = \frac{25 \pm \sqrt{49}}{8} = \frac{25 \pm 7}{8}$$

$$\text{i.e., } y = \frac{25 + 7}{8}$$

$$y = \frac{32}{8} = 4$$

but, $y = x^2$, then

$$x^2 = 4$$

$$y = \frac{25 - 7}{8}$$

$$y = \frac{18}{8} = \frac{9}{4}$$

$$x^2 = \frac{9}{4}$$

$$x = \pm 2$$

$$x = \pm \frac{3}{2}$$

تہ حل سیٹ آهي $\left\{ \pm 2, \pm \frac{3}{2} \right\}$

8.3.2: $ap(x) + \frac{b}{p(x)} = c$ نموني جي مساوات حل ڪريو، جڏهن a, b ۽ c حقيقي آهن.
 $a \neq 0$ ۽ $p(x)$ هڪ الجبري اظهار آهي.

مثال 01 حل ڪريو $8\sqrt{x+3} - \frac{1}{\sqrt{x+3}} = 2$

(i) $8\sqrt{x+3} - \frac{1}{\sqrt{x+3}} = 2$

حل:

فرض ڪريو ته $p(x) = y = \sqrt{x+3}$ ته (i) ۾ رقم رکڻ سان

$$\Rightarrow 8y - \frac{1}{y} = 2$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 1 = 2y$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 2y - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 4y + 2y - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 4y(2y - 1) + 1(2y - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (4y + 1)(2y - 1) = 0$$

$$\Rightarrow 4y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{4}$$

when $y = -\frac{1}{4}$,

$$\sqrt{x+3} = -\frac{1}{4}$$

ٻنهي پاسي چورس وٺڻ سان

$$\Rightarrow x+3 = \frac{1}{16}$$

$$2y - 1 = 0$$

$$y = \frac{1}{2}$$

$y = \frac{1}{2}$, then,

$$\sqrt{x+3} = \frac{1}{2}$$

ٻنهي پاسي چورس وٺڻ سان

$$x+3 = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{16} - 3$$

$$\Rightarrow x = \frac{1-48}{16}$$

$$\Rightarrow x = -\frac{47}{16}$$

$$x = \frac{1}{4} - 3$$

$$x = \frac{1-12}{4}$$

$$x = -\frac{11}{4}$$

چکاس

$$8\sqrt{x+3} - \frac{1}{\sqrt{x+3}} = 2$$

مٿين مساوات ۾ $x = -\frac{47}{16}$ وجهڻ سان

$$8\sqrt{\frac{-47}{16} + 3} - \frac{1}{\sqrt{\frac{-47}{16} + 3}} = 2$$

$$8\sqrt{\frac{-47+48}{16}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{-47+48}{16}}} = 2$$

$$8\sqrt{\frac{1}{16}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{16}}} = 2$$

$$8\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{\left(\frac{1}{4}\right)} = 2$$

$$2 - 4 = 2$$

$$-2 \neq 2$$

ثابت نه ٿيو. Non verified

مٿين مساوات ۾ $x = -\frac{11}{4}$ وجهڻ سان

$$8\sqrt{\frac{-11}{4} + 3} - \frac{1}{\sqrt{\frac{-11}{4} + 3}} = 2$$

$$8\sqrt{\frac{-11+12}{4}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{-11+12}{4}}} = 2$$

$$8\sqrt{\frac{1}{4}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = 2$$


$$8\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)} = 2$$

$$4 - 2 = 2$$

$$2 = 2$$

ثابت ٿي ويو. Verified

$$\left\{-\frac{11}{4}\right\} = \text{تہ حل سیت آهي}$$



8.3.3: باهمي مساوات، $a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$ حل ڪريو. جڏهن ته a, b, c ۽

ناطق عدد آهن

هڪ گهڻ رقمي مساوات کي باهمي مساوات (Reciprocal Equation) چئبو جيڪڏهن اها تبديل نه ٿئي هجي جڏهن x کي تبديل ڪجي $\frac{1}{x}$ سان.

هن قسم جي باهمي مساوات، $a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$ کي حل ڪرڻ جو طريقو هيٺين مثالن ۾ ڏجي ٿو، جڏهن a, b, c ناطق عدد هجن.

مثال 10 حل ڪريو $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 9\left(x + \frac{1}{x}\right) + 14 = 0$

حل:

جيڪڏهن $y = x + \frac{1}{x}$ ته پوءِ $y^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2}$ ته مساوات (i) ۾ رکڻ سان ملندو

$$2(y^2 - 2) - 9y + 14 = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 9y + 10 = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 4y - 5y + 10 = 0$$

$$\Rightarrow 2y(y - 2) - 5(y - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (y - 2)(2y - 5) = 0$$

$$\text{i.e. } y - 2 = 0$$

$$\Rightarrow y = 2$$

$$\text{جڏهن } y = x + \frac{1}{x} \text{ ته پوءِ}$$

$$x + \frac{1}{x} = 2$$

$$\Rightarrow x^2 + 1 = 2x$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$2y - 5 = 0$$

$$y = \frac{5}{2}$$

$$y = x + \frac{1}{x} \text{ استعمال ڪرڻ سان ملندو}$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 1}{x} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2 = 5x$$



$$\Rightarrow (x-1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x-1=0$$

$$\Rightarrow x=1$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 4x - x + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2x(x-2) - 1(x-2) = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)(2x-1) = 0$$

$$\Rightarrow x-2=0$$

$$\Rightarrow x=2$$

$$\Rightarrow 2x-1=0$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

ته حل سيٽ ٿيندو $\left\{\frac{1}{2}, 2, 1\right\}$.

8.3.4: سگهن واريون حل ڪريو جنهن ۾ بدلجندڙ تي سگهه نما هجن مساواتون جن ۾ بدلجندڙن تي سگهه نما مليل هجن ته انهن کي سگهن واري مساوات چئبو آهي. اهڙي مساواتن جو حل هيٺين مثالن سان ظاهر ڪيو ويو آهي.

مثال 01 حل ڪريو $7^{1+x} + 7^{1-x} = 50$

$$7^{1+x} + 7^{1-x} = 50 \quad \dots (i)$$

(سگهن تي تقسيم ڪرڻ سان) $7 \cdot 7^x + 7 \cdot 7^{-x} - 50 = 0$

$$\Rightarrow 7 \cdot 7^x + \frac{7}{7^x} - 50 = 0 \quad \dots (ii)$$

فرض ڪريو ته $y = 7^x$

مساوات (ii) کي گهٽائڻ سان $\therefore$

$$7y + \frac{7}{y} - 50 = 0,$$

$$\Rightarrow 7y^2 + 7 - 50y = 0$$

$$\Rightarrow 7y^2 - 50y + 7 = 0$$

$$\Rightarrow 7y^2 - 49y - y + 7 = 0 \quad (\text{Factorizing})$$

$$\Rightarrow 7y(y-7) - 1(y-7) = 0$$

$$\Rightarrow (7y-1)(y-7) = 0$$

$$\begin{array}{lcl}
 \Rightarrow & 7y-1=0 & y-7=0 \\
 \Rightarrow & y=\frac{1}{7} & \Rightarrow y=7 \\
 & \text{then } 7^x = 7^{-1} & y=7 \text{ then } 7^x = 7^1 \\
 \Rightarrow & x=-1 & x=1
 \end{array}$$

$\{-1, 1\}$ تہ حل سیٹ آھی

8.3.5 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=k$ نمونی واریون مساواتون حل کریو۔ جڈھن تہ $a+b=c+d$ $k \neq 0$ مستقل آھی۔

$$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=48$$

مثال 01

$$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=48$$

حل:

ترتیب کی تبدیل کرڻ سان

$$(x+4)(x+3)(x+2)(x+1)=48$$

$$(x^2+4x+x+4)(x^2+2x+3x+6)=48$$

$$(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)=48 \dots (i)$$

فرض کریو تہ $x^2+5x=t$

By substituting in equation (i)

$$\Rightarrow (t+4)(t+6)=48$$

$$\Rightarrow t^2+4t+6t+24=48$$

$$\Rightarrow t^2+10t-24=0$$

$$\Rightarrow t^2+12t-2t-24=0$$

$$\Rightarrow t(t+12)-2(t+12)=0$$

$$\Rightarrow (t+12)(t-2)=0$$

یاوری

$$\Rightarrow t+12=0$$

$$t-2=0$$

$$\Rightarrow t=-12$$

$$t=2$$

(ii) مساوات ۾ رقم تبدیل کرڻ سان

$$\Rightarrow x^2+5x=-12$$

$$\Rightarrow x^2+5x+12=0$$

(ii) مساوات ۾ رقم تبدیل کرڻ سان

$$x^2+5x=2$$

$$x^2+5x-2=0$$

$$a=1, b=5 \text{ and } c=12,$$

هتي

$$\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 48}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{-23}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm i\sqrt{23}}{2}$$

$$\left\{ \frac{-5 \pm i\sqrt{23}}{2}, \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2} \right\} \text{ حل سيٽ آهي}$$

$$a=1, b=5 \text{ and } c=-2,$$

هتي

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 8}}{2}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$$

مشق 8.3

هيٺيون مساواتون حل ڪريو.

1. $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

3. $12x^4 - 11x^2 + 2 = 0$

5. $\sqrt{\frac{2x^2+1}{x^2+1}} + 6\sqrt{\frac{x^2+1}{2x^2+1}} = 5$

7. $5^{2x} + 5^{x+3} + 125 = 5^x$

9. $2\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 - 4\left(\frac{x}{x-1}\right) + 4 = 0$

11. $2x^2 + 2^{-x+6} - 20 = 0$

13. $(x-1)(x+2)(x+3)(x+4) = 120$

15. $(x-2)(x+1)(x+3)(x-4) = 24$

2. $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$

4. $\frac{2x+3}{x+1} + 6\left(\frac{x+1}{2x+3}\right) = 7$


6. $5^{x+1} + 5^{2-x} = 5^3 + 1$

8. $2\left(\frac{x}{x+1}\right)^2 - 5\left(\frac{x}{x+1}\right) + 2 = x \neq -1$

10. $9^{x+2} - 6 \cdot 3^{x+1} + 1 = 0$

12. $(x-1)(x+5)(x+8)(x+2) = 880$

14. $7^{1+x} + 7^{1-x} = 50$



8.4 مولي مساواتون

اهڙيون مساواتون جن جي بدلجندڙ اظهارن تي مول هجي ته انهن کي مولي مساواتون چئبو آهي. مولي مساواتن جو چڪاس ڪرڻ ضروري آهي.

8.4.1: مساواتن جي هيٺين نمونن جو حل

نمونو (i): $\sqrt{ax+b} = cx+d$ نمونو (ii): $\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b} = \sqrt{x+c}$
 نمونو (iii): $\sqrt{x^2+px+m} + \sqrt{x^2+px+n} = q$

نمونو (i): $\sqrt{ax+b} = cx+d$

مثال حل ڪريو $\sqrt{217-x} = x-7$

$$\sqrt{217-x} = x-7$$

حل:

ٻنهي پاسي چورس ڪرڻ سان

$$(\sqrt{217-x})^2 = (x-7)^2$$

$$\Rightarrow 217-x = (x-7)^2$$

$$\Rightarrow 217-x = x^2-14x+49$$

$$\Rightarrow x^2-13x-168=0$$

$$\Rightarrow x^2-21x+8x-168=0$$

$$\Rightarrow x(x-21)+8(x-21)=0$$

$$\Rightarrow (x-21)(x+8)=0$$

$$x=21 \quad \text{يا} \quad x=-8$$

چڪاس: $x=21$

$$\sqrt{217-x} = x-7$$

$$\therefore \sqrt{217-21} = 21-7$$

$$\Rightarrow \sqrt{196} = 14$$

$$\Rightarrow 14 = 14$$

ثابت ٿيو verified

{21} حل سيٽ آهي

چڪاس: $x=-8$

$$\sqrt{217-x} = x-7$$

$$\therefore \sqrt{217-(-8)} = -8-7$$

$$\Rightarrow \sqrt{225} = 15$$

$$\Rightarrow 15 \neq -15$$

ثابت نه ٿيو not verified



نمونو(ii): $\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b} = \sqrt{x+c}$

مثال حل کریو $\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$$

حل:

بنيهي پاسي چورس کرڻ سان

$$(\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2})^2 = (\sqrt{6x+13})^2$$

$$\Rightarrow (\sqrt{x+7})^2 + 2(\sqrt{x+7})(\sqrt{x+2}) + (\sqrt{x+2})^2 = 6x+13$$

$$\Rightarrow x+7 + 2\sqrt{(x+7)(x+2)} + x+2 = 6x+13,$$

$$\Rightarrow 2x+7+2+2\sqrt{(x^2+7x+2x+14)} = 6x+13$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{x^2+9x+14} = 4x+4$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2+9x+14} = 2x+2$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2+9x+14} = 2(x+1)$$

وري بنيهي پاسي چورس کرڻ سان

$$(\sqrt{x^2+9x+14})^2 = [2(x+1)]^2$$

$$\Rightarrow x^2+9x+14 = 4(x+1)^2$$

$$\Rightarrow x^2+9x+14 = 4(x^2+2x+1)$$

$$\Rightarrow x^2+9x+14 = 4x^2+8x+4$$

$$\Rightarrow 3x^2-x-10 = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2+5x-6x-10 = 0$$

$$\Rightarrow x(3x+5)-2(3x+5) = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)(3x+5) = 0$$

يا وري

$$3x+5 = 0$$

$$\text{i.e. } x = -\frac{5}{3} \quad \text{يا}$$

چکاس:

$$x = -\frac{5}{3}$$


$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$$

$$x-2 = 0$$

$$x=2$$

$$x=2$$

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13},$$



$$\sqrt{-\frac{5}{3}+7} + \sqrt{-\frac{5}{3}+2} = \sqrt{6\left(-\frac{5}{3}\right)+13}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{16}{3}} + \sqrt{\frac{1}{3}} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{\sqrt{3}} \neq \sqrt{3}$$

ثابت نہ ٿيو. Not verified.

$$\sqrt{2+7} + \sqrt{2+2} = \sqrt{6(2)+13},$$

$$\Rightarrow \sqrt{9} + \sqrt{4} = \sqrt{25}$$

$$\Rightarrow 3+2=5$$

$$\Rightarrow 5=5$$

ثابت ٿيو. Verified.

جڏهن ته $-\frac{5}{3}$ ٻاهرين جز آهي تنهن ڪري $x=5$ حل آهي {5}

نمونو (iii): $\sqrt{x^2+px+m} + \sqrt{x^2+px+n} = q$

مثال 01 حل ڪريو $\sqrt{x^2-3x+21} - \sqrt{x^2-3x+5} = 2$

مليل مساوات ۾ $y = x^2 - 3x$ رکڻ سان اسان کي ملندو

حل:

$$\sqrt{x^2-3x+21} - \sqrt{x^2-3x+5} = 2$$

$$\sqrt{y+21} - \sqrt{y+5} = 2$$

$$\sqrt{y+21} = 2 + \sqrt{y+5}$$

ٻنهي طرفن چورس ڪرڻ سان

$$y+21 = (2)^2 + 4\sqrt{y+5} + (\sqrt{y+5})^2$$

$$\Rightarrow y+21 = (2)^2 + 4\sqrt{y+5} + (y+5)$$

$$\Rightarrow y+21 = 4 + 4\sqrt{y+5} + y+5$$

$$\Rightarrow 4\sqrt{y+5} = y+21-4-y-5$$

$$\Rightarrow 4\sqrt{y+5} = 12$$

$$\Rightarrow \sqrt{y+5} = 3$$

وري ٻنهي طرفن چورس ڪرڻ سان اسان کي ملندو.

$$\Rightarrow y+5=9$$

$$\Rightarrow y=4,$$

$y=4$ رکبو، تبديل ڪيل $y = x^2 - 3x$ ۾ ته اسان کي ملندو.



$$\begin{aligned}
 4 &= x^2 - 3x, \\
 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 &= 0, \\
 \Rightarrow x^2 - 4x + x - 4 &= 0, \\
 \Rightarrow x(x-4) + 1(x-4) &= 0, \\
 \Rightarrow (x-4)(x+1) &= 0, \\
 \text{i.e., } x - 4 &= 0 \\
 \Rightarrow x &= 4,
 \end{aligned}$$

چڪاس:
جيڪڏهن $x = -1$

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x^2 - 3x + 21} - \sqrt{x^2 - 3x + 5} &= 2 \\
 \sqrt{(-1)^2 - 3(-1) + 21} - \sqrt{(-1)^2 - 3(-1) + 5} &= 2 \\
 \sqrt{1 + 3 + 21} - \sqrt{1 + 3 + 5} &= 2 \\
 \sqrt{25} - \sqrt{9} &= 2 \\
 5 - 3 &= 2 \\
 2 &= 2
 \end{aligned}$$

تنهنڪري ٻئي جز مليل مساوات جو حصو آهن تنهنڪري حل سيٽ ٿيندو $\{-1, 4\}$

$$\begin{aligned}
 x + 1 &= 0 \\
 x &= -1,
 \end{aligned}$$

For $x = 4$

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x^2 - 3x + 21} - \sqrt{x^2 - 3x + 5} &= 2 \\
 \sqrt{(4)^2 - 3(4) + 21} - \sqrt{(4)^2 - 3(4) + 5} &= 2 \\
 \sqrt{16 + 12 + 21} - \sqrt{16 - 12 + 5} &= 2 \\
 \sqrt{25} - \sqrt{9} &= 2 \\
 5 - 3 &= 2 \\
 2 &= 2
 \end{aligned}$$

مشق 8.4

هيٺين مساواتن کي حل ڪريو.

- $x + \sqrt{x+5} = 7$
- $\sqrt{x-2} = 8 - x$
- $\sqrt{7-5x} + \sqrt{13-5x} = 3\sqrt{4-2x}$
- $\sqrt{x+2} + \sqrt{x+7} = \sqrt{6x+13}$
- $\sqrt{x^2 - 3x + 36} - \sqrt{x^2 - 3x + 9} = 3$
- $\sqrt{x^2 + 3x + 32} + \sqrt{x^2 + 3x + 5} = 9$

ورجايل مشق 8.4

خال ڀريو.

(i) گهڻ رڦمي مساوات جنهن ۾ بدلدندڙ جو درجو _____ هجي ته ان

کي ٻه درجي مساوات چئبو آهي.

(ii) ٻه درجي مساوات جي معياري آهي _____.

(iii) $3^x + 3^{2x} = 1$ کي _____ مساوات چئبو.(iv) $3^x = 9$ جو حل ٿيندو _____.(v) $ax^2 + bx + c = 0$ جو حل ٿيندو _____.

درست جواب تي (v) ڪريو.

(i) ٻه درجي مساوات جو درجو آهي.

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

(ii) ٻه درجي مساوات جي معياري صورت آهي.

(a) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ (b) $ax^2 + c = 0, a \neq 0$ (c) $ax^2 + bx = 0, a \neq 0$ (d) $ax^3 + bx^2 + c = 0, a \neq 0$ (iii) $ax^2 + bx + c = 0$ جي لاءِ ٻه درجي فارمولا آهي.(a) $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$ (b) $\frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (c) $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (d) $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$ (iv) $x^2 + 10x + 24 = 0$ جو حل سيٽ آهي.(a) $\{-6, -4\}$ (b) $\{-6, 4\}$ (c) $\{6, 4\}$ (d) $\{6, -4\}$

(v) ٻه درجي مساوات جا وڌ ۾ وڌ جزا آهن

(a) 2 (b) 3 (c) 1 (d) 4

(vi) $x^2 - 15x + 56$ جا هڪ درجي جزا آهن.(a) $(x-7)$ ۽ $(x+8)$ (b) $(x+7)$ ۽ $(x-8)$ (c) $(x-7)$ ۽ $(x-8)$ (d) $(x+7)$ ۽ $(x+8)$ (vii) گهڻ رڦمي مساوات جيڪا تبديل نه ٿي سگهي جڏهن x کي $\frac{1}{x}$ سان تبديل

ڪجي ان کي چئبو _____.

(a) سگهن واري مساوات (b) باهمي مساوات (Reciprocal)

(c) مولي مساوات (d) هن مان ڪوبه نه

(viii) $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ مساوات جو _____ نمونو آهي.

- (a) سگهن واري مساوات (b) مولتي مساوات
(c) باهمي مساوات (d) (Reciprocal) هن مان ڪوبه نه
(ix) $4x^2 - 16 = 0$ جو حل سيٽ آهي.

- (a) $\{\pm 4\}$ (b) $\{4\}$ (c) $\{+2\}$ هنن مان ڪوبه نه
(x) $2x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 3x + 2 = 0$ مساوات نموني جي چئبي.
(a) باهمي مساوات (b) مولتي مساوات
(c) سگهن واري مساوات (d) هن مان ڪوبه نه

3. غلط ۽ صحيح جواب

- هيٺيان جملا غور پڙهو ۽ صحيح بيان لاءِ "T" ۽ "F" تي گولن پايو.
(i) هر ٻه درجي مساوات جنهن وسيلي حل ڪري سگهجي ٿي. T/F
(ii) هر ٻه درجي مساوات کي ٻه جزا هوندا آهن. T/F
(iii) ٽن درجي مساوات کي ٽي جزا هوندا آهن. T/F
(iv) $ax^2 + bx + c = 0$ کي ٻه درجي مساوات x واري آهي. جيڪڏهن
 $a=0$ ۽ حقيقي عدد آهن. T/F
(v) ٻاهر يان جزا مساوات کي مطمئن ڪن ٿا. T/F
(vi) ٻاهر يان جزا مساوات کي مطمئن نٿا ڪن. T/F
(vii) ٻه درجي مساوات ۾ بدلجندڙ جو وڌي ۾ وڌو سگهه نما 2 آهي. T/F

خلاصو

گهڻو رقمي مساوات جنهن ۾ بدلجندڙ جو درجو ٻه هجي ان کي ٻه درجي مساوات چئبو آهي.

معيارى صورت چئبو آهي. $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, a, b, c حقيقي عدد هنن ته ان کي ٻه درجي مساوات جي

ٻه درجي مساوات، $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ جو ٻه درجي فارمولا $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

سگهن واري مساواتن ۾ بدلجندڙ تي سگهه نما هوندا آهن.

هڪ مساوات جيڪا مول جي نشاني هيٺ اظهار هجي ته ان کي مولتي مساوات چئبو آهي.

يڪسان ٽڪنڊا

Congruent Triangles

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

هيٺين سڌيانن کي شامل نتيجن سان گڏ سمجهي سگهندا ۽ انهن کي استعمال ڪري لاڳاپيل حساب حل ڪندا.

◆ جيڪڏهن ڪن به ڏنل مطابقت ۾ هڪ ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ۽ ڪو به هڪ پاسو ٻي ٽڪنڊي جي واسطيدار ڪنڊن ۽ پاسي سان يڪسان هجن ته ٻئي ٽڪنڊا يڪسان ٿيندا.


◆ جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي ٻه ڪنڊون يڪسان هجن ته سندس سامهون وارا پاسا به يڪسان هوندا.

◆ جيڪڏهن ٻن ٽڪنڊي ڏنل موافقت ۾ هڪ ٽڪنڊي جائز پاسا، ٻئي ٽڪنڊي جي واسطيدار تنهنجي پاسن سان يڪسان هجن ته، ٻئي ٽڪنڊا پاڻ ۾ يڪسان يا ساڳيا هوندا.

◆ جيڪڏهن ٻن گوني ڪنڊ ٽڪنڊن جي موافقت ۾ هڪ ٽڪنڊي جو هٻاڻينيو ۽ هڪ پاسي، ٻي ٽڪنڊي جي واسطيدار هٻاڻينيو ۽ ٻي پاسي سان يڪسان آهي ته ٽڪنڊا پاڻ ۾ يڪسان هوندا.

تعارف

هڪ ٽڪنڊي جا ڇهه حصا هوندا آهن، ٽي پاسا ۽ ٽي ڪنڊون. جيڪڏهن اسان کي ٻه ٽڪنڊا ABC ۽ PQR مليل هجن، اسان انهن جي چوٽين کي ملائي، هنن ٽڪنڊن جي ڪنڊن ۽ پاسن ۾ (1-1) موافقت يا مطابقت، ڇهن مختلف طريقن سان قائم ڪري سگهون ٿا.



ٽڪنڊن $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle PQR$ ۾ مطابقت جو مطلب

$$\angle A \leftrightarrow \angle P \quad (\text{i}) \quad (\angle A \text{ جي مطابقت } \angle P \text{ سان})$$

$$\angle B \leftrightarrow \angle Q \quad (\text{ii}) \quad (\angle B \text{ جي مطابقت } \angle Q \text{ سان})$$

$$\angle C \leftrightarrow \angle R \quad (\text{iii}) \quad (\angle C \text{ جي مطابقت } \angle R \text{ سان})$$

$$\overline{AB} \leftrightarrow \overline{PQ} \quad (\text{iv}) \quad (\overline{AB} \text{ جي مطابقت } \overline{PQ} \text{ سان})$$

$$\overline{BC} \leftrightarrow \overline{QR} \quad (\text{v}) \quad (\overline{BC} \text{ جي مطابقت } \overline{QR} \text{ سان})$$

$$\overline{CA} \leftrightarrow \overline{RP} \quad (\text{vi}) \quad (\overline{CA} \text{ جي مطابقت } \overline{RP} \text{ سان})$$

9.1 يڪسان ٽڪنڊا




جسامت (Size) ۽ شڪل (Shape) جي هڪ جهڙائي کي رياضي ۾ يڪسان چئبو آهي.

مليل تصوير ٻه ٻن ڪارين جا مختلف رنگ ۽ بيهڪ (Position) آهي. پر انهن جي جسامت ۽ شڪل هڪ جهڙي آهي. هن ٻن ڪارن کي يڪسان چئبو آهي. جيڪڏهن اسان هڪ ڪارجي تصوير ٻي جي مٿان رکنداسين ته اهي هڪ ٻئي کي اورليپ (هڪ جهڙائي ڪري) ڪنديون


سرگرمي

تلاش ڪرڻ

ڇا توهان کي ٻه يڪسان تصويرون يا شيون پنهنجي ڪلاس يا اسڪول ۾ سڃاڻپ ڪري سگه ٿا. انهن يڪسان تصويرون جي فهرست ٺاهي تصوير ٺاهيو يا تصوير ڪيو.



ٻن ٽڪنڊن کي يڪسان چئبو جيڪڏهن سندن موافق (واسطيدار) ڪنڊون ۽ پاسا يڪسان آهن.



هي ٻه ٽڪنڊا ABC ۽ DEF يڪسان آهن جن کي هن طرح لکو

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

ٽڪنڊن $\triangle ABC$ ۽ $\triangle DEF$ جون موافق پاسا ۽ ڪنڊون ماپ ۾ برابر آهن.

نوٽ: هيٺيان نتيجا کارآمد آهن.

(i) پنهنجو پاڻ سان يڪسان (Identity Congruence) جيڪو $\triangle ABC \cong \triangle ABC$

(ii) مطابقت جي خاصيت (Symmetric Property) جيڪو $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ته پوءِ


$$\triangle PQR \cong \triangle ABC$$

(iii) يڪسانيت جي متعدي خاصيت (Transitive Property of Congruence)

$$\triangle ABC \cong \triangle PQR \text{ ۽ } \triangle PQR \cong \triangle DEF, \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

9.1.1 سڌيان

جيڪڏهن ڪن ٻن ٽڪنڊن جي ڏنل مطابقت ۾ هڪ ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ۽ هڪ پاسو، ٻي ٽڪنڊي جي واسطيدار ڪنڊن ۽ پاسي سان يڪسان هجن ته ٻئي ٽڪنڊا يڪسان هوندا.



مليل: $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle PQR$

$$\angle B \cong \angle Q, \overline{mBC} \cong \overline{mQR} \text{ ۽ } \angle A \cong \angle P$$

گهربل: $\triangle ABC \cong \triangle PQR$


جوڙجڪ: فرض ڪريو ته $\overline{AB} \not\cong \overline{PQ}$ ته پوءِ $\overline{PQ}$ تي هڪ ٽپڪو P' وٺو ته جيئن $\overline{AB} \cong \overline{P'Q}$

ثابتي

دليل / سبب	بيان
i. مليل ii. مليل	$\Delta ABC \leftrightarrow \Delta PQR$ جي مطابقت ۾ i. $\angle A \cong \angle P$ ii. $\angle B \cong \angle Q$ ∴ $\angle C \cong \angle R$
مفروضو ٻه ڪنڊون ٻنهي ٽڪنڊن جو برابر آهن	جيڪڏهن $\overline{BA} \not\cong \overline{QP}$ ته $\overline{QP}$ کي وڌائي يا $\overline{QP}$ تي ٽپڪو P' اهڙي طرح وٺو ته $\overline{QP'} \cong \overline{BA}$ ۽ $\Delta P'QR$ جي مطابقت ۾ In $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta P'QR$ $\overline{BC} \cong \overline{QR}$ $\angle B \cong \angle Q$ $\overline{BA} \cong \overline{QP'}$ تنهنڪري $\Delta ABC \cong \Delta P'QR$ ∴ $\angle C \cong \angle QRP'$ پر $\angle C \cong \angle QRP$ ∴ $\angle QRP' \cong \angle QRP$ اهو صرف تڏهن ممڪن آهي جڏهن P ۽ P' ٽپڪا هڪ ٻئي تي ٺهڪي اچن ۽ $\overline{RP'} \cong \overline{RP}$ $\overline{BA} \cong \overline{QP}$ تنهنڪري ΔPQR ۽ ΔABC جي مطابقت ۾ i. $\overline{BC} \cong \overline{QR}$ ii. $\angle B \cong \angle Q$ iii. $\overline{BA} \cong \overline{QP}$ تنهنڪري $\Delta ABC \cong \Delta PQR$
i. مليل ii. مليل iii. مفروضي طور S.A.S مفروضو	
ثابت ڪيل (2) ۾ يڪسانيت جي متعددي خاصيت ڪنڊ جي بناوت جو موضوع	
P ۽ P' جو هڪ ٻئي تي ٺهڪي اچڻ	
i. مليل ii. مليل iii. ثابت ڪيل S.A.S موضوع	

Q.E.D.


مشق 9.1



1. مليل شڪل ۾

$$m\overline{AB} = m\overline{CB} \text{ ۽ } \angle A \cong \angle C$$

ته ثابت ڪريو ته $\triangle ABD \cong \triangle CBE$




2. ڪنڊ جي اڌ ڪنڊڙ واري ليڪ تي ڪنهن

ٽپڪي کان، ڪنڊ جي يا نهن تي

عمود ٺهيل آهن. ثابت ڪريو ته هي

عمود ماپ ۾ برابر آهن




3. مليل شڪل ۾ اسان کي $\triangle ACE \cong \triangle BDE$

مليل آهن جيئن $m\overline{AC} = m\overline{BD} = 3 \text{ cm}$

$$\angle A = (3x + 1)^\circ, m\angle E = (3y - 2)^\circ$$

$$\text{۽ } m\angle B = (x + 35)^\circ$$

ته x, y جون قيمتون معلوم ڪريو.



4. مليل شڪل ۾ $\triangle DEF \cong \triangle PQR$

تنهنڪري

$$\text{س. م } m\overline{DE} = (6x + 1)$$

$$\text{س. م } m\overline{EF} = 8$$

$$\text{۽ س. م } m\overline{RQ} = (5y - 7)$$

$$\text{س. م } m\overline{PQ} = (10x - 19)$$

ته x ۽ y جون قيمتون معلوم ڪريو.

9.1.2 سڌيان

جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون يڪسان هجن ته انهن ڪنڊن جي سامهون وارا پاسا به يڪسان ٿيندا.

مليل: $\triangle ABC$ ۾


$$\angle B \cong \angle C$$

گهريل: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$

جوڙجڪ: $\angle A$ جو اٽڪندڙ $\overline{AD}$ ڪيو.

جيڪو $\overline{BC}$ کي ٽڪي D تي ملي.

ثابتي





بيان	دليل / سبب
موافقت $\triangle ADE \leftrightarrow \triangle ADC$	i. مليل
i. $\overline{AB} \cong \overline{AC}$	ii. جوڙجڪ
ii. $\angle 1 \cong \angle 2$	iii. مشترڪ (پنهنجو پاڻ سان يڪسان)
iii. $\overline{AD} \cong \overline{AD}$	S.A.S موضوع
تنهنڪري $\triangle ABD \cong \triangle ADC$	ٽڪنڊن جي يڪسانيت جي لحاظ کان
$m\angle B = m\angle C$	

Q.E.D

مشق 9.2

1. ABC هڪ ٽڪنڊو آهي، جنهن ۾ $m\angle A = 35^\circ$ ۽ $m\angle B = 100^\circ$ ، $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ آهي. ثابت ڪريو ته $\triangle BDC$ ٻيڙ پاسو ٽڪنڊو آهي.
2. ٽڪنڊي جي ڪنهن ڪنڊ جو اٽڪندڙ اسامهون واري پاسي ته عمود آهي ته اهو ٽڪنڊو هڪ ٻيڙ پاسو ٽڪنڊو آهي.
3. ABC هڪ ٽڪنڊو آهي. جنهن ۾ $m\angle A = 25^\circ$ ، $m\angle B = 45^\circ$ ۽ $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ مليل آهي. ثابت ڪريو ته $\triangle BDC$ هڪ ٻيڙ پاسو ٽڪنڊو آهي.

9.1.3 سڌيان



ٻن ٽڪنن جي موافقت ۾ جيڪڏهن هڪ ٽڪنڊي جا ٽي پاسا ٻئي ٽڪنڊي جي واسطيدار تنهي پاسن سان يڪسان هجن ته ٻئي ٽڪنڊا يڪسان ٿيندا.

مليل: $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$ ۾

$$\overline{CA} \cong \overline{FD} \text{ ۽ } \overline{BC} \cong \overline{EF}, \overline{AB} \cong \overline{DE}$$

گهربل: $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$

جوڙجڪ: فرض ڪريو ته پاسو $\overline{BC}$ سڀني پاسن کان وڏو آهي $\triangle ABC$ ته $\triangle GEF$ ناهيو اهڙي طرح جيئن

$$\overline{EG} \cong \overline{BA} \quad (\text{iii}) \quad \angle FEG \cong \angle B \quad (\text{ii}) \quad \text{ٽپڪو G (i)}$$

D کي G سان ملايو.

ثابتي

دليل / سبب	بيان
i. مليل	مطابقت $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle GEF$ ۾
ii. جوڙجڪ	i. $\overline{BC} \cong \overline{EF}$
iii. جوڙجڪ	ii. $\angle B \cong \angle GEF$
S.A.S. موضوع	iii. $\overline{BA} \cong \overline{GE}$
ٽڪنن جي يڪسانيت	$\therefore \triangle ABC \cong \triangle GEF$ تنهنڪري
مليل	$\therefore \overline{AC} \cong \overline{GF} \text{ ۽ } \angle A \cong \angle G$
متعدي خاصيت	$\overline{DF} \cong \overline{AC}$ پر
سامهون وارا پاسا يڪسان آهن	$\therefore \overline{GF} \cong \overline{DF}$
$\overline{EG} \cong \overline{BA} \cong \overline{ED}$	$\therefore \triangle DEG, m\angle 1 = m\angle 3$

$$\overline{DF} \cong \overline{GF}$$

مساوات جي جوڙ جي خاصيت

$$m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle D$$

$$m\angle 3 + m\angle 4 = m\angle G$$

مٿي ثابت ٿيل

متعدي خاصيت

i. مليل

ii. مٿي ثابت ٿيل

iii. مليل

S.A.S موضوع

ساڳي طرح $m\angle 2 = m\angle 4$ ۾ $\triangle GFE$

انهي ڪري $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 3 + m\angle 4$

$$m\angle D = m\angle G \text{ يا}$$

$$m\angle G = m\angle A \text{ پر}$$

$$\therefore m\angle A = m\angle D$$

مطابقت $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$ ۾

$$\overline{AB} \cong \overline{DE} \quad .i$$

$$\angle A \cong \angle D \quad .ii$$

$$\overline{AC} \cong \overline{DF} \quad .iii$$

ته پوءِ $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

Q.E.D

شامل نتيجو:

ٽپور پاسي ٽڪنڊي جون ڪنڊون ساڳي ۾ برابر هونديون آهن.

مشق 9.3

1. ABC هڪ ٽپور پاسو ٽڪنڊو آهي. D ان جي بنياد $\overline{BC}$ جي وچ وارو ٽپڪو آهي،

ثابت ڪريو ته $\overline{AD}$ ، اڌڪنڊو $\angle A$ کي ۽ $\overline{AD} \perp \overline{BC}$

2. مشترڪ بنياد جي ساڳي پاسي ABC ۽ DBC ۾ ٽپور پاسا ٽڪنڊا آهن ثابت ڪريو


ته $\overline{AD}$ عمودي اڌڪنڊڙ آهي $\overline{BC}$ جو.

3. PQRS هڪ چورس آهي. جنهن ۾ ترتيبوار $\overline{PQ}$ ، $\overline{QR}$ ۽ $\overline{RS}$ پاسن جا وچيان ٽپڪا

x, y ۽ z آهن ثابت ڪريو ته $\triangle PXY \cong \triangle SZY$

9.1.4 سڌيان

جيڪڏهن ٻن گوني ڪنڊ ٽڪنڊن جي موافقت ۾ هڪ ٽڪنڊي جو هٻاٽينيوڙ ۽ هڪ پاسو، ٻئي ٽڪنڊي هٻاٽينيوڙ ۽ واسطيدار ٻي پاسي سان يڪسان آهي ته ٽڪنڊا پاڻ ۾ يڪسان ٿيندا.



مليل: گوني ڪنڊ ٽڪنڊن $\triangle ABC$ ۽ $\triangle DEF$ جي مطابقت ۾ (گوني ڪنڊ) $\angle B \cong \angle E$ ، (هٻاٽينيوڙ) $\overline{AC} \cong \overline{DF}$ ۽ $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ پاسو.

گهريل: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

جوڙجڪ: $\overline{DE}$ کي ٽپڪي G تائين وڌايو، ته جيئن $\overline{EG} \cong \overline{AB}$. ٽپڪن F ۽ G کي پاڻ ۾ ملايو ثابتي:

دليل / سبب	بيان
سپليمنٽري ڪنڊن جو موضوع مليل	$m\angle DEF + m\angle GEF = 180^\circ$
$\therefore 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$	$m\angle DEF = 90^\circ$ پر
(i) جوڙجڪ	$\therefore m\angle GEF = 90^\circ$ ته پوءِ
(ii) هر هڪ گوني ڪنڊ آهي	$\triangle GEF \leftrightarrow \triangle ABC$
(iii) مليل	$\overline{GE} \cong \overline{AB}$.i
S.A.S. $\cong$ S.A.S.	$\angle GEF \cong \angle ABC$.ii
يڪسان پاسن جون مخالف ڪنڊون	$\overline{EF} \cong \overline{BC}$.iii
هر هڪ $\triangle G$ جي يڪسان آهي.	$\therefore \triangle GEF \cong \triangle ABC$
مطابقت	انڪري $\overline{FG} \cong \overline{FG}$ ۽ $\angle G \cong \angle A$
(i) ثابت ٿيل	$\therefore \overline{FG} \cong \overline{DF}$
(ii) گوني ڪنڊ	$\triangle DFG, \angle D \cong \angle G$
(iii) مليل	$\therefore \angle D \cong \angle A$
A.A.S. $\cong$ A.A.S.	$\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$
	$\angle A \cong \angle D$.i
	$\angle ABC \cong \angle DEF$.ii
	$\overline{AC} \cong \overline{DF}$.iii
	$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ تنهنڪري

Q.E.D

مشق 9.4

1. ثابت ڪريو ته
ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي جي بنياد جي چوٽي کان عمود سامهون پاسي تي يڪسان هوندا آهن.
2. ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٽڪنڊي جي ڪنڊ جو عمودي اڌڪنڌڙ، ان جي سامهون پاسن کي اڌواڙ ڪري ته اهو ٽڪنڊو ٻيڙ پاسو ٽڪنڊو ٿيندو.
3. ثابت ڪريو ته ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي جا مڌيان يڪسان ٿيندا آهن.
4. ثابت ڪريو ته ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي جي بنياد کي اڌواڙ ڪنڌڙ مڌيان، ٽڪنڊي جي چوٽي واري ڪنڊ کي اڌواڙ ڪندا ۽ بنياد تي عمود آهن.
5. ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ٽي عمود يڪسان آهن ته ٽڪنڊو ٻيڙ پاسو آهي.

مشق ورڃايو 9



2. هيٺين مان صحيح ۽ غلط بيانن جي سڃاڻپ ڪريو.
 - (i) چوڪنڊي ۾ سڀني ڪنڊن جي ماپ جو جوڙ 360° آهي.
 - (ii) ٽڪنڊي ۾ سڀني ڪنڊن جي ماپ جو جوڙ 270° آهي.
 - (iii) ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي ۾ ڪنڊون ساڳي ماپ جون هونديون آهن.
 - (iv) ٽڪنڊي ۾ ٻه گوني ڪنڊ ٽڪنڊا آهن.
 - (v) ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي ۾ موافقت ۾ ڪنڊون ۽ موافقت ۾ پاسا ماپ ۾ برابر هوندا آهن.
3. جملي درست ڪرڻ لاءِ خال ڀريو.
 - (i) $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$ ته پوءِ $\overline{AC}$ جي موافقت آهي _____.
 - (ii) $\triangle KLM \leftrightarrow \triangle PQR$ ته پوءِ $\angle MKL$ جي موافقت آهي _____.
 - (iii) ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي ۾ بنيادي ڪنڊون _____ آهن.
 - (iv) جيڪڏهن ٽڪنڊي جي هر هڪ ڪنڊ جي ماپ 60° آهي ته ٽڪنڊو _____ آهي.
 - (v) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾، گوني ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو _____ چئبو آهي.
 - (vi) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي، سوڙ هيٺ ڪنڊن جي ماپ جو جوڙ _____ آهي.



4. درست جواب جي واسطيدار کي a, b, c ۽ d گول پاڻيو.
- (i) هيٺين مان ڪهڙي ٻٽ ٽڪنڊن جي يڪسانيت لاءِ مناسب صورت نه آهي.
 $H.S.H \cong H.S.H$ (b) $A.S.A \cong A.S.A$ (a)
 $A.A.A \cong A.A.A$ (d) $S.A.A \cong S.A.A$ (c)
- (ii) ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾ جيڪڏهن $\angle A \cong \angle B$ ته _____ ڪنڊ جو اڌواڌ ڪندڙ ٽڪنڊي کي ٻن يڪسان ٽڪنڊن ۾ تقسيم ڪندو.
 $\angle A$ (a) $\angle B$ (b) $\angle C$ (c) ڪنڊن ڪا به هر (d)
- (iii) _____ جي اريب، ان کي ٻن يڪسان ٽڪنڊن ۾ تقسيم نه ڪندي آهي.
 مستطيل (a) $\angle C$ (b) $\angle B$ (c) $\angle A$ (d) $\angle C$
- (iv) سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊي ۾، ڪيتريون ڪنڊون سوڙهيون هونديون آهن.
 1 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

خلاصو



- هن يونٽ ۾ اسان هيٺيان سڌيان بيان ڪري ثابت ڪيا آهن.
- جيڪڏهن ڪن به ڏنل مطابقت ۾ هڪ ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ۽ ڪو به هڪ پاسو ٻي ٽڪنڊي جي واسطيدار ڪنڊن ۽ پاسي سان يڪسان هجن ته ٻئي ٽڪنڊا يڪسان ٿيندا. ($A.S.A. \cong A.S.A$)
 - جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي ٻه ڪنڊون يڪسان هجن ته سندس سامهون وارا پاسا به يڪسان هوندا.
 - جيڪڏهن ٻن ٽڪنڊي ڏنل موافقت ۾ هڪ ٽڪنڊي ڄاڻي پاسا، ٻئي ٽڪنڊي جي واسطيدار تنهي پاسن سان يڪسان هجن ته، ٻئي ٽڪنڊا پاڻ ۾ يڪسان يا ساڳيا هوندا. ($S.S.S \cong S.S.S$)
 - جيڪڏهن ٻن گوني ڪنڊ ٽڪنڊن جي موافقت ۾ هڪ ٽڪنڊي جو هٿيائينيو ۽ هڪ پاسي، ٻي ٽڪنڊي جي واسطيدار هٿيائينيو ۽ ٻي پاسي سان يڪسان آهي ته ٽڪنڊا پاڻ ۾ يڪسان هوندا.
 - ٻن ٽڪنڊن کي يڪسان چئبو آهي، جيڪڏهن انهن ۾ مطابقت موجود هجي اهڙي طرح ته سڀ مطابقت رکندڙ پاسا ۽ ڪنڊون يڪسان آهن. ($S.S.S$)


يونٽ 10

پورو چوٽ چوڪنڊا ۽ ٽڪنڊا (Parellelogram And Triangles)

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ هيٺين سڌيانن کي شامل نتيجن سان گڏ سمجهي سگهندا ۽ انهن کي استعمال ڪري لاڳاپيل حساب حل ڪندا.
(a) هڪ پورو چوٽ چوڪنڊي ۾
 - ◆ آمهون سامهون پاسا يڪسان آهن.
 - ◆ آمهون سامهون واريون ڪنڊون يڪسان آهن.
 - ◆ اريب هڪ ٻئي کي اڏواڻ ڪندا آهن.
- (b) جيڪڏهن ڪنهن چوڪنڊي جا ٻه آمهون سامهون وارا پاسا يڪسان ۽ پورو چوٽ آهن ته اهو چوڪنڊو پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.
- (c) جيڪڏهن ڪوليڪٽر، ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جي وچين ٽپڪن کي پاڻ ۾ ملائي ٿو ته اهو ٽڪنڊي جي ٽئين پاسي جي پورو چوٽ هوندو ۽ ماپ ۾ انهي جي اڌ جيترو هوندو.
- (d) ٽڪنڊي جا مڌيان هڪ ٽپڪي تي ملن ٿا ۽ اهو ٽپڪو هر مڌيان کي پورن ٽن حصن ۾ ورهائي ٿو.
- (e) جيڪڏهن ٽي يا ٽن کان وڌيڪ پورو چوٽ ليڪون هڪ ڪپينڊڙ ليڪ کي يڪسان ٽڪرن ۾ ورهائن ته، اهي ليڪون ڪنهن ٻي ڪپينڊڙ ليڪ کي پڻ يڪسان ٽڪرن ڪرڻ ۾ ورهائينديون.



تعارف:


گذريل ڪلاس ۾ شاگردن ڪيترن ئي قسمن جي گهڻ پاسن واريون شڪلون جهڙڪ ٽڪنڊا، پورو چوٽ چوڪنڊو، چورس، مستطيل، رامبس ۽ ٽريپيزيم وغيره بابت سکيو ۽ ٺاهيون آهن ۽ انهن جي پاسن ۽ ڪنڊن جي يڪسانيت بابت پڻ سکيو آهي. هن يونٽ ۾ اسان پورو چوٽ چوڪنڊي ۽ ٽڪنڊن سان تعلق رکندڙ سڌيان بابت سکنداسين.

10.1 پورو چوٽ چوڪنڊا ۽ ٽڪنڊا:

10.1.1 سڌيان

پورو چوٽ چوڪنڊي ۾

- آڻهون سامهون پاسا يڪسان آهن.
- آڻهون سامهون واريون ڪنڊون يڪسان آهن.
- اريب هڪ ٻئي کي اڌواڻ ڪندي.



شڪل (i)

شڪل (ii)

مليل: $m \parallel PQRS$

گهربل: (1) $\overline{PQ} \cong \overline{RS}; \quad \overline{PS} \cong \overline{QR}$

(2) $\angle P \cong \angle R; \quad \angle S \cong \angle Q$

(3) اريب PR ۽ SQ هڪٻئي کي ٽڪي O تي اڌواڻ ڪن ٿيون.

جوڙجڪ:

مليل شڪل (i) ۾ Q ۽ S کي ملايو.

ثابتي

بيان	سبب / دليل
شکل (i) ۾ (1) $\overline{SR} \parallel \overline{PQ}, \overline{SQ}$ $m\angle 1 = m\angle 2$ ساڳي طرح تنهنڪري $m\angle 3 = m\angle 4$ $\therefore m\angle 1 + m\angle 3 = m\angle 2 + m\angle 4$ $\angle S \cong \angle Q$ يا ساڳي طرح تنهنڪري $\angle P \cong \angle R$ ته آهون سامهون ڪنڊون يڪسان آهن (2) $\Delta SPQ \leftrightarrow \Delta QRS$ $\angle 1 \cong \angle 2$ and $\angle 3 \cong \angle 4$ $\overline{SQ} \cong \overline{SQ}$ $\therefore \Delta SPQ \cong \Delta QRS$ $\therefore \overline{PQ} \cong \overline{RS}$ and $\overline{PS} \cong \overline{QR}$ ته آهون سامهون پاسا يڪسان آهن شکل (3) $\Delta SOQ \leftrightarrow \Delta ROS$ $\angle 1 \cong \angle 2$ $\angle POQ \cong \angle SOR$ $\overline{PQ} \cong \overline{SR}$ $\Delta POQ \cong \Delta ROS$ $\therefore$ $\overline{PO} \cong \overline{OR}$ and $\overline{OQ} \cong \overline{OS}$ $\therefore$ $\therefore \overline{RS}$ ۽ $\overline{PR}$ اريون هڪ ٻئي کي اڌواڪن ٿيون	متبادل ڪنڊون $\overline{SR} \parallel \overline{PQ}$ جوڙ جي خاصيت جو موضوع ڪنڊن جو جوڙ جو موضوع ساڳيو طريقو مٿي ڏنل (1) ۾ ثابت ٿيل ٻنهي ۾ مشترڪ پ. ڪ. پ. ڪ. پ. ڪ. (1) ۾ ثابت ٿيل چوٽي واريون مخالف ڪنڊون. (2) ۾ مٿي ثابت ٿيل پ. ڪ. پ. ڪ. پ. ڪ. ٽڪنڊن جي يڪسانيت سان


Q.E.D

مشق 10.1

1. پورو چوٽ چوڪنڊي جي ڪن به ٻن آهون سامهون وارن پاسن جي وچين ٽيڪن کي ملائيندڙ ليڪ انهيءَ جي ٻين پاسن سان پورو چوٽ آهي.
2. پورو چوٽ چوڪنڊي جي ڪنهن به پاسي ته ٺهندڙ اندريون ڪنڊون سڀليمنتري هونديون آهن.
3. ثابت ڪريو ته پورو چوٽ چوڪنڊي جي ساڳي پاسي وارين ٻن ڪنڊن جا اڌواڙ ڪنڌڙ، هڪ ٻئي کي گوني ڪنڊ ٿي ڪپيندا.
4. جيڪڏهن چوڪنڊي جون ارييون هڪ ٻئي کي اڌواڙ ڪن ته، اهو پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.
5. پورو چوٽ چوڪنڊي جي ڪنهن به پاسي جون نسبتي ڪنڊون برابر آهن.

سڌيان 10.1.2

جيڪڏهن ڪنهن چوڪنڊي جا ٻه آهون سامهون وارا پاسا يڪسان ۽ پورو چوٽ آهن ته اهو چوڪنڊو پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.



مليل: چوڪنڊي ABCD،
 $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ ۽ $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
 گهربل: ABCD، هڪ چوڪنڊو آهي
 جوڙجڪ: ٽيڪا B ۽ D ملايو.

ثابتي

بيان	سبب / دليل
$\overline{AB} \cong \overline{CD}, \overline{BD}$ $\angle ABD \cong \angle CBD$ ۽ $\therefore$ $\triangle ADB \leftrightarrow \triangle CBD$ $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ (i) $\angle ABD \cong \angle CDB$ (ii) $\overline{BD} \cong \overline{BD}$ (iii) $\triangle ADB \cong \triangle CBD$ $\therefore$ $\angle 1 \cong \angle 2$ $\therefore$ پَر هي متبادل ٿڪندا هن $\overline{AD} \cong \overline{BC}$ $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ $ABCD$ is a $\parallel^m$	متبادل ڪندون (i) مليل (ii) مٿي ثابت ٿيل (iii) مشترڪ پ. ڪ. پ. ڪ. پ. ڪ. مليل متبادل ڪندون


Q.E.D

مشق 10.2

1. ثابت ڪريو ته هڪ چوڪنڊو، پورو چوٽ چوڪنڊو آهي، جيڪڏهن ان جون آمهون سامهون واريون ڪنڊون يڪسان آهن.
2. ثابت ڪريو ته هڪ چوڪنڊو، پورو چوٽ چوڪنڊو آهي، جيڪڏهن ان جون اريون هڪ ٻئي کي اڏواڙ ڪن ٿيون.
3. جيڪڏهن ڪنهن چوڪنڊي جي سامهون وارن پاسن جا ٻئي جوڙ پاڻ ۾ يڪسان هجن ته اهو چوڪنڊو پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.
4. جيڪڏهن هڪ چوڪنڊو پورو چوٽ چوڪنڊو آهي، ته ان جون اريون به يڪسان ٿڪندا ناهينديون.
5. جيڪڏهن ڪنهن چوڪنڊي جي هر پاسي کان ٺهندڙ ڪنڊون سڀليمنٽري آهن ته اهو پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.

سٽيان 10.1.3

جيڪڏهن ڪو ليڪ ٽڪر ڪنهن چوڪنڊي جي ٻن پاسن جي وچين ٽپڪن کي پاڻ ۾ ملائي ٿو ته اهو ٽڪنڊو جي ٽئين پاسي جي پورو چوٽ هوندو ۽ ماپ ۾ انهيءَ جي اڌ جيترو هوندو.



مليل: ٽڪنڊي ABC ۾ پاسن $\overline{AB}$ ۽ $\overline{AC}$ جا وچيان ٽپڪا ترتيبوار Q ۽ P آهن، ته $\overline{PQ}$ ، ΔABC ليڪ ٽڪر انهن کي ملائي ٿو.

گهريل: $m\overline{PQ} = \frac{1}{2} m\overline{BC}$ ۽ $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$

جوڙجڪ: $\overline{PQ}$ تي ٽپڪو D اهڙي طرح کڻو جو $\overline{QD} \cong \overline{PQ}$ ٽپڪن C ۽ D کي ملائي.

ثابتي

بيان	سبب / دليل
$\Delta APQ \leftrightarrow \Delta CDQ$	(i) جوڙجڪ
$\overline{PQ} \cong \overline{QD}$ (i)	(ii) چوٽي واريون ڪنڊون
$\angle 1 \cong \angle 2$ (ii)	(iii) مليل
$\overline{AQ} \cong \overline{QC}$ (iii)	
$\Delta APQ \cong \Delta CDQ \therefore$	Δs ٽڪنڊن جي يڪسانيت سان
$\overline{AP} \cong \overline{CD}$ ۽ $\angle 3 \cong \angle 4 \therefore$	مليل
$\overline{PB} \cong \overline{AP}$ پر	هرهڪ $\overline{AP}$ جي يڪسان آهي.
$\overline{PB} \cong \overline{CD} \therefore$	متبادل ڪنڊن جي وصف مطابق
$\angle s$ متبادل آهن $\angle 4$ جي $\angle 3$	متبادل ڪنڊون يڪسان آهن
$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ i.e. $\overline{PB} \parallel \overline{CD} \therefore$	
$\overline{PBCD} \parallel^m \therefore$	S جي سامهون پاسا پورو چوٽ ۽ يڪسان آهن
$\overline{PD} \parallel \overline{BC}$ ۽ $\overline{PD} \cong \overline{BC} \therefore$	
$\overline{PQ} \cong \overline{BC} \therefore$	$\overline{PQ}$ ۽ $\overline{PD}$ ساڳي ليڪ تي آهن ۽
$\therefore m\overline{PQ} = \frac{1}{2} m\overline{BC}$	$m\overline{PQ} = \frac{1}{2} m\overline{PD}$

Q.E.D

مشق 10.3

1. جيڪڏهن ڪوليڪٽر ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جي وچين ٽپڪن کي پاڻ ۾ ملائي ٿو، ته اهو ٽئي پاسي جي پورو چوٽ هوندو ۽ ان جي ڊيگهه 4 س. م آهي ته ٽي پاسي جي ڊيگهه ڪيتري ٿيندي.
2. ثابت ڪريو ته چوڪنڊي جي آمهون سامهون وارن پاسن جا اڌڪنڌڙ ليڪٽر هڪ ٻئي کي اڌواڌ ڪن ٿا.
3. چوڪنڊي جي چئني پاسن جي وچين ٽپڪن کي ترتيبوار هڪ ٻئي سان ملائڻ جيڪو ننڍو چوڪنڊو ٺهندو سو پورو چوٽ هوندو.
4. ثابت ڪريو ته ڪوليڪٽر ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي وچئين ٽپڪي مان گذري بي پاسي جو پورو چوٽ ٿئي ته اهو ٽيئن پاسي کي پڻ اڌواڌ ڪندو.
5. ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي ٽنهي پاسن جي وچين ٽپڪن کي پاڻ ۾ ملائڻ سان جيڪي چار ننڍا ٽڪنڊا ٺهن ٿا، سڀي پاڻ ۾ يڪسان آهن.

سڌيان 10.1.4


ٽڪنڊي جا مڌيان هڪ ٽپڪي تي ملن ٿا ۽ اهو ٽپڪو هر مڌيان کي پورن ٽن حصن ۾ ورهائي ٿو.

مليل: $\triangle ABC$ جنهن ۾ ٻه مڌيان $\overline{BE}$ ۽ $\overline{CF}$ ٽپڪي G تي ملن ٿا.

گهربل: (i) $\overline{AG}$ وڌائڻ سان $\overline{BC}$ کي D وٽ ڪٽي.

(ii) ٽپڪو G هر مڌيان کي پورن ٽن حصن ۾ ورهائي ٿو.


جوڙجڪ: $\overline{CH} \parallel \overline{EB}$ ٺاهيو، جيڪو $\overline{AD}$ سان پورو چوٽ هجي ۽ C وڌايل کي H ٽپڪي تي ملي ٽپڪن B ۽ H کي ملايو.



سبب / دليل	بيان
مليل جوڙجڪ سڌيان 10.1.3 جو عڪس	تڪنڊي ۾ $\triangle ACH$, $\overline{AE} \cong \overline{EC}$ ۽ $\overline{EG} \parallel \overline{CH}$ $\therefore \overline{AG} \cong \overline{GH}$ وري تڪنڊي $\triangle ABH$ ۾ $\overline{AG} \cong \overline{GH}$ $\overline{AF} \cong \overline{FB}$ $\overline{FG} \cong \overline{BH}$ تنهنڪري BGCH هڪ پورو چوٽ چوڪنڊو آهي. جنهن جون اريون $\overline{BC}$ ۽ $\overline{GH}$ هڪ ٻئي کي اڏواڏ ڪن ٿيون ته پوءِ $\overline{GH} \cong \overline{DH}$, $\overline{BD} \cong \overline{DC}$ $\triangle ABC$ مڌيان آهي $\overline{AD}$ ۽ $m\overline{AG} = m\overline{GH} = 2m\overline{GD}$ G ٽپڪو $\overline{AD}$ تي ٽن حصن ۾ ورهائيندڙ آهي ساڳي طرح اسان G کي $\overline{BE}$ ۽ $\overline{CF}$ کي ٽن حصن ۾ ورهائڻ وارو ٽپڪو پڻ ثابت ڪري سگهون ٿا.
مٿي نابل ٿيل مليل سڌيان 10.1.3 جو عڪس سڌيان 10.1.1 مطابق	
مٿي ثابت ٿيل آهي $\overline{BD} \cong \overline{DC}$ $\overline{GD} \cong \overline{DH} \Rightarrow m\overline{GH} = 2m\overline{GD}$ جيئن ته $\overline{AG}$ ٻيڻو آهي $\overline{GD}$ جو مٿين طريقي مطابق	

Q.E.D

مشق 10.4



سڌرائڻ (تنهي مڌيانن جي ملڻ وارو ٽپڪو) آهي
مليل شڪل ۾ $\overline{GD}$ جي ڊيگهه 2 س. م آهي ته پوءِ $\overline{AG}$ جي ڊيگهه معلوم ڪريو.

1. جيڪڏهن تڪنڊي جا ٽيڪي مڌيان يڪسان هجن ته ثابت ڪريو ته اهو ٽپور پاسو تڪنڊو آهي.


2. جيڪڏهن تڪنڊي $\overline{PB}$, $\overline{QC}$ جا ٽيئن مڌيان $\overline{RA}$ ۽ $\triangle PQR$ ٽپڪي G تي ملن ته ثابت ڪريو ته G

سڌرائڻ (تنهي مڌيانن جي ملڻ وارو ٽپڪو) آهي

3. مليل شڪل ۾ $\overline{GD}$ جي ڊيگهه 2 س. م آهي ته پوءِ $\overline{AG}$ جي ڊيگهه معلوم ڪريو.

سڌيان 10.1.5

جيڪڏهن ٽي يا ٽن کان وڌيڪ پورو چوٽ ليڪون، هڪ ڪپينڊڙ ليڪ کي يڪسان ٽڪرن ۾ ورهائڻ ته اهي ليڪون ڪنهن ٻي ڪپينڊڙ ليڪ کي پڻ يڪسان نڪرن




۾ ورهائينديون.
مليل: $\overleftrightarrow{AB}, \overleftrightarrow{CD}, \overleftrightarrow{EF}$ ، پورو چوٽ ليڪون آهن
 $\overleftrightarrow{GH}$ ليڪ، P اهڙي طرح ٽپڪن Q ۽ R تي
ڪپي ٿي جو $\overline{PQ} \cong \overline{QR}$
 $\overleftrightarrow{XY}$ بي ڪپينڊڙ ليڪ آهي جيڪا $\overleftrightarrow{AB}, \overleftrightarrow{CD}$ ۽ $\overleftrightarrow{EF}$ ٽپڪن M, N, O تي ڪپي ٿي.

گهريل: $\overline{NM} \cong \overline{NO}$
جوڙجڪ: $\overline{MJ}$ ۽ $\overline{NK}$ ليڪون GH جي پورو چوٽ ڪيو. جيڪي $\overline{CD}$ ۽ $\overline{EF}$ کي ٽپڪن
ثابتي

سبب / دليل	بيان
$\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$ مليل جوڙجڪ	چوڪنڊي $PMQJ$
آمهون سامهون وارا پاسا پورو چوٽ آهن	$\overline{PQ} \cong \overline{MJ}$
$\overline{QR} \parallel \overline{NK}$ and $\overline{QN} \parallel \overline{RK}$	$PMJQ$ is a $\square$
مليل	$\overline{PQ} \cong \overline{MJ}$
مساوات جي عبوري خاصيت	$PQJM$ هڪ پورو چوٽ چوڪنڊو آهي
هر هڪ $\overleftrightarrow{GH}$ جي پورو چوٽ آهي	ساڳي طرح $QRKN$ به هڪ پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.
نسبتي ڪنڊون	$\overline{QR} \cong \overline{NK}$
(i) مٿي ثابت ٿيل	$\overline{PQ} \cong \overline{QR}$
(ii) نسبتي ڪنڊون	$\overline{MJ} \cong \overline{NK}$
(iii) مٿي ثابت ٿيل	$\overline{MJ} \parallel \overline{NK}$
ڪ. ڪ. ڪ. پ	$\angle 1 \cong \angle 2$
ٽڪنڊن جي يڪسانيت مطابق	$\angle 3 \cong \angle 4$
	$\overline{MJ} \cong \overline{NK}$
	$\triangle MNJ \cong \triangle NOK$
	$\overline{MN} \cong \overline{NO}$

Q.E.D



مشق 10.5

ڪنهن ٽڪنڊي جي پاسن جي وچين ٽپڪن کي ملائڻ سان ٺهندڙ نئين ٽڪنڊي جون ڪنڊون، اصلوڪي ٽڪنڊي جي مساوي هونديون آهن. ٽرنسپيئر جي ٻنهي غير پورو چوٽ پاسن جي وچين ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر ٻين ٻنهي پاسن سان پورو چوٽ به آهي ۽ ماپ ۾ انهن جي جوڙ جي اڌ جيترو آهي. ڪنهن ٽڪنڊي جي چوٽيءَ کان، پاڻي تي نڪتل هر ليڪٽڪر کي ٻين پاسن جي وچين ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪرا پورا به ٽڪر ڪري ٿي.

ورجائيل مشق 10

خال ڀريو.

- (i) پورو چوٽ چوڪنڊي ۾ آمهون سامهون پاسا _____ آهن
 - (ii) پورو چوٽ چوڪنڊي ۾ آمهون سامهون ڪنڊون _____ آهن
 - (iii) ٽڪنڊي ۾ مڌيان _____ آهن
 - (iv) پورو چوٽ چوڪنڊي جو اريئون _____ هڪ ٻئي کي
 - (v) پورو چوٽ چوڪنڊي جو نسبتي ڪنڊون _____ آهن
 - (vi) ٽڪنڊي جا مڌيان _____ آهن
 - (vii) چوڪنڊي جي اندرين ڪنڊن جي ماپ جو جوڙ برابر _____ آهي
2. صحيح جواب تي ٽڪ لڳايو.

- (i) 1 چورس جون اريئون پاڻ ۾ هڪ ٻي سان _____ آهن
 - (a) عمود
 - (b) غير يڪسان
 - (c) يڪسان
 - (d) ٻئي (a) ۽ (c)
 - (ii) چوڪنڊي جي اندرين ڪنڊن جي ماپن جو جوڙ _____ آهي
 - (a) 2 گوني ڪنڊون
 - (b) 4 گوني ڪنڊون
 - (c) 3 گوني ڪنڊون
 - (d) ڪو به نه
- 3.

(iii) ٽڪنڊي ABC ۾ $\overline{AB}$ ۽ $\overline{AC}$ جي وچين ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر برابر آهي

3.5 س.م جي ته $m\overline{BC}$ _____

(a) 4.5 س.م (b) 5.5 س.م

(c) 6 س.م (d) 7 س.م

(iv) جا ٻه مڌيان $\overline{AB}$ ۽ $\overline{BE}$ پاڻ کي ٽپڪي G تي ڪپين ٿا. جيڪڏهن س.م $m\overline{GD} = 1.7$

ته پوءِ $m\overline{AG} =$ _____

(a) 2.7 س.م (b) 8.85 س.م

(c) 3.4 س.م (d) 5.1 س.م

(v) پورو ڇوٽ ڇوڪنڊي ABCD جي ڪنڊون $\angle A$ ۽ $\angle C$ جي ماپن جو جوڙ 130 آهي ته

$m\angle C$ پوءِ _____

(a) 25^0 (b) 50^0 (c) 65^0 (d) ڪابه نه

به نه

(vi) جيڪڏهن ڇوڪنڊي جي آلهون سامهون ڪنڊ جي ماپ برابر آهي ۽ انهن مان ڪابه

گوني ڪنڊن آهي ته ڇوڪنڊو ٿيندو _____

(a) چورس (b) پورو ڇوٽ ڇوڪنڊو

(c) ٽرئپيريم (d) مستطيل

(vii) سينٽرائڊ هڪ مشترڪ ٽپڪو آهي _____ کي ڪاٽ جو

(a) ٽڪنڊي جا مڌيان (b) پورو ڇوٽ ڇوڪنڊي جون اربينون

(c) ٽڪنڊي جي ڪنڊ جا اڌڪنڊڙ (d) ٽڪنڊي جو عمودي اڌڪنڊڙ

(viii) ڪنهن ٽڪنڊي جي مڌيان تي ٽپڪو آهي _____

(a) چوٽيءَ کان هڪ جيتري مفاصلي تي

(b) پاسي جي وچ واري نقطي کان هڪ جيتري مفاصلي تي



(c) عمود کان هڪ جيتري مفاصلي تي

(d) ڪو به نه



خلاصو

- پورو چوت چوڪنڊي جا آمهون سامهون پاسا يڪسان هوندا آهن.
- پورو چوت چوڪنڊي جون آمهون سامهون ڪنڊون يڪسان هونديون آهن.
- سڀليمينٽري ڪنڊون لاڳيتين ڪنڊن جي خاصيت رکن ٿيون.
- پورو چوت چوڪنڊي جون اريبون هڪ ٻئي کي اڌواڌ ڪن ٿيون ۽ هر هڪ اريب ان کي ٻن يڪسان ٽڪنڊن ۾ ورهائي ٿي.
- جيڪڏهن پورو چوت چوڪنڊي جون گوني ڪنڊون هجن ته هي ڪنڊون گوني ٿينديون.
- پورو چوت چوڪنڊي جون اريبون، ان کي چئن يڪسان ٽڪنڊن ۾ تقسيم ڪن ٿيون.
- پورو چوت چوڪنڊي جي ڪنڊن جو جوڙ 360° آهي.
- ٽڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي.
- ٽڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊن جو جوڙ 360° آهي.
- جيڪڏهن ٽي يا ٽن کان وڌيڪ پورو چوت ليڪون هڪ ڪپينڊڙ ليڪ کي يڪسان ٽڪرن ۾ ورهائن ته، اهي ليڪون ڪنهن ٻي ڪپينڊڙ ليڪ کي پڻ يڪسان ٽڪرن ڪن ۾ ورهائينديون.
- ٽڪنڊي جا مڌيان هڪ ٽپڪي تي ملن ٿا ۽ اهو ٽپڪو هر مڌيان کي پورن ٽن حصن ۾ ورهائي ٿو.
- جيڪڏهن ڪوليڪ ٽڪر، ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جي وچين ٽپڪن کي پاڻ ۾ ملائي ٿو ته اهو ٽڪنڊي جي ٽئين پاسي جي پورو چوت هوندو ۽ ماپ ۾ انهي جي اڌ جيترو هوندو.



ليڪ جا اڌ ڪندڙ ۽ ڪنڊ جا اڌ ڪندڙ

Line Bisectors and Angle Bisectors

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ هيٺين سڌيانن کي شامل نتيجن سان گڏ سمجهي سگهندا ۽ انهن کي استعمال ڪري لاڳاپيل حساب حل ڪندا.
- ◆ ڪنهن ليڪ جي عمودي اڌڪندڙ تي موجود ٽپڪو انهيءَ ليڪ ٽڪر جي ٻنهي ڇيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي هوندو آهي.
- ◆ ليڪ ٽڪر تي ڪو به ٽپڪو جيڪو ان جي ٻنهي ڇيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي، اهو ان جو عمودي اڌڪندڙ هوندو آهي.
- ◆ ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌڪندڙ هر ٽپڪا آهن (يعني ساڳئي ٽپڪي مان گذرندا آهن).
- ◆ ڪنهن به ڪنڊ کي اڌواڌ ڪندڙ ليڪ تي موجود ٽپڪو انهيءَ ڪنڊ جي ٻانهن تي هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.
- ◆ ڪنهن به ڪنڊ ۾ موجود اندر ٽپڪو ان جي ٻانهن کان هڪ جيتري مفاصلي تي هجي ته اهو ان جو اڌڪندڙ آهي.
- ◆ ٽڪنڊي جي ڪنڊن کي اڌ ڪندڙ ساڳي ٽپڪي گذرندا آهن.

تعارف

اسان هتي ليڪ ٽڪر ۽ ڪنڊ جي اڌ ڪنڊڙ سان تعلق رکندڙ سڌيان ۽ حساب جي مطالعو ڪنداسين.


وصول:

(i) ليڪ جا اڌ ڪنڊڙ

هڪ ليڪ، شعاع يا ٽڪرو، ٻي ليڪ ٽڪر کي ٻن برابر حصن ۾ ورهائي ته ان کي اڌ ڪنڊڙ چئبو آهي.

مثال طور: مليل شڪل ۾ ليڪ 'L'، $\overline{AB}$

ليڪ ٽڪري جو اڌ ڪنڊڙ آهي جيڪو $\overline{AB}$ جي وچ واري ٽڪي 'O' مان گذري ٿو.




(ii) ليڪ ٽڪر جو عمودي اڌ ڪنڊڙ

هڪ ليڪ جيڪا ليڪ ٽڪر کي 90° درجن تي ٻن حصن ۾ اڌ ڪري ته ان کي ليڪ ٽڪر جو عمودي اڌ ڪنڊڙ چئبو آهي.

مثال طور: ڏنل شڪل ۾ $\overline{CD}$ ليڪ ٽڪر $\overline{AB}$

تي عمود آهي جيڪو وچين ٽڪي 'O' مان

گذري ٿو. ته پوءِ $\overline{CD}$ کي $\overline{AB}$ جو عمودي اڌ ڪنڊڙ چئبو آهي. مليل شڪل ۾ ليڪ $\overline{CD}$ ليڪ ٽڪر $\overline{AB}$ جو عمودي اڌ ڪنڊڙ آهي.




(iii) ڪنڊ جو اڌ ڪنڊڙ

هڪ ليڪ، شعاع يا ٽڪرو جڏهن ڪنهن ڪنڊ کي ٻن برابر ڪنڊن ۾ ورهائي ته ان کي ڪنڊ جو اڌ ڪنڊڙ چئبو آهي.


ڏنل شڪل ۾ $\angle CBA$ ڪنڊ جو اڌ ڪنڊڙ $\overline{BD}$ آهي، جيڪو

ان ڪنڊ کي ٻن پورن ڪنڊن $\angle 1$ ۽ $\angle 2$ ۾ ورهائي ٿو. جيئن $\angle 1 \cong \angle 2$



ثابت ڪريو ته:

ڪنهن ليڪ ٽڪر جي عمودي اڌڪنڌڙ تي موجود ٽپڪو انهيءَ ليڪ ٽڪر جي ٻنهي چيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي هوندو آهي.



مليل: $\overleftrightarrow{CD}$ عمودي اڌڪنڌڙ آهي $\overline{AB}$ جو جيڪو ان کي پوري وچ ”O“ تي ڪٽي ٿو P ڪو به ٽپڪو $\overleftrightarrow{CD}$ تي آهي.

گهربل: $\overline{AP} \cong \overline{BP}$ يعني P ٽپڪو A ۽ B کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.

ثابتي:


سبب / دليل	بيان
(i) مليل ”O“ وچ وارو ٽپڪو آهي	$\triangle AOP \leftrightarrow \triangle BOP$
(ii) مليل ($\overline{CD} \perp \overline{AB}$) ”O“ ٽپڪي وٽ	$\overline{AO} \cong \overline{OB}$ (i)
(iii) مشترڪ	$\angle 1 \cong \angle 2$ (ii)
پ. ک. پ موضوع	$\overline{PO} \cong \overline{PO}$ (iii)
ٽڪنڊن جي يڪسانيت مطابق $\triangle S$.	$\triangle AOP \leftrightarrow \triangle BOP$ $\therefore$
فرضي ورتل	$\overline{AP} \cong \overline{BP}$ $\therefore$
مثيا قدم ورجائڻ سان	مگر ٽپڪو P ليڪ $\overleftrightarrow{CD}$ تي ڪو به ٽپڪو آهي ساڳي طرح $\overleftrightarrow{CD}$ تي ورتل ڪو به ٽپڪو ٻن ٽپڪن A ۽ B کان هڪ جيترو پري هوندو تنهنڪري ليڪ ٽڪر جي عمودي اڌڪنڌڙ تي موجود هر هڪ ٽپڪو انهيءَ جي چيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي هوندو.

Q.E.D

سڌيان 11.1.2

ثابت ڪريو ته:

ليڪ ٽڪر تي ڪو به ٽپڪو جيڪو ان جي ٻنهي ڇيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي ته اهو ان جو عمودي اڌڪندڙ هوندو آهي.



مليل: A ۽ B به مشتمل ٽپڪا آهن ۽ P حرڪت

ڪندڙ ٽپڪو آهي جيئن $PA \cong PB$

گهريل: P عمودي اڌڪندڙ آهي AB جو

جوڙجڪ: AB کي "O" تي بن حصن ۾ ڪپيو ۽ P ۽ O کي پاڻ ۾ ملايو.

ثابتي:

Reasons	بيان
(i) جوڙجڪ	$\triangle POA \leftrightarrow \triangle POB$
(ii) مليل	$\overline{AO} \cong \overline{OB}$ (i)
(iii) مشترڪ	$\overline{PA} \cong \overline{PB}$ (ii)
پ. ک. پ موضوع	$\overline{PO} \cong \overline{PO}$ (iii)
ٽڪنڊن جي يڪسانيت مطابق	$\triangle POA \cong \triangle POB$
$\triangle s$ هڪ ليڪ آهي (سپليمنٽ جو موضوع) جيڪڏهن ٻه سپليمنٽري ڪنڊون ماپ ۾ برابر آهن ته هر هڪ گوني ڪنڊ آهي.	$\angle 1 \cong \angle 2$
$\overline{PO} \perp \overline{AB}$ ۽ $\overline{AO} \cong \overline{BO}$	پهرين $\angle 1$ ۽ $\angle 2$ سپليمنٽري ڪنڊون آهن هر هڪ $\angle 1$ ۽ $\angle 2$ گوني ڪنڊ آهي تنهنڪري $\overline{PO}$ عمودي اڌڪندڙ آهي AB جو ته پوءِ هر ٽپڪو جيڪو A ۽ B کان هڪ جيتري مفاصلي تي هوندو اهو AB جو عمودي اڌڪندڙ ٿيندو.


Q.E.D

مشق 11.1

1. ثابت ڪريو ته ڪنهن ٽڪنڊي جي ڪن ٻه ٻن پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ هڪ اهڙي ٽپڪي تي ملن ٿا جيڪو سندس ٽنهي ڇيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.
2. ثابت ڪريو ته گول جو مرڪز، هڪ زهه جي عمودي اڌ ڪندڙن تي آهي.
3. ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان گذرندڙ گول جو مرڪز ڪٿي ٿيندو ۽ ڇو.
4. جيڪڏهن ٻه گول پاڻ کي A ۽ B ٽپڪن تي ڪپيسن، پوءِ ثابت ڪريو ته انهن جي مرڪز مان گذرندڙ ليڪ جو عمودي اڌ ڪندڙ ٿيندي.
5. ٽي مارڪيٽون A, B, C هڪ ليڪ تي نه آهن. ڪاروباري شخص اهڙي جڳهه تي مسجد ٺاهڻ چاهي ٿو، جيڪا هنن مارڪيٽن کان هڪ جيتري مفاصلي تي هجي، مسجد جي جڳهه طئي ڪرڻ کان پوءِ ثابت ڪريو ته هتي جڳهه ٽنهي مارڪيٽن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.

سڌيان 11.1.3:

- ثابت ڪريو** ته ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ هم ٽپڪا آهن (يعني ساڳئي مان گذرندا آهن)
- ٽڪنڊو ABC **مليل:**
- ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ **گهربل:**
- جوڙجڪ:**



$\overline{NO}$ ۽ $\overline{MO}$ جا عمودي اڌ ڪندڙ $\overline{AB}$ ۽ $\overline{AC}$ ناهيو جيڪي ٽپڪي ”O“ تي ملن ٿا.

ڪي ٽپڪي P اڌ ڪريو.

$\overline{BC}$ ۽ $\overline{OP}$, $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$ ڪريو.

ثابتي:

بيان	سبب / دليل
AB, NO جو عمودي اڌ ڪندڙ آهي.	جوڙجڪ
$\therefore \overline{AO} \cong \overline{OB}$	
تنهنڪري $\overline{AO} \cong \overline{OC}$	عمودي اڌ ڪندڙ آهي $\overline{AC}$ جو
$\therefore \overline{OB} \cong \overline{OC}$	هر هڪ يڪسان آهي $\overline{AO}$ جي.
P ليڪ ٽڪر $\overline{BC}$ جي وچ وارو ٽپڪو آهي.	جوڙجڪ
تنهنڪري $\overline{OP}$ عمودي اڌ ڪندڙ آهي $\overline{BC}$ جو.	سڌيان 11.1.2 مطابق
هتي ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ	انهن مان هر هڪ اهڙي ٽپڪي
ساڳي ٽپڪي مان گذرن ٿا.	تي ملن ٿا.

Q.E.D



مشق 11.2

1. ثابت ڪريو ته سوڙهي ڪنڊ جو گهيريٺڊڙ مرڪز ٽڪنڊي جي اندرين ۾ هوندو.
2. ثابت ڪريو ته ٻيڀور پاسي ٽرئيزيم جي چٽني پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ هم ٽپڪي تي هوندا آهن (يعني ساڳئي ٽپڪي تي هوندا)
3. ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جا عمود هم ٽپڪي تي آهن (ساڳي ٽپڪي تي)

11.1.4 سڌيان

ثابت ڪريو ته

ڪنهن به ڪنڊ تي اڌواڌ ڪندڙ ليڪ تي موجود ٽپڪو، انهي ڪنڊ جي بانهن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.



مليل: $\overline{BD}$ ڪنڊ $\triangle ABC$ جو اڌواڌ ڪندڙ آهي.

P تي ڪنيل ڪوبه ٽپڪو آهي ۽

$\overline{PQ}$ ۽ $\overline{PR}$ ترتيبوار، ٻانهن $\overline{BA}$ ۽ $\overline{BC}$

تي عمود آهن.

گهربل:

$\overline{PQ} = \overline{PR}$ (يعني ٽپڪو P ۽ $\overline{BA}$ ۽ $\overline{BC}$ کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي)

ثابتي:

Reasons	بيان
(i) هر هڪ گوني ڪنڊ آهي.	$\triangle PQB \leftrightarrow \triangle PRB$
(ii) مليل ($\overline{BD}$ اڌ ڪندڙ آهي)	$\angle 3 \cong \angle 4$ (i)
(iii) مشترڪ	$\angle 1 \cong \angle 2$ (ii)
ڪ . ڪ . پ = ڪ . ڪ . پ	$\overline{BP} \cong \overline{BP}$ (iii)
ٽڪنڊن جي يڪسانيت مطابق $\triangle s$	$\triangle PQB \cong \triangle PRB$
	$\overline{PQ} \cong \overline{PR}$
	يعني P ٽپڪو، $\overline{BA}$ ۽ $\overline{BC}$ کان هڪجيتري مفاصلي تي آهي.

Q.E.D

11.1.5 سڌيان

ثابت ڪريو ته

ڪنهن به ڪنڊ ۾ موجود اندر ٽپڪو، ان جي ٻانهن کان هڪ

جيتري مفاصلي تي هجي ته اهوان جو اڌ ڪندڙ آهي.


مليل: $\overline{BD}$ تي موجود ٽپڪو P ، ڪنڊ $\triangle ABC$

جي ٻانهن $\overline{AB}$ ۽ $\overline{BC}$ کان هڪ جيتري

مفاصلي تي آهي.

$\overline{PQ} \cong \overline{PR}$ ۽ $\overline{PQ} \perp \overline{BA}$ ۽ $\overline{PR} \perp \overline{BC}$.

گهربل: يعني $\overline{BD}$ ڪنڊ $\triangle ABC$ جو اڌواڌ ڪندڙ آهي.



ثابتي:


Reasons	بيان
گوني ڪنڊ جي ٽڪنڊن نسبت Δs	$\Delta PQB \leftrightarrow \Delta PRB$ ۾
(i) هر هڪ گوني ڪنڊ آهي.	$\angle 3 \cong \angle 4$ (i)
(ii) مليل	$\overline{PQ} \cong \overline{PR}$ (ii)
(iii) مشترڪ هيپاٽينيز	$\overline{BP} \cong \overline{BP}$ (iii)
گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾	$\Delta PQB \cong \Delta PRB$
$H.S \cong H.S$	$\angle 1 \cong \angle 2,$
ٽڪنڊن جي يڪسانيت سان	يعني BD ڪنڊ $\angle ABC$ جو اڌواڌ ڪندڙ آهي.


Q.E.D

11.1.6 سڌيان

ثابت ڪريو ته

ٽڪنڊي جي ڪنڊن کي اڌ ڪندڙ ساڳي ٽپڪي مان گذرندا.

مليل: ٽڪنڊي ΔABC ۾ $\overline{BF}$ ۽ $\overline{BE}$ ڪنڊن $\angle B$ ۽ $\angle C$ جا اڌ ڪندڙ آهن.جيڪي هڪ ٻئي کي O ٽپڪي تي اڌ ڪن ٿا.گهربل: $\angle C$ ۽ $\angle A, \angle B$ جا اڌ ڪندڙ هر ٽپڪي تي هوندا.جوڙجڪ: $\overline{OF} \perp \overline{AB}$ ۽ $\overline{OD} \perp \overline{BC}$. تي ناهيو.



ثابتي:

بيان	سبب / دليل
مطابقت ۾	ڪنڊ تي اڌ ڪنڊڙ ٽپڪو، ان جي ٻانهن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.
$\overline{OD} \cong \overline{OF}$ (i)	
$\overline{OD} \cong \overline{OE}$ (ii)	
$\overline{OE} \cong \overline{OF}$ (iii)	(i) ۽ (ii) مان
تنهنڪري A جو اڌ ڪنڊڙ ٽپڪون آهي.	
$\angle ABC$ ۽ $\angle BCA$ جو پڻ اڌ ڪنڊڙ ٽپڪون 0 آهي.	ملييل
تنهنڪري $\angle A$ ، $\angle B$ ۽ $\angle C$ جا اڌ ڪنڊڙ هڪ ٽپڪي تي هوندا آهن.	


Q.E.D

مشق 11.3

1. ٻٺ ٻيڙ پاسي ٽڪنڊن جا بنياد مشترڪ آهن، ثابت ڪريو ته انهن جي چوٽين کي ملائيندڙ ليڪ، مشترڪ بنياد کي گوني ڪنڊ ۾ اڌواڌ ڪندي.
2. ٽڪنڊي جي ڪنڊن جا اڌواڌ ڪندڙ آمهون سامهون وارن پاسن کي به اڌواڌ ڪندا. ثابت ڪريو ته ٽڪنڊو ٻيڙ پاسو آهي.
3. ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي ABC ۾ $m\overline{AB} = m\overline{AC}$ ، $\triangle ABC$ آهي. ثابت ڪريو ته B ۽ C چوٽين کان سامهون پاسن سان ٺهندڙ عمود برابر آهن.
4. ٽڪنڊي جو مڌيان هڪ ليڪ ٽڪر آهي. جيڪو پاسي کي مخالف چوٽي سان ملائي ٿو. ثابت ڪريو ته ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي جا مڌيان يڪسان آهن.

ورجایل مشق 11

1. ثابت کریو ته جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ٻه عمود يڪسان آهن ته ٽڪنڊو ٻيڙ پاسو آهي.
2. ثابت کریو ته ٽڪنڊي جو اندرپوٽيڪو تنهي پاسن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي، اهو ٽڪنڊي جي تنهي ڪنڊن جي اڌڪنڌڙ تي آهي.
3. هيٺين بيانن جي سامهون درست لاءِ (T) ۽ غلط لاءِ (F) لکو.
 - (i) پاسن جو اڌواڌ ڪرڻ جو مطلب آهي تي اسان ڏنل پاسي کي ٻن حصن ۾ تقسيم ڪيو.
 - (ii) ٻيڙ پاسي گسني ڪنڊ ٽڪنڊي جي بنياد جي هر هڪ ڪنڊ 45 جي آهي.
 - (iii) يڪسان پاسن وارن ٽڪنڊن جون ڪنڊون ٻو يڪسان هونديون.
 4. صحيح جواب جي چونڊ ڪريو.
 - (i) سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ _____ سوڙهيون ڪنڊون آهن.
 - (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) ڪا به نه
 - (ii) ليڪ ٽڪر تي هڪ ٽيڪو جيڪو ان جي ٻنهي چيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي اهو ان جو _____ آهي.
 - (a) عمودي اڌ ڪنڌڙ (b) عمودي
 - (c) مرڪز (d) وچ وارو ٽيڪو
 - (iii) ڪنهن سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊي جي پاسن جو _____ ٽڪنڊي جي اندر هڪ هڪ کي ڪپيندو.
 - (a) عمود (b) عمودي اڌ ڪنڌڙ
 - (c) ويڪري (d) سوڙهي
 - (iv) ٽڪنڊي جي ڪنڊن جا اڌ ڪنڌڙ آهن _____.
 - (a) هر ٽيڪا (b) همورا
 - (c) ڪو نه ڪيندا (d) غير برابر



خلاصو

- ليڪ ٽڪر جو اڌ و اڌ ڪندڙ، ليڪ ٽڪر کي ٻن برابر حصن ۾ تقسيم ڪندو آهي.
- عمودي اڌ ڪندڙ ليڪ ٽڪر کي 90 تي ٻن برابر حصن ۾ ڪپين ٿا.
- ڪنهن ليڪ جي عمودي اڌ ڪندڙ تي موجود ٽپڪو، انهيءَ ليڪ ٽڪر جي ٻنهي چيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي هوندو آهي.
- ليڪ ٽڪر تي ڪو به ٽپڪو جيڪو ان جي ٻنهي چيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي، اهو ان جو عمودي اڌ ڪندڙ هم ٽپڪا آهن.
- ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ هم ٽپڪا آهن.
- ڪنهن به ڪنڊ کي اڌ و اڌ ڪندڙ ليڪ تي موجود ٽپڪو انهيءَ ڪنڊ جي ٻانهن تي هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.
- ڪنهن به ڪنڊ ۾ موجود اندريون ٽپڪو، ان جي ٻانهن کي هڪ جيتري مفاصلي تي هجي ته اهو ان جو اڌ ڪندڙ آهي.
- ٽڪنڊي جي ڪنڊن کي اڌ ڪندڙ ساڳي ٽپڪي مان گذرندا آهن.

KARACHI



ٽڪنڊن جا پاسا ۽ ڪنڊون SIDES AND ANGLES OF A TRIANGLE

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي مطالعي کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ♦ جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جا ٻه پاسا ڊيگهه ۾ برابر نه هجن ته وڌيڪ پاسي جي سامهون واري ڪنڊ جو مقدار وڌيڪ هوندو.
- ♦ جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ماپ ۾ برابر نه هجن ته وڏي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو، ننڍي ڪنڊ جي سامهون واري پاسي کان وڏو ٿيندو.
- ♦ ٽڪنڊي جي ڪن ٻه ٻن پاسن جي ڊيگهه جي ماپ، ٽئين پاسي جي ڊيگهه کان وڌيڪ هوندي آهي.
- ♦ ڪنهن ٽپڪي کان جيڪو ليڪ کان ٻاهر هجي، ليڪ تائين عمود سڀ جو کان گهٽ مفاصلو ٿيندو.



تعارف:


هن يونٽ ۾ اسان ٽڪنڊي جي پاسن ۽ ڪنڊن سان تعلق رکندڙ سڌيان، انهن جا شامل نتيجن بابت پڙهندا سين ۽ انهن سان تعلق ڏسندڙ حساب پڻ حل ڪنداسين.

12.1 ٽڪنڊي جا پاسا ۽ ڪنڊون

سڌيان 12.1.1

ثابت ڪريو ته:

جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جا ٻه پاسا ڊيگهه ۾ برابر نه هجن، ته وڌيڪ ڊيگهه واري پاسي جي سامهون واري ڪنڊ جو مقدار وڌيڪ هوندو.



$$m\overline{BC} > m\overline{AC} \text{ ۾ } \triangle ABC$$

مليل:

$$m\angle A > m\angle B \text{ گهربل:}$$


جوڙجڪ: $\overline{BC}$ مان $\overline{CD}$ کي $\overline{AC}$ جي يڪسان ڪٽيو ۽ ٽپڪي A کي D سان ملايو. ثابتي:

سبب / دليل	بيان
جوڙجڪ	$\overline{AC} \cong \overline{CD}$ ۾ $\triangle ACD$
يڪسان پاسا،	$m\angle CAD = m\angle CDA \therefore$
ٻاهرين ڪنڊن جي وصف مطابق	پَر $\angle ACD$ ٽڪنڊي ABD جي ٻاهرين ڪنڊ آهي
ٻاهرين ڪنڊ، غير پرواري ڪنڊ کان وڏي ٿيندي.	$m\angle CDA > m\angle B \therefore$
$m\angle A = m\angle CAD + m\angle DAB \therefore$	پَر $m\angle A > m\angle CAD$
$m\angle CAD = m\angle CAD \therefore$	$m\angle A > m\angle CDA \therefore$
نا برابري واري متعدي خاصيت	$m\angle A > m\angle B \therefore$

Q.E.D

هيٺيان مثال مٿئين سڌيان کي سمجھڻ ۾ مدد ڪندا.

ثابت ڪريو ته اڻپور پاسي ٽڪنڊي ۾ وڏي پاسي واري سامهون ڪنڊ جي ماپ 60° کان وڌيڪ ٿيندي





مليل: ٽڪنڊو ABC ۾ $m\overline{AC} > m\overline{AB}$ ۽ $m\overline{AC} > m\overline{BC}$.

گهربل ثابت ڪريو: $m\angle B > 60^\circ$

بيان	سبب / دليل
ٽڪنڊي ABC ۾ اسان کي $m\angle B > m\angle C$ ۽ $m\angle B > m\angle A$ پَر $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$ $\therefore m\angle B + m\angle B + m\angle B > 180^\circ$ $3 m\angle B > 180^\circ$ $= m\angle B > \frac{180^\circ}{3}$ ته پوءِ $m\angle B > 60^\circ$	مليل $m\overline{AC} > m\overline{AB}$, $m\overline{AC} > m\overline{BC}$ $\angle C$ ۽ $\angle A$, $\angle B$ ٽڪنڊي ABC جون ڪنڊون آهن $m\angle B > m\angle C$ and $m\angle B > m\angle A$ جوڙ ڪرڻ سان 3 سان ونڊ ڪرڻ سان

Q.E.D



ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ماپ ۾ برابر نه هجن ته وڏي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو، ننڍي ڪنڊ جي سامهون واري پاسي کان وڏو ٿيندو.

مليل: ٽڪنڊي ABC ۾ $m\angle B > m\angle C$

گهربل: $m\overline{AC} > m\overline{AB}$

جوڙجڪ: $\angle C$ سان يڪسان ڪرڻ لاءِ $\angle MBC$, $\angle ABM$ کي

جواڏ ڪندڙ $\overline{BN}$, ٺاهو ته جيئن $m\angle 1 = m\angle 2$

ثابتي:

سبب / دليل	بيان
ٻاهرين ڪنڊ جي وصف مطابق	$\angle ANB$ ٻاهرين ڪنڊ آهي $\triangle CBN$ $\therefore$
	ته پوءِ
	$m\angle ANB = m\angle C + m\angle 2$
	$= m\angle C + m\angle 1$
	$= m\angle ABM + m\angle 1$
	$= m\angle ABN$
	$\overline{AB} \cong \overline{AN} \therefore$
	$m\overline{AC} > m\overline{AN} \therefore$
$m\angle 2 = m\angle 1$ جوڙجڪ	
$m\angle C = m\angle ABM$ جوڙجڪ	
ڪنڊن کي جوڙ جو موضوع	
$m\angle ANB = m\angle ABN$ مٿي ثابت ٿيل	
$m\overline{AC} > m\overline{AN} \therefore$	

Q.E.D

شامل نتيجا:

(1) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جو هيٺا تي *** باقي ٻين هر هڪ پاسن کان وڏو هوندو آهي.


(2) ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊي ۾، ويڪري ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو ٻين پاسن

مان هر هڪ کان وڏو هوندو آهي.

سڌيان 12.1.3

ٽڪنڊي جي ڪن به ٻن پاسن جي ڊيگهه جي ماپ اٽئين پاسي جي ڊيگهه کان وڌيڪ هوندي آهي.

مليل: ٽڪنڊو ABC



گهريل:

$$m\overline{AB} + m\overline{AC} > m\overline{BC} \quad \text{(i)}$$

$$m\overline{AB} + m\overline{BC} > m\overline{CA} \quad \text{(ii)}$$

$$m\overline{AC} + m\overline{BC} > m\overline{AB} \quad \text{(iii)}$$

جوڙجڪ: BA کي D تڪي تائين اهڙي طرح وڌايو جو

$$\overline{AD} \cong \overline{AC} \text{ ۽ } \overline{DC} \text{ ٺاهيو}$$

ثابتي:


بيان	سبب / دليل
$\overline{AD} \cong \overline{AC}$ ۾ ٽڪنڊي ADC	جوڙجڪ
$m\angle 1 = m\angle 2$	يڪسان پاسن جي سامهون واريون ڪنڊون
$m\angle BCD > m\angle 1$	$m\angle BCD = m\angle BCA + m\angle 1$
$m\angle BCD > m\angle 2$	نا برابري واري متعددي خاصيت
تنهنڪري ΔBDC ۾ $m\overline{BD} > m\overline{BC}$	وڏي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو وڏو ٿيندو
$m\overline{BD} = m\overline{AB} + m\overline{AD}$	جوڙجڪ مطابق
$= m\overline{AB} + m\overline{AC}$	
$m\overline{AB} = m\overline{AC} > m\overline{BC}$	$\overline{BD}$ جي قيمت رکڻ سان
ساڳي طرح اسان ثابت ڪري سگهيا ٿا ته	مٿئين طريقي ڪار مطابق
$m\overline{AB} + m\overline{BC} > m\overline{AC}$	
$m\overline{BC} + m\overline{AC} > m\overline{AB}$ ۽	

Q.E.D

هيٺيان مثال مٿي ڏنل سڌيان کي سمجهڻ ۾ مدد ڪندو.

مثال 1: هيٺين مان، ڪهڙا ڊيگهه جا ڏنل سيٽ ٽڪنڊو ٺاهيندا:

- (i) 3 س. م، 4 س. م ۽ 5 س. م (ii) 4 س. م، 5 س. م ۽ 4.5 س. م
- (iii) 60 م. م، 80 م. م ۽ 10 س. م (iv) 3 س. م، 4 س. م ۽ 10 س. م



حل:

(i) 3 س. م. ، 4 س. م. ۽ 5 س. م.

جيئن ته $5 > 4$, $3 + 4 > 5$ ۽ $3 + 5 > 4$ ۽ $4 + 5 > 3$ ته پوءِ

ان پاسن جو جوڙ تي پاسي جي جوڙ کان وڌيڪ آهي.

ڏنل ڊيگه جو سيٽ هڪ ٽڪنڊو ٺاهيندو

(ii) 4 س. م. ، 5 س. م. ۽ 4.5 س. م.

جيئن ته $4.5 > 4$, $4 + 5 > 4.5$, $5 + 4.5 > 4$ ۽ $4.5 + 3 > 4$ ته پوءِ

ڏنل ڊيگه جو سيٽ هڪ ٽڪنڊو ٺاهيندو.

(iii) 60 م. م. ، 80 م. م. ۽ 10 س. م.

جيئن ته $10 = 10$ س. م. تنهنڪري 60 م. م. = 6 س. م. ۽ 80 م. م. = 8 س. م.هاڻ $10 > 6$, $6 + 8 > 10$, $6 + 10 > 8$ ۽ $8 + 10 > 6$ ته پوءِ

ڏنل ڊيگه جو سيٽ هڪ ٽڪنڊو ٺاهيندو.

مثال 2: مٿين سڌيان کي ذهن ۾ رکي فيصلو ڪريو ته ڪهڙا ڊيگه جا سيٽ ٽڪنڊو

ٺاهيندا.

(i) 2 س. م. ، 4 س. م. ۽ 7 س. م. (ii) 5.5 س. م. ، 5 س. م. ۽ 9.5 س. م.

(i) 2 س. م. ، 4 س. م. ۽ 7 س. م.

حل:

جيئن ته $7 > 2$, $2 + 4 < 7$, $4 + 7 > 2$ ۽ $7 + 2 > 4$

هن قسم جي ڊيگه جو سيٽ ٽڪنڊو ٺاهي سگهي.

(ii) 5.5 س. م. ، 5 س. م. ۽ 9.5 س. م.

جيئن ته $9.5 > 5.5$, $5.5 + 5 > 9.5$, $5 + 9.5 > 5.5$ ۽ $5.5 + 5.5 > 5$ ته پوءِ

ڏنل ڊيگه وارو سيٽ ٽڪنڊو ٺاهي سگهي ٿو




سرگرمي

جيڪڏهن $a = 3$ cm $b = 4$ cm $c = 5$ cmته پوءِ ΔABC ٺاهي سگهيو يا نه

سڌيان 12.1.4 ڪنهن ٽپڪي کان جيڪو ليڪ کان ٻاهر هجي، ليڪ تائين عمود سڀ

کان گهٽ مفاصلو ٿيندو.



مذيل: ٽپڪي C کان $\overline{CD}$ ، ليڪ AB تي هڪ عمود

ڪڍيو ويو آهي. جيڪو D ٽپڪي تي ملي ٿو.

۽ $\overline{CE}$ هڪ ٻيو ليڪ تڪر $\overline{AB}$ کي ٽپڪي E تي ملي ٿو

گهربل: $m\overline{CD} < m\overline{CE}$

ثابتي:

بيان	سبب / دليل
$\triangle CDE$ جي ٻاهرين ڪنڊ آهي $\angle 1$ $m\angle 1 > m\angle 3$.	ٻاهرين ڪنڊ جي وصف مطابق. ٽڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊ، سامهون واري اندرين ڪنڊ کان وڏي هوندي آهي. $m\angle 1 = m\angle 2$ (هر هڪ گوني ڪنڊ آهي) وڏي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو وڏو ٿيندو آهي. مٿين طريقي کار سان
$m\angle 2 > m\angle 3$. $m\overline{CE} > m\overline{CD}$.	
ساڳي طرح اهو ثابت ڪري سگهجي ٿو ته $m\overline{CD}$ جي ڊيگهه ننڍي ٿيندي ڪنهن به ٻي ليڪ تڪر کان، جيڪو C کان $\overrightarrow{AB}$ تائين ڪڍيو ويندو.	

Q.E.D

شامل نتيجو:

1. ڪنهن ليڪ تي ٽپڪي ۽ ليڪ وچ ۾ مفاصلو ٻڙي آهي.

مشق 12.1

1. ٽڪنڊي ABC جو اندريون ٽڪو O آهي.

$$\text{ثابت ڪريو ته } m\overline{OA} + m\overline{OB} + m\overline{OC} > \frac{1}{2} (m\overline{AB} + m\overline{BC} + m\overline{CA})$$

2. ٽڪنڊي ABC ۾ $m\angle B = 70^\circ$ ۽ $m\angle C = 45^\circ$ آهي. ٽڪنڊي جو ڪهڙو پاسو وڏي ۾ وڏو ٿيندو؟

ورجائيل مشق 12

1. صحيح ۽ غلط بيانن تي (✓) ٽڪ ڪريو.

- (i) ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جو جوڙ تي پاسي کان وڏو ٿيندو آهي. T/F
- (ii) ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جي ڪٽ، تي پاسي کان وڌيڪ ٿيندي آهي. T/F
- (iii) ليڪ جو ٻاهريون ٽڪو ٽهڪندڙ (coincident) آهي يا اها ليڪ آهي. T/F
- (iv) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي وڏي ۾ وڏي ڪنڊ 100° جي آهي. T/F
- (v) ڪنهن ليڪ تي عمود هميشه 90° جي ڪنڊ ٺاهيندو. T/F

2. خال پري جملن کي درست ڪريو.

- (i) ڪنهن گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي _____ وڏو پاسو آهي.
- (ii) ڪنهن ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ واري پاسن جو جوڙ _____ آهي.
- هٿبائينيو جي ماپ کان.

(iii) ٽڪنڊي ABC ۾ $m\angle A = 50^\circ$ ۽ $m\angle B = 30^\circ$ ته _____ پاسو وڏو

ٿيندو باقي اهنن جي ٻين پاسن کان.

- (iv) چوڪنڊي جي اريب جي ڊيگهه _____ آهي. ان جي پرواري پاسن جي جوڙ کان.

3. صحيح جواب تي (✓) ڪريو.

(i) ٽپور پاسي ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي ماپ 6 س م آهي ته پوءِ ان جي

مٿيان جي ماپ _____ ٿيندي 9 س م کان:

(a) گهٽ (b) وڌيڪ (c) برابر (d) ڪو به نه

(ii) مستطيل جي گهيري جي ماپ 22 س م آهي ته ان جي اريب جي ڊيگهه

_____ ٿيندي 11 س م کان.

(a) برابر (b) وڌيڪ (c) گهٽ (d) ڪو به نه



Summary اختصار

◆ جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جا ٻه پاسا ڊيگهه ۾ برابر نه هجن ته وڌيڪ پاسي جي سامهون واري ڪنڊ جو مقدار وڌيڪ هوندو.

◆ جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ماپ ۾ برابر نه هجن ته وڏي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو، ننڍي ڪنڊ جي سامهون واري پاسي کان وڏو ٿيندو.

◆ ٽڪنڊي جي ڪنڊ به ٻن پاسن جي ڊيگهه جي ماپ ٿيڻ پاسي جي ڊيگهه کان وڌيڪ هوندي آهي.

◆ ڪنهن ٽپڪي کي جيڪو ليڪ کان ٻاهر هجي، ليڪ تائين عمود جو سڀ کان گهٽ مفاصلو ٿيندو.



عملي جاميٽري (ٽڪنڊن) جي

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي مطالعي کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ♦ ٽڪنڊو ٺاهيندا جن ۾ مليل هجن
 - ♦ ٻه پاسا ۽ وچ واري ڪنڊ
 - ♦ هڪ پاسو ۽ ٻه ڪنڊون
- ♦ ٻه پاسا ۽ ڪنڊ، ڪنهن به هڪ پاسي جي سامهون واري (سپيني، تنهي ممڪن ماپن سان) ٺاهيو:
 - ♦ ڪنڊ جو اڌ ڪنڊڙ
 - ♦ عمود
 - ♦ عمودي اڌ ڪنڊڙ
- ♦ ٽڪنڊي جا مڌيان ۽ انهن جي هر ٽيڪو جي چڪاس
- ♦ ڏنل چوڪنڊي جي ايراضي جي برابر ٽڪنڊو ٺاهيو
- ♦ مليل ٽڪنڊي جي ايراضي جي برابر مستطيل ٺاهيو
- ♦ مليل مستطيل جي ايراضي جي برابر چورس ٺاهيو
- ♦ مساوي ايراضي جو ٽڪنڊو ڏنل ڏيگهه واري بنياد تي ٺاهيو

13.1 ٽڪنڊي جي بناوت

13.1.1 هڪ ٽڪنڊو ٺاهيو جنهن ۾ مليل هجي


- ٻه پاسا ۽ وچ واري ڪنڊ
- هڪ پاسو ۽ ٻه ڪنڊون
- ٻه پاسا ۽ ڪنهن به هڪ پاسي جي سامهون واري ڪنڊ. سڀني ممڪن (تنهنجي) ماپن سان

جنهن ٻه پاسا ۽ وچ واري ڪنڊ مليل هجن.

مثال ٽڪنڊو ABC ٺاهيو جنهن ۾

$$m\angle B = 75^\circ \text{ س } m\overline{AC} = 3.2 \text{ س } m\overline{AB} = 4.8$$

جوڙجڪ:



(i) 4.8 سينٽي ميٽر ڊگهو ليڪ ٽڪر $\overline{AB}$

(ii) ٽپڪي A کي چوٽي طور وٺي 75° ماپ

واري ڪنڊ XAB ٺاهيو.

(iii) $\overline{AX}$ مان 3.2 سينٽي ميٽر ڊگهو ليڪ

$\overline{AC}$ ڪڍو.

(iv) $\overline{BC}$ ٺاهيو.

گهريل ٽڪنڊو $\triangle ABC$ ٺهي پيو.

When one side and two angles are given.

مثال 01 ٽڪنڊو $\triangle ABC$ ٺاهيو جنهن ۾

$$m\angle B = 40^\circ \text{ س } m\angle A = 75^\circ \text{ س } m\overline{AB} = 5.5$$

جوڙجڪ:

(i) 5.5 س ڊگهو ليڪ ٽڪر ڪڍو

(ii) ٽپڪي A کي چوٽي طور وٺي


واري ڪنڊ XAB ٺاهيو

(iii) ٽپڪي B کي چوٽي وٺي 40° ماپ

ڪنڊ YBA اهڙي طرح ٺاهيو جو

$\overline{AX}$ هڪٻئي کي ٽپڪي C تي

گهريل ٽڪنڊو آهي.



مثال 02

تڪندو ABC ٺاهيو جنهن ۾

 $m\angle A = 65^\circ$ س م، $m\angle B = 40^\circ$ ۽ $m\overline{BC} = 5.8$ س م

جوڙجڪ: اسان کي خبر آهي ته تڪندي ABC ۾

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$$

هتي $m\angle A = 65^\circ$ and $m\angle B = 40^\circ$ ته پوءِ

$$m\angle C = 180^\circ - (m\angle A + m\angle B)$$

$$= 180^\circ - (65^\circ + 40^\circ)$$

$$= 180^\circ - 105^\circ$$

$$= 75^\circ$$

هاڻ اسان اهڙو تڪندو ٺاهينداسين جنهن ۾

 $m\angle C = 75^\circ$ ۽ $m\angle B = 40^\circ$ س م، $m\overline{BC} = 5.8$ س م آهي.(i) 5.8 س م ڊگهو ليڪ ٽڪر $\overline{BC}$ ڪيو(ii) ٽپڪي B کي چوٽي طور وٺي 40° ماپ واري

ڪنڊ XAB ٺاهيو.

(iii) ٽپڪي C کي چوٽي طور وٺي ڪنڊ $m\angle XCB = 75^\circ$ ٺاهيو(iv) $\overline{BX}$ ۽ $\overline{CY}$ شعاع هڪٻئي کي A وٽ ڪپين ٿا.

اهڙي ريت ABC گهربل تڪندو آهي.

ٻه پاسا ۽ ڪنهن به هڪ پاسي جي سامهون واري ڪنڊ (سيني ٽنهي صورت ۾)

صورت I:

مثال 01

تڪندو ABC ٺاهيو جنهن ۾

 $m\angle A = 40^\circ$ س م ۽ $m\overline{AB} = 5.3$ س م، $m\overline{BC} = 3.7$ س م



جوڙجڪ:


(i) 5.3 س م ڊگهو ليڪ ٽڪر $\overline{AB}$ ڪيو(ii) ٽپڪي A کي چوٽي طور وٺي $\angle EAX$ ٺاهيوجنهن جي ماپ 40° هجي.

(iii) ٽپڪي B کي مرڪز وٺي 3.7 س م جيترو

هڪ قوس ڪيو. جيڪو $\overline{AX}$ کي C ۽ C' ٽپڪن تي ڪٽي.(iv) $\overline{BC}$ ۽ $\overline{BC'}$ ٺاهيو.

ٻه تڪندا ABC ۽ ABC' گهربل تڪندا آهن.






صورت II:

مثال 02

تڪندو DEF ٺاهيو جنهن ۾

$$m\overline{DE} = 5.6 \text{ س.م.} \quad m\overline{DF} = 2.5 \text{ س.م.} \quad m\angle E = 30^\circ$$

جوڙجڪ:



(i) 5.6 س.م. ڊگهو ليڪ تڪر $\overline{DL}$ ٺاهيو.

(ii) 30° ماپ واري ڪنڊ DEX ڪيو.

(iii) ٽپڪي D کي چوٽي طور وٺي 2.5 س.م. رڌاس جيترو قوس ڪيو. جيڪو $\overline{LX}$ کي

ڪهن ٻه ٽپڪي تي نه ٿو ڪپي. هن صورت ۾

ڏنل ماپن وارو ڪوڊ تڪندو نه ٿو ٺاهي سگهجي


صورت III:

مثال 03

تڪندو PQR ٺاهيو جنهن ۾

$$m\angle P = 55^\circ \quad m\overline{PR} = m\overline{QR} = 4.7$$

جوڙجڪ:



(i) 4.7 س.م. ڊگهو ليڪ تڪر $\overline{PR}$ ٺاهيو.

(ii) 55° ماپ واري ڪنڊ XPR ٺاهيو.

(iii) ٽپڪي R کي چوٽي طور وٺي 4.7 س.م. رڌاس

جيترو هڪ قوس ڪيو، جيڪو $\overline{PX}$ کي ٽپڪي Q وٽ ڪٽي

(iv) ٽپڪن Q ۽ R کي ملايو.

$\triangle PQR$ گهربل تڪندو آهي.

نوٽ: مٿيون صورتون I، II ۽ III مبهم صورتون آهن

مشق 13.1

1. تڪندو PQR ٺاهيو جنهن ۾ $m\angle Q = 35^\circ$ ۽ $m\overline{PQ} = m\overline{QR} = 4.6$ س.م.

2. تڪندو ABC ٺاهيو جنهن ۾ $m\angle A = 65^\circ$ ۽ $m\overline{AB} = m\overline{AC} = 5.1$ س.م.

3. تڪندو LMN ٺاهيو جنهن ۾ $\angle M = 50^\circ$ ۽ $m\overline{LM} = 3.7$ س.م. $m\overline{MN} = 2.5$ س.م.

4. تڪندو ABC ٺاهيو جنهن ۾ $\angle B = 110^\circ$ ۽ $m\overline{AB} = 3.5$ س.م. $m\overline{BC} = 2.7$ س.م.

5. تڪندو XYZ ٺاهيو جنهن ۾ $\angle Z = 80^\circ$ ۽ $m\overline{XY} = 4.1$ س.م. $m\overline{YZ} = 5$ س.م.



6. هيٺيان ٽڪنڊا $\triangle DEF$, $\triangle LMN$ ۽ $\triangle ABC$ ٺاهيو.

- (i) $m\overline{DE} = 5\text{cm}$, $m\angle D = 45^\circ$ and $m\angle E = 60^\circ$
(ii) $m\overline{LM} = 6\text{cm}$, $m\angle L = 75^\circ$ and $m\angle M = 45^\circ$
 $m\overline{BC} = 5.8\text{cm}$, $m\angle A = 30^\circ$ and $m\angle B = 45^\circ$

7. ٽڪنڊو ABC ٺاهيو جڏهن ان جي ٻن پاسن جي ماپ ۽ هڪ پاسي جي سامهون واري ڪنڊ جي ماپ مليل هجي.

- (i) $m\overline{AC} = 4.5\text{cm}$, $m\overline{BC} = 4.1\text{cm}$ and $m\angle B = 75^\circ$
(ii) $m\overline{BC} = 5\text{cm}$, $m\overline{AB} = 5.5\text{cm}$ and $m\angle C = 70^\circ$
(iii) $m\overline{AB} = 5\text{cm}$, $m\overline{BC} = 5.5\text{cm}$ and $m\angle A = 45^\circ$

- 13.12. ٺاهيو
• ڪنڊ جا اڌ ڪندڙ
• عمود
• عمود جا اڌ ڪندڙ
• مڌيان


(i) ڏنل ٽڪنڊي جي ڪنڊ جا اڌ ڪندڙ ٺاهيو.

مثال ٽڪنڊي $\triangle ABC$ جي ڪنڊن جا اڌ ڪندڙ ڪيو.

مليل: ABC هڪ ٽڪنڊو آهي ۽ $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ ان جون ڪنڊون آهن.

گهربل: $\angle A$, $\angle B$ ۽ $\angle C$ جا اڌ ڪندڙ ڪيو.

جوڙجڪ:



(i) ٽڪنڊو ABC ٺاهيو.

(ii) ٽپڪي B کي مرڪز وٺي مناسب رداس وارو

قوس ڪيو، جيڪو $\overline{BA}$ ۽ $\overline{BC}$ کي ٽپڪن L ۽ M تي ڪٽي.

(iii) ٽپڪي L کي مرڪز وٺي مناسب رداس جو قوس ڪيو.


(iv) هان ٽپڪي M کي مرڪز وٺي مناسب رداس جو قوس ڪيو جيڪو قوس

کي P ٽپڪي تي ڪٽي.

(v) P ۽ B کي ملائي $\overline{BP}$ ٺاهيو.

(vi) قدم (ii) کان (v) تائين ورجائي، $\overline{AR}$ ۽ $\overline{CQ}$ ٺاهيو جيڪي ترتيبوار $\angle A$

۽ $\angle C$ جا اڌ ڪندڙ آهن.




(ii) ڏنل ٽڪنڊي جا عمودي ٺاهيو.

مثال ڪوبه ٽڪنڊو ABC وٺو ۽ ان جا عمود ٺاهيو.

مليل: ٽڪنڊو ABC

گهربل: ٽڪنڊي ABC جا عمود ڪڍڻ

جوڙجڪ:



(i) ٽڪنڊو ABC ڪيو.

(ii) ٽپڪي A کي مرڪز وٺي مناسب رداس سان

وڪ قوس ڪيو. جيڪو $\overline{BC}$ کي ٽپڪن D ۽ E وٽ ڪٽي.

(iii) ٽپڪي D کي مرڪز وٺي $\overline{DE}$ جي ماپ جي اڌ

کان وڌيڪ جيتري رداس جو قوس ڪيو.

(iv) وري ٽپڪي E کي مرڪز وٺي $\overline{BC}$ جي ٻاهرين

پاسي رداس سان هڪ ٻيو قوس ڪيو

جيڪو پهرين قوس کي ٽپڪي F تي ڪٽي.

(v) ٽپڪن A ۽ F کي ملايو اهڙي طرح $\overline{AF}$ ۽ $\overline{BC}$ کي ٽپڪ P وٽ ڪٽي ته $\overline{AP}$

ٽڪنڊي ABC جي چوٽي A کان هڪ عمود ٺهي پيو.

(vi) ساڳي طرح قدم (ii) کان (v) ڏهرايو $\overline{BC}$ ۽ $\overline{AC}$ ٺاهيو جيڪي چوٽين B ۽ C

کان ٽڪنڊي ABC جي رهيل پاسن تي عمود آهن.

(iii) ڏنل ٽڪنڊي جي عمود جا اڌ ڪندڙ ٺاهيو.

مثال ٽڪنڊي ABC جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو.

مليل: هڪ ٽڪنڊو ABC

گهربل: ٽڪنڊي جي پاسن $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ ۽ $\overline{CA}$


جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪڍڻ.

جوڙجڪ: (i) ٽڪنڊو ABC ٺاهيو

(ii) پاسي $\overline{AB}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ ڪڍڻ لاءِ ٽپڪي

B کي مرڪز وٺي $\overline{AB}$ جي ماپ جي اڌ کان وڌي

رداس سان $\overline{AB}$ جي ٻنهي طرفن ڏانهن قوس ڪيو.



(iii) هاڻ ٽپڪي A کي مرڪز وٺي ساڳي رداس سان $\overline{AB}$ جي ٻنهي طرفن ڏانهن قوس ڪڍو، جيڪي اڳ ۾ ڪڍيل قوسن کي ٽپڪن P ۽ Q تي ڪٽين ٿا.

(iv) P ۽ Q کي ملايو. $\overline{PQ}$ جيڪو $\overline{AB}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ آهي.

(v) قدم (ii) کان (iv) کي $\overline{BC}$ ۽ $\overline{AC}$ لاءِ ورجايو ته $\overline{ST}$ ۽ $\overline{LM}$ به ٽڪرا ملندا جيڪي $\overline{BC}$ ۽ $\overline{AC}$ جا ترتيبوار عمودي اڌ ڪندڙ آهن. اهڙي طرح $\overline{ST}$ ۽ $\overline{LM}$ گهربل عمودي اڌ ڪندڙ آهن.

(iv) ٽڪنڊي جا مڌيان ڪڍو.

مثال

مثال ڪو به ٽڪنڊو وٺي، ان ٽڪنڊي جا مڌيان ٺاهيو.

مليل: ٽڪنڊو ABC

گهربل: ٽڪنڊي ABC جا مڌيان ڪڍڻ.

جوڙجڪ:

(i) ٽڪنڊو ABC ٺاهيو.

(ii) پاسن $\overline{BC}$ ، $\overline{AB}$ ۽ $\overline{AC}$ جا وچيان ٽپڪا

D، E ۽ F تي ترتيبوار لهو.

(iii) A کي E سان، B کي F سان ۽ C کي D سان ملايو.

ته جيئن $\overline{AE}$ ، $\overline{BF}$ ۽ $\overline{CD}$ مليل ٽڪنڊي ABC جا مڌيان آهن جيڪي هڪ ٻئي کي ٽپڪي G تي ڪپين ٿا.

اهو معلوم ٿيو ته هر ٽڪنڊي جا مڌيان ساڳي ٽپڪي تي ملن ٿا ۽ انهن جي ملاپ جي ٽپڪي کي (Centroid) چئبو آهي. يعني هر مڌيان 2:1 ۾ ورهائجي وڃي ٿو. اصل ماپ سان اهو ثابت ڪري سگهجي ٿو ته

$$\frac{m\overline{AG}}{m\overline{GE}} = \frac{m\overline{BG}}{m\overline{GF}} = \frac{m\overline{CG}}{m\overline{GD}} = \frac{2}{1}$$


مشق 13.2

1. هڪ ٽڪنڊو ڪٽو ۽ ان جا مڌيان ٺاهيو. ثابت ڪريو ته اهي ساڳي ٽپڪي تي ملن ٿا.
2. هڪ ٽڪنڊو ڪٽو ۽ ان جا عمود ٺاهيو. ثابت ڪريو ته اهي ساڳي ٽپڪي تي ملن ٿا.
3. هڪ ٽڪنڊو ڪٽو ۽ ان جا اندريان ڪنڊن جا اڌڪنڊڙ ٺاهيو ۽ ثابت ڪريو ته اهي ساڳي ٽپڪي تي ملن ٿا.
4. ٽڪنڊو ABC ٺاهيو جنهن ۾ $m\overline{BC} = 6$ س.م، $m\overline{CA} = 4$ س.م، $m\overline{AB} = 5$ س.م ان جي ڪنڊن A ۽ B جا اڌڪنڊڙ ٺاهيو.
5. ٽڪنڊو PQR ٺاهيو جنهن ۾ $m\overline{PQ} = 5.7$ س.م، $m\overline{QR} = 6.4$ س.م، $m\overline{PR} = 4.4$ س.م آهي. ان جي چوٽي R ۽ Q کان عمود ٺاهيو.
6. ٽڪنڊو $m\overline{TU} = 7$ ٺاهيو جنهن ۾ $\angle U = 30^\circ$ س.م، $\angle T = 60^\circ$ س.م ABC ته ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪنڊڙ ٺاهيو ۽ ثابت ڪريو ته اهي ساڳي ٽپڪي تي ملن ٿا.
7. گوني ڪنڊ ٽڪنڊو $\angle B = 45^\circ$ ٺاهيو، جنهن ۾ $\angle C = 90^\circ$ $m\overline{CB} = 5$ س.م ۽ ان جا مڌيان ٺاهيو.
8. ٽڪنڊو $\triangle XYZ$ ٺاهيو، ان جا ٽيئي مڌيان ٺاهي ثابت ڪريو ته اهي هم ٽپڪا آهن.
 - (i) $m\overline{YZ} = 4.4\text{cm}$, $m\angle Y = 45^\circ$ and $m\angle Z = 75^\circ$
 - (ii) $m\overline{XY} = 4.6\text{cm}$, $m\overline{XZ} = 4.6\text{cm}$ and $m\angle Y = 60^\circ$
9. ٽڪنڊو $\triangle KLM$ ٺاهيو، جنهن ۾ $m\overline{KL} = 4.8$ س.م، $m\overline{LM} = 5.2$ س.م ۽ $m\overline{MK} = 4.5$ س.م ان جا عمود ٺاهي انهن جو هم ٽپڪي تي ملڻ جي چڪاس ڪريو.

13.2 برابر ايراضي واريون شڪليون


13.2.1 ٽڪنڊو ٺاهيو جيڪو ڏنل چوڪنڊي جي ايراضي جي برابر هجي.

مثال: ڏنل چوڪنڊي ABCD ۾ مليل ايراضي جي برابر هڪ ڪنڊ ٺاهيو. اسان کي خبر آهي ته ساڳي بنياد وارن سڀني ٽڪنڊن جي ايراضي برابر هوندي آهي. جن جو چوٽيون عمود کان بنياد تي هونديون آهن.



1. ABCD مليل چوڪنڊو آهي.
2. A ۽ C کي ملايو.
3. AC جي DE پورو ڇوٽ DE ٺاهيو جيڪو BC سان ملي.
4. E ۽ A کي ملايو ته گهربل ٽڪنڊو آهي E.


13.2.2 ڏنل ٽڪنڊي ۾ مليل ايراضي جي برابر مستطيل ٺاهيو.



مثال ڏنل ٽڪنڊي ۾ مليل ايراضي جي برابر هڪ مستطيل ٺاهيو.

1. هڪ ٽڪنڊو ABC ٺاهيو.
2. $\overline{BC}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ $\overline{PD}$ ٺاهيو.
3. $\overline{BC}$ جي پورو چوٽ $\overline{PQ}$ تي، A کان هڪ ليڪ ٺاهيو.
4. $m\angle PCQ = m\angle DCQ$ جي وٺو.
5. ته پوءِ CDPQ گهربل مستطيل آهي.

13.2.3 ڏنل مستطيل ۾ مليل ايراضي جي برابر چورس ٺاهيو.




مثال: مليل مستطيل ABCD ۾ ايراضي جي برابر هڪ چورس ٺاهيو.

1. جوڙجڪ لاءِ هيٺيان قدم آهن.
2. ABCD هڪ مليل مستطيل آهي.
3. $\overline{AD}$ پاسي کي E تائين وڌايو ته جيئن $m\overline{DE} = m\overline{CD}$ ٺهي.
4. $\overline{AE}$ کي M ٽڪي تي اڌ ڪريو.
5. M مرڪز وٺي $\overline{AM}$ رداس سان اڌ وڳل ٺاهيو.
6. $\overline{CD}$ کي وڌايو ته جيئن اهو اڌ وڳل کي F تي ملي.
7. هڪ پاسي $\overline{DF}$ تان هڪ چورس DFQP ٺاهيو جيڪو گهربل چورس هوندو.



13.2.4 مليل ماپ جي بنياد تي مساوي ايراضي جو ٽڪنڊو ٺاهيو.

جوڙجڪ لاءِ هيٺيان قدم آهن



1. ABC مليل ٽڪنڊو آهي.
 2. $\overline{AD}$ کي $\overline{EC}$ جي پورو چوٽ ٺاهيو.
 3. B مرڪز وٺي x رداس سان هڪ قوس ٺاهيو.
 4. جيڪو $\overline{AD}$ کي P تي ڪٽي.
 5. $\overline{EP}$ ۽ $\overline{CP}$ کي پاڻ ۾ ملايو.
- تہ پوءِ BCP گهربل ٽڪنڊو آهي.
- برابر بنياد $BP = x$ جو ٽڪنڊو ۽ مساوي ايراضي ٽڪنڊي جي آهي.

مشق 13.3

1. هڪ مستطيل ٺاهيو جنهن جو ڀروا پاسا ترتيبوار 2.5 س.م آهن.
2. هڪ چورس ٺاهيو جنهن جي ايراضي ڏنل مستطيل جي برابر آهي.
3. مستطيل جي ايراضي جي برابر چورس ٺاهيو جنهن جا ڀروا پاسا ترتيبوار 4.5 س.م ۽ 2.2 س.م آهن، چورس جي پاسن جي ماپ ڪريو ۽ ان جي ايراضي معلوم ڪري مستطيل جي ايراضي سان ڀيٽ ڪريو ۽ چڪاس ڪريو چورس جو گهيرا مستطيل جي گهيري کان ماپ ۾ گهٽ آهي.
4. ٽڪنڊو ٺاهيو، جنهن جو بنياد 4 س.م ۽ ٻيا ٻه پاسا هر هڪ 3.6 س.م ۽ 3.8 س.م آهن ان کي برابر ايراضي سان مستطيل ۾ تبديل ڪريو.
5. ٽڪنڊو ٺاهيو جنهن جو بنياد 6 س.م ۽ ٻيا پاسا هر هڪ 5 س.م ۽ 6 س.م آهن ڏنل ٽڪنڊي جي ايراضي برابر هڪ مستطيل ٺاهيو.

ورجائيل مشق 13

1. خال ڀريو.
 - (i) ٽڪنڊي جو وڏي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو _____ آهي.
 - (ii) هڪ ليڪ ٽڪر جيڪو ٽڪنڊي جي چوٽي سان ملي ۽ مخالف پاسي تي عمود هجي ته ان کي _____ چئبو آهي.
 - (iii) هڪ ليڪ ٽڪر جيڪو ٽڪنڊي جي چوٽي کان ٺاهي، سامهون واري پاسي جي وچين ٽپڪي سان ملي ته ان کي _____ چئبو آهي.



(iv) ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ آهن _____
 (v) ٻه يا ٻن کان وڌيڪ ٽڪنڊن کي يڪ سان چئبو جيڪڏهن انهن جو ڪنڊون برابر آهن ۽ انهن جي پاسن جون ماپون _____ آهن.
2. صحيح جو صا تي (۷) تڪ ڪريو.

(i) ٽڪنڊو جنهن جا ٽيئي پاسا يڪ سان آهن چئبو آهي _____.
 (a) اٿپور (b) گوني ڪنڊ
 (c) ٽپور پاسو (d) ٻپور پاسو
 (ii) هڪ چوڪنڊو جنهن جي هر هڪنڊ 90° جي برابر هجي ۽ سڀئي پاسا يڪ سان آهن. ان کي چئبو _____

(a) پورو چوٽ (b) مستطيل
 (c) ٽرئينيريم (d) چورس
 (iii) ٽڪنڊي جا مڌيان _____ آهن.

(a) هر ليڪ (b) يڪسان
 (c) هم ٽڪو (d) پورو چوٽ
 (iv) ٽپور پاسي ٽڪنڊي جا _____ عمود پاڻ ۾ يڪسان آهن.

(a) ٻه (b) ٽي
 (c) چار (d) ڪو به نه
 (v) مستطيل جون اريبون هڪ ٻي سان _____ آهن.

(a) اڌواڌ (b) ٽن حصن ۾ ورهائيل
 (c) گوني ڪنڊ تي ڪپيل (d) ڪو به نه
 (vi) ٽڪنڊي جا _____ هڪ ٻئي کي 2:1 جي نسبت ۾ ڪپين ٿا.

(a) عمود (b) ڪنڊن جا اڌ ڪندڙ
 (c) عمودي اڌ ڪندڙ (d) مڌيان

(vii) جيڪڏهن ٻپور پاسي ٽڪنڊي جي بنياد جي هر هڪ ڪنڊ 45° آهي ته ٽي ڪنڊ جي ماپ _____ آهي.

(a) 30° (b) 60°
 (c) 90° (d) 120°

(viii) جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ٽيئي مڌيان يڪسان آهن ته ٽڪنڊو _____ آهي.

(a) گوني ڪنڊ (b) ٽپور پاسو
 (c) ٻپور پاسو (d) سوڙهي ڪنڊ

(ix) جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ٻه _____ يڪسان آهن ته اهي ٽڪنڊو ٻپور پاسو ٿيندو.

(a) عمود (b) مڌيان
 (c) عمودي اڌ ڪندڙ (d) پاسا

خلاصو

- ◆ هن يونٽ ۾ اسان هيٺين شڪلين ۽ تعلق رکندڙ تصورن جي جوڙجڪ بابت سڳيو آهي.
- ◆ ٽڪنڊو ٺاهيو جنهن جا ٻه پاسا ۽ وچ واري ڪنڊ مليل هجي.
- ◆ ٽڪنڊو ٺاهيو جنهن جو هڪ پاسو ۽ ٻه ڪنڊون مليل هجن.
- ◆ ٽڪنڊو ٺاهيو جنهن جا ٻه پاسا ۽ ڪنهن هڪ پاسي جي سامهون واري ڪنڊ مليل آهي.
- ◆ ٽڪنڊي جي ڪنڊن جا اڌ ڪندڙ ٺاهي انهن جي هم ٽپڪي جي چڪاس ڪرڻ.
- ◆ مليل ٽڪنڊي جا عمود ٺاهي انهن جي هم ٽپڪي جي چڪاس ڪرڻ.
- ◆ مليل ٽڪنڊي جا عمودي اڌ ڪندڙ ٺاهيو، انهن جي هم ٽپڪي جي چڪاس ڪريو.
- ◆ ٽڪنڊي جا مڌيان ٺاهڻ ۽ انهن جي هم ٽپڪي جي چڪاس ڪرڻ.
- ◆ ڏنل ڇوڪنڊي جي ايراضي برابر ٽڪنڊي کي ٺاهڻ.
- ◆ ڏنل ٽڪنڊي جي ايراضي جي برابر مستطيل جي جوڙجڪ ڪرڻ.
- ◆ ڏنل مستطيل جي ايراضي جي برابر چورس جي جوڙجڪ ڪرڻ.
- ◆ ڏنل ماپ جي بنياد تي مساوي ايراضي جو ٽڪنڊو ٺاهڻ.
- ◆ ٻه يا ٽن کان وڌيڪ ليڪون هم ٽپڪي چڻيون، جيڪڏهن اهي مشترڪ ٽپڪي مان گذري ۽ ان ٽپڪي کي هم مرڪز ٽپڪو چئبو آهي.
- ◆ ٽڪنڊي جي ڪنهن جو اندريون اڌواڌ ڪندڙ ٽپڪي کي، ٽڪنڊي جو اندريون مرڪز (In centre) چئبو آهي.
- ◆ ٽڪنڊي جي پاسن جي عمودي اڌ ڪندڙ جي هم ٽپڪي کي احاطي جو مرڪز (Circum centre) چئبو آهي.
- ◆ مڌيان جو مطلب آهي ته اهڙا ليڪ جيڪي ٽڪنڊي جي چوٽين کي مخالف پاسي جي وچين ٽپڪن سان ملائين.
- ◆ ٽڪنڊي جي عمودي مرڪز (Ortho centre) جو مطلب آهي ٽڪنڊي جي ٽن عمودن جو هم ٽپڪو.

ايراضي سان تعلق رکندڙ سڌيان (Theorem Related with Area)

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي مطالعي کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ هيٺين سڌيان کي شامل نتيجن سان گڏ سمجھي سگھندا ۽ انهن کي استعمال ڪري لاڳاپيل حساب حل ڪندا.
- ◆ ساڳي بنياد ۽ ٻن پورو چوٽ ليڪن جي وچ ۾ لهندڙ پورو چوٽ چوڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.
- ◆ برابر بنياد ۽ هڪ جهڙي عمود سان لهندڙ پورو چوٽ چوڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.
- ◆ هڪ جهڙي بنياد ۽ هڪ جهڙي عمود سان لهندڙ ٽڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.
- ◆ برابر بنياد ۽ هڪ جهڙي عمود سان لهندڙ ٽڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.


تعارف

اسان ايراضي سان تعلق رکندڙ سڌيا پڙهنداسين.

14.1 ايراضي سان تعلق رکندڙ سڌيان

سڌيان 14.1.1

ساڳي بنياد ۽ ٻن هڪ جهڙين پورو چوٽ ليڪن جي وچ ۾ نهندڙ پورو چوٽ چوڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.



چوڪنڊا ايراضي ۾ پورو چوٽ ABCD ۽ ABEF ۾ پورو چوٽ

چوڪنڊا آهن جن جو بنياد $\overline{AB}$

هڪ جهڙو آهي ۽ پورو چوٽ

ليڪون $\overline{AB}$ ۽ $\overline{DE}$ به ساڳيون

آهن.

گهربل: پورو چوٽ چوڪنڊا ABCD ۽ ABEF ايراضي

۾ برابر آهن يعني $ABEF \blacksquare ABCD$

ثابتي:

دليل

ABCD جا سامهون پاسا برابر آهن.

ABCD جون نسبتي ڪنڊون

ABEF جون نسبتي ڪنڊون

پ ک ک = پ ک ک

يڪسان شڪليون ايراضي ۾ برابر آهن.

ساڳي ايراضي ٻنهي پاسي جوڙ ڪرڻ.

$\blacksquare ABCD = \blacksquare ABED + \triangle BCE$

$\blacksquare ABEF = \triangle ADF + \blacksquare ABED$

بيان

مطابقت ۾ $\triangle ADF \leftrightarrow \triangle BCE$

$m\overline{BC} = m\overline{AD}$... (i)

$m\angle BCE = m\angle ADF$... (ii)

$\angle E \cong \angle F$... (iii)

$\triangle BCE \cong \triangle ADE$

$\triangle ADF \cong \triangle BCE$

$\triangle ADF + \blacksquare ABED = \triangle BCE + \blacksquare ABED$

$\blacksquare ABEF = \blacksquare ABCD$

تنهنڪري

Q.E.D.

شامل نتيجو:


(i) پورو چوٽ چوڪنڊي جي ايراضي مستطيل جي ايراضي جي برابر آهي جيڪو ساڳي بنياد ۽ ساڳي عمود سان آهي.

ستيان 14.1.2

برابر بنياد ۽ هڪ جهڙي عمود سان ٺهندڙ پورو چوٽ چوڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.

مليل: $ABCD$ ۽ $EFGH$ ۾ پورو چوٽ چوڪنڊا آهن.

جن جا بنياد $\overline{BC}$ ۽ $\overline{FG}$ برابر آهن ۽ عمود پٽ برابر آهن.



گهربل: $EFGH \blacksquare ABCD = \blacksquare$

جوڙجڪ: $EFGH$ ۽ $ABCD$ پورو چوٽ چوڪنڊا

اهڙي طرح ٺاهيو ته جيئن سندن برابر بنياد

$\overline{BC}$ ۽ $\overline{FG}$ ساڳي سڌي لڪ تي هجن پوءِ

B کي E سان ۽ C کي H سان ملايو.


ثابتي:

دليل	بيان
هنن جا عمود برابر آهن.	پورو چوٽ چوڪنڊا $EFGH$ ۽ $ABCD$
	پورو چوٽ ٽڪڙن جي وچ ۾ آهن.
	ته پوءِ A, D, E ۽ H ٽپڪا سڌي لڪ تي
	آهن جيڪا $\overline{BC}$ جي پورو چوٽ آهي.
مليل	$m \overline{BC} = m \overline{FG}$
$EFGH$ هڪ پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.	$m \overline{BC} = m \overline{EH}$
پورو چوٽ ٽڪڙا هڪ ٻي جي پورو چوٽ	$m \overline{BC} = m \overline{EH}$ پورو چوٽ آهن.
هن.	
هڪ چوڪنڊو، ٻن پورو چوٽ پاسن سان	تنهنڪري $EBCH$ هڪ پورو چوٽ
پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.	چوڪنڊو آهي.
	هاڻ
ستيان 14.1.1	$\blacksquare ABCD = \blacksquare EBCH \dots (i)$
ستيان 14.1.1	$\blacksquare EFGH = \blacksquare EBCH \dots (ii)$
(i) ۽ (ii) مان	$\blacksquare EFGH = \blacksquare ABCD$

Q.E.D

ستيان 14.1.3

ساڳي بنياد ۽ ساڳي عمود سان ٺهندڙ ٽڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.



مليل:

ٽڪنڊا ABC ۽ DBC، ساڳي بنياد $\overline{BC}$ ۽ پورو چوٽ ليڪن $\overline{BC}$ ۽ $\overline{AD}$ تي آهن.

گهربل:

$$\triangle ABC = \triangle DBC$$

جوڙجڪ: $\overline{BE}$ پورو چوٽ $\overline{CL}$ جي ٺاهيو، جيڪي $\overline{AL}$

تي ملن ۽ انهن کي وڌايو E تائين. $\overline{CL}$ پورو چوٽ


ثابتي: $\overline{BL}$ جي ٺاهيو جيڪو $\overline{AL}$ تي ملي ۽ F تائين وڌايو.

دليل	بيان
جوڙجڪ	BCAE پورو چوٽ چوڪنڊو
اڀر $\overline{AL}$ پورو چوٽ چوڪنڊي کي تقسيم ڪري ٿي. BCAE ٻن ٽڪنڊن جي ايراضي جي برابر آهي.	$\triangle ABC = \frac{1}{2} (\blacksquare BCAE) \dots (i)$
جوڙجڪ	ساڳي طرح BCFD ٻو هڪ پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.
اڀر $\overline{CD}$ پورو چوٽ چوڪنڊي کي تقسيم ڪري ٿي. BCFD ٻن ٽڪنڊن جي ايراضي جي برابر آهي.	$\triangle DBC = \frac{1}{2} (\blacksquare BCFD) \dots (ii)$
ستيان 14.1.1	$\triangle DBC = \frac{1}{2} (\blacksquare BCFD) \dots (ii)$
	تم پوءِ
	$\blacksquare BCAE = \blacksquare BCFD \dots (iii)$

Q.E.D

ستيان 14.1.4

برابر بنياد ۽ برابر سان ٺهندڙ ٽڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.




مليل:

ٽڪنڊا ABC ۽ DEF، جيڪي

ترتيبوار $\overline{BC}$ ۽ $\overline{EF}$ برابر بنياد ۽

عمود تي آهن.



گهربل:

$$\triangle ABC = \triangle DEF$$

جڙجڪ: $\overline{AD}$ ۽ $\overline{BF}$ ٺاهيو جنهن ۾ B, C, E, F ٽپڪا هجن.

ٽڪنڊا ABC ۽ DEF برابر بنياد $\overline{BC}$ ۽ $\overline{EF}$ سان سڌي ليڪ تي آهن. $\overline{BXPCAX}$ ۽ $\overline{EYPFED}$ ٺاهيو ته جيئن ٽپڪا X ۽ Y $\overline{AD}$ تي هجن.

ثابتي:


بيان	دليل/سبب
ٽڪنڊا ABC ۽ DEF ساڳين پورو چوٽ ليڪن تي آهن.	مليل (عمود برابر آهن)
$\angle BAC = \angle FED$... (i)	سڌيان 14.1.2
$\angle ABC = \frac{1}{2}(\angle BAC)$... (ii)	پورو چوٽ چوڪنڊي جي اريب ٻن برابر ٽڪنڊن ۾ ورهائي تي
$\angle DEF = \frac{1}{2}(\angle FED)$... (iii)	ساڳيو سبب
تنهنڪري $\angle DEF = \angle ABC$	(i), (ii), (iii) مان

Q.E.D

شامل نتيجو:


ساڳي سڌي ليڪ تي ٺهندڙ ٽڪنڊا جن جون ساڳيو چوٽيون ۽ برابر بنياد هجن ته ايراضي ۾ برابر ٿيندا.

مشق 14.1



1. مليل شڪل، $ABCD$ هڪ پورو چوٽ چوڪنڊو ۽ $EFCD$ هڪ مستطيل آهي جنهن ۾ $AL \perp DC$ ثابت ڪريو ته

- (i) $\square ABCD = \square EFCD$
(ii) $\square ABCD = m\overline{DC} \times m\overline{AL}$



2. مليل شڪل ۾، جيڪڏهن چوڪنڊي جي اريون ان کي چئن برابر ٽڪنڊن ۾ ورهائين ته ٻڌايو ته اهو پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.

3. مليل شڪل ۾ $AD \parallel BC$ هڪ گولي ڪنڊ ٽڪنڊو آهي B، چوٽي کان، جنهن ۾ س م ۽ $m\overline{BC} = 7$ آهي. $m\overline{AC} = 11$ جي ايراضي معلوم ڪريو.

4. ثابت ڪريو تو ٽڪنڊي جا مٿيان، ان کي ٻن برابر ايراضي وارن ٽڪنڊن ۾ ورهائڻ. صورت ٻڌايو ۽ سوال جو نالو استعمال ڪريو.

5. ثابت ڪريو ته مستطيل جي آمهون سامهون پاسن جي وچين ٽيڪن سان ملائيندڙ ليڪ ٽڪر ان کي ٻن برابر مستطيلن ۾ تقسيم ڪندو.

6. جيڪڏهن ٻه برابر ايراضي وارا پورو چوٽ چوڪنڊا جن جو ساڳيو ۽ برابر بنياد هجي ته انهن جا عمود به برابر ٿيندا.

7. ثابت ڪريو ته ٽپور پاسي ٽڪنڊي جو ڪنڊ جو اڌ ڪندڙ ان کي ٻن برابر ايراضي وارن ٽڪنڊن ۾ تقسيم ڪندو.

8. ثابت ڪريو ته رامبس، ان جي اربين سان چئن برابر ايراضي وارن ٽڪنڊن ۾ تقسيم ٿيندو.

ورجایل مشق

1. هيٺ مليل لاءِ صحيح جي لاءِ T ۽ غلط لاءِ F ان جي سامهون ٽڪ ڪريو.

- (i) بند شڪل جي ايراضي مطلب، اهو حصو جيڪو ليڪن سان شڪل کي بند ڪري. T/F
- (ii) مستطيل جي اريب، ان کي ٻن يڪسان ٽڪنڊن ۾ ورهائي ٿي. T/F
- (iii) يڪسان شڪلين کي مختلف ايراضي هوندي آهي. T/F
- (iv) پورو چوٽ چوڪنڊي جي ايراضي بنياد ۽ اوچائي جي ضرب ايت برابر آهي. T/F
- (v) ٽڪنڊي مڌيا جو مطلب انهن جي چوٽي کان، سامهون وري پاسي تي عمود آهي. T/F
- (vi) ٻن پورو چوٽ ليڪن جو عمودي مفاصلو ڪنهن وقت مختلف به ٿي سگهي ٿو. T/F
- (vii) چوٽي واري ٽپڪي کان ٺاهيل عمود هميشه سامهون پاسي کي اڌو اڌ ڪندو. T/F
- (viii) ٻه ٽڪنڊا ايراضي ۾ برابر ٿيندا، جيڪڏهن انهن جو ساڳيو بنياد ۽ برابر عمود هجن. T/F

2. صحيح جواب کي (✓) ٽڪ ڪريو.

- (i) جيڪڏهن ٻن ليڪن جي وچ جو عمودي مفاصلو ساڳيو آهي ته اهي ليڪون _____ آهن.
- (a) هڪ ٻئي تي عمود (b) هڪ ٻئي سان پورو چوٽ
- (c) هڪ ٻئي کي ڪپيندڙ (d) ڪو به نه
- (ii) جيڪڏهن ٻن ٽڪنڊن جي ايراضي برابر آهي ته پوءِ _____ يڪسان پڻ ٿيندا.
- (a) ضروري نه آهي. (b) ضروري آهي ته
- (c) بلڪل (d) ڪو به نه
- (iii) ٽڪنڊي جي چوٽيءَ واري ٽپڪي کان، سامهون پاسي تي ٺهندڙ عمود کي _____ چئبو آهي.
- (a) مڌيان (b) عمودي اڌ ڪندڙ
- (c) عمود (d) ڪنڊ جو اڌ ڪندڙ

(iv) پورو چوٽ چوڪنڊا جن جو ساڳيو بنياد ۽ ساڳيو عمود هجي _____ آهن.

- (a) يڪسان
(b) ايراضي ۾ برابر
(c) هڪ جهڙا
(d) هي سڀ

(v) پورو چوٽ چوڪنڊن جا برابر بنياد هجن ته انهن جي ساڳي ايراضي ٿيندي
جيڪڏهن:

- (a) انهن جو عمود برابر آهن
(b) انهن جو عمود ساڳيو آهي
(c) اهي ساڳي پورو چوٽ ليڪن جي وچ ۾ هوندا
(d) هي سڀ

(vi) $\triangle ABC$ ۽ $\triangle DEF$ جا برابر بنياد ۽ برابر عمود هجن ته پوءِ اهي ٽڪنڊا
_____ آهن.

- (a) ايراضي ۾ برابر
(b) يڪسان
(c) هڪ جهڙا
(d) هن مان ڪو به نه

خلاصو

- ♦ هن يونٽ ۾ اسان ڪجهه ضروري عملن کي ظاهر ۽ بيان ڪيو آهي ۽ هيٺيان سڌيان انهن جي شامل نتيجن سان گڏ ثابت ڪيا آهن.
- ♦ ساڳي بنياد ۽ ٻن پورو چوٽ ليڪن جي وچ ۾ لهندڙ پورو چوٽ چوڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.
- ♦ برابر بنياد ۽ هڪ جهڙي عمود سان لهندڙ پورو چوٽ چوڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.
- ♦ هڪ جهڙي بنياد ۽ هڪ جهڙي عمود سان لهندڙ ٽڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.
- ♦ برابر بنياد ۽ هڪ جهڙي عمود سان لهندڙ ٽڪنڊا ايراضي ۾ برابر آهن.
- ♦ شڪل جي ايراضي حص مطلب، بند شڪل جو اهو حصو جيڪو حد جي ليڪن سان بند ٿيل هجي.
- ♦ مستطيلي حد جو مطلب ٽڪنڊن ۽ انهن جي اندرين جو ميلاپ.
- ♦ ٽڪنڊي جي ايراضي جو مطلب، اها ايراضي جيڪا ٽڪنڊي جي حدن تي هجي.
- ♦ ٽڪنڊي جي اوچائي يا عمود جو مطلب ته عمودي مفاصلو جيڪو بنياد کان ان جي سامهون واري چوٽي تائين هجي.

ٽڪنڊي جي پاسي جو واڌارو (Projection of a Side of a Triangle)

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◆ ڪنهن ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ ويڪري ڪنڊ جي سامهون واري پاسي جو چورس، ٻنهي سوڙهين ڪنڊن وارن پاسن جي چورس جي جوڙ سان گڏ مستطيل تي مشتمل هڪ پاسي ۽ ان واڌاري جي ٻيٽ جي برابر آهي.
- ◆ ڪنهن ٽڪنڊي ۾ سوڙهي ڪنڊ جي سامهون واري پاسي جو چورس، سوڙهي ڪنڊ جي انهن گهٽيل پاسن جي چورس جي ڪٽ سان گڏ مستطيل جي هڪ پاسي ۽ ان جي واڌاري جي ٻيٽ جي برابر آهي.
- ◆ ڪنهن ٽڪنڊي ۾ ڪن به ٻن پاسن جي چورس جو جوڙ، ٽئي پاسي جي اڌ جي چورس سان گڏ، ان پاسي کي اڌواٽ ڪندڙ مڌيان جي چورس جي ٻيٽ جي برابر آهي.




15.1 تکندي جي پاسي جو واڌارو

هيٺيان سڌيان، شامل نندن سان گڏ سمجهي انهن جي استعمال سان لاڳاپيل حساب ڪريو.

15.1.1 سڌيان

ڪنهن ويڪري ڪنڊ ٽنڊي ۾ ويڪري ڪنڊ جي سامهون واري پاسي جو چورس، ٻنهي سوڙهين ڪنڊن وارن پاسن جي چورس جي جوڙ سان گڏ مستطيل تي مشتمل هڪ پاسي ۽ ان جي واڌاري جو پيل جي برابر آهي.



مثال: ٽڪنڊو $\triangle ABC$ ، جنهن جي ويڪري ڪنڊ A چوٽي آهي.

$$a^2 = b^2 + c^2 + 2cx$$

جوڙجڪ: $\overline{BA}$ تي هڪ عمود $\overline{CD}$ ٺاهيو

جنهن ۾ $\overline{AD}$ وڌارو آهي $\overline{BA}$ جو ۽ ان کي $\overline{AC}$ سان ملايو جيئن

$$m\overline{BC} = a, m\overline{CA} = b, \text{ ۽ } cx, m\overline{AD} = x \text{ ۽ } m\overline{CD} = h.$$


ثابتي

سبب / دليل	بيان
جوڙجڪ	گوني ڪنڊ ٽڪنڊي $\triangle CDA$ ۾
پيٿاگورس سڌيان مطابق	$m\angle CDA = 90^\circ$
مفروزي طور	تنهنڪري $(m\overline{AC})^2 = (m\overline{AD})^2 + (m\overline{DC})^2$
جوڙجڪ	جيڪو (i) $b^2 = x^2 + h^2$
پيٿاگورس سڌيان مطابق	گوني ڪنڊ ٽڪنڊي $\triangle CDB$ ۾
	$m\angle CDB = 90^\circ$
	تنهنڪري $(m\overline{BC})^2 = (m\overline{BD})^2 + (m\overline{CD})^2$
	جيڪو (i) $a^2 = (c+x)^2 + h^2$
	يا (ii) $a^2 = c^2 + 2cx + x^2 + h^2$
	$a^2 = c^2 + 2cx + b^2$
	ته پوءِ $(\overline{BC})^2 = (\overline{AB})^2 + 2(\overline{AB})(\overline{AD}) + (\overline{AC})^2$

Q.E.D

مثال: ٽڪنڊو $\triangle ABC$ جنهن جي ويڪري ڪنڊ A چوٽي تي آهي. جيڪڏهن $\overline{CD}$ ، D ٽپڪي تائين وڌيل پاسي $\overline{BA}$ تي عمود هجي ۽ $m\overline{AC} = m\overline{AB}$ آهي ته پوءِ $(m\overline{BC})^2 = 2(m\overline{AB})(m\overline{BD})$

ٿيندو.



مليل: ٽڪنڊو $\triangle ABC$ جنهن ۾ ڪنڊ $\angle A$ هڪ ويڪري ڪنڊ آهي ۽ $\overline{CD} \cdot \overline{AC} = m\overline{AB}$ عمود آهي $\overline{BA}$ تي جنهن کي D تائين وڌايو.

$$(m\overline{BC})^2 = 2(m\overline{AB})(m\overline{BD})$$

ثابتي.

Reasons	بيان
سڌيان 15.1.1	ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾
$m\overline{AC} = m\overline{AB}$ مليل	$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD}) + (m\overline{AC})^2$
$2m\overline{AB}$ کي مشترڪ ڪرڻ سان	$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD}) + (m\overline{AB})^2$
$m\overline{BD} = m\overline{AD} + m\overline{AB}$	$(m\overline{BC})^2 = 2(m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$
	$(m\overline{BC})^2 = 2m\overline{AB}(m\overline{AB} + m\overline{AD})$
	$(m\overline{BC})^2 = 2(m\overline{AB})(m\overline{BD})$


Q.E.D

مشق 15.1

1. $\overline{AB}$ جي ڊيگهه ۽ ٽڪنڊي ABC جي ايراضي معلوم ڪريو جڏهن

$$m\overline{AC} = 3\text{cm}, m\overline{BC} = 6\text{cm} \text{ and } m\angle C = 120^\circ \quad (i)$$

$$m\overline{CD} = m\overline{BC} \cos (180^\circ - m\angle C) \quad (ii)$$



$$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AC})^2 + (m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$$

2. ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾ $m\overline{AC}$ جي ڊيگهه معلوم ڪريو، جڏهن $m\overline{BC} = 6\text{cm}$ س.م ۽ $m\overline{AB} = 4\sqrt{2}\text{ cm}$ آهي. $m\angle ABC = 135^\circ$ جيڪڏهن ممڪن هجي ته ٽڪنڊي $\triangle ABC$ جي ايراضي معلوم ڪريو.

3. ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾ $m\overline{AC}$ جي ڊيگهه معلوم ڪريو جڏهن ممڪن هجي ته ٽڪنڊي ABC جي $m\overline{BC} = 6\sqrt{2}\text{ cm}$ ايراضي معلوم ڪريو.

سڌيان 15.1.2

ڪنهن ٽڪنڊي ۾ سوڙهي ڪنڊ جي سامهون واري پاسي جو چورس سوڙهي ڪنڊ جي، انهن

گهٽيل

پاس جي چورس جي ڪٽ سان گڏ مستطيل جي هڪ پاسي ان جي واڌاري جي ٻيٽ جي برابر آهي،

مليل: ٽڪنڊو ABC

$\angle CAB$ سوڙهي ڪنڊ آهي A چوٽي تي $\triangle ABC$

جنهن ۾ $m\overline{AB} = c$ ۽ $m\overline{AC} = b$ ۽ $m\overline{BC} = a$

گهٽيل:


$$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AC})^2 + (m\overline{AB})^2 - 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$$

جيڪو $i.e. a^2 = b^2 + c^2 - 2cx$

جوڙجڪ: $\overline{AC}$ تي عمود $\overline{CD}$ ٺاهيو، ته جيئن $\overline{AB}$

واڌارو آهي $\overline{AC}$ جو $\overline{AB}$ تي،

$$m\overline{CD} = h \quad m\overline{AD} = x \quad \text{۽}$$



ثابتي:

بيان	سبب / دليل
گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ΔCDA ۾ $m\angle CDA = 90^\circ,$ تنهنڪري $(m\overline{AC})^2 = (m\overline{AD})^2 + (m\overline{CD})^2$ جيڪو (i) $b^2 = x^2 + h^2$ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ΔCDB ۾ $m\angle CDB = 90^\circ$ $(m\overline{BC})^2 = (m\overline{BD})^2 + (m\overline{CD})^2$ جيڪو $a^2 = (c - x)^2 + h^2$ $a^2 = c^2 - 2cx + x^2 + h^2$ $a^2 = c^2 - 2cx + b^2$ يا $a^2 = c^2 + b^2 - 2cx$ تنهنڪري $(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AC})^2 + (m\overline{AB})^2 - 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$	جوڙجڪ پيٿاگورس سڌيان مطابق مفروضي طور جوڙجڪ پيٿاگورس سڌيان مطابق شڪل مان $\therefore m\overline{BD} = m\overline{AB} - m\overline{AD}$ مساوات استعمال ڪرڻ سان

Q.E.D

اپولونيس ۽ اپولونيس جا سڌيان



اپولونيس هڪ عظيم جاميٽري ۽ فلڪيات جو ماهر هو.

اسان هن جو مشهور سڌيان بيان ڪري ثابت ڪريون ٿا.

سڌيان 15.1.3 (اپولونيس سڌيان)

ڪنهن ٽڪنڊي ۾ ڪن به ٻن پاسن جي چورس جو جوڙ، ٽئي پاسي جي اڌ جي چورس سان ڪڍ

ان پاسي کي اڌو ڪندڙ مڌيان جي چورس جي پيٽ جي برابر آهي.



مليل: ٽڪنڊو $\triangle ABC$ جنهن ۾ $\overline{AD}$ سڌيان $\overline{BC}$ کي ڏيکي ٿي اڌو ڪري ٿو.

اهڙي طرح جو $m\overline{BD} = m\overline{CD}$.

$$(m\overline{AB})^2 + (m\overline{AC})^2 = 2(m\overline{BD})^2 + 2(m\overline{AD})^2$$

جوڙجڪ: $\overline{AF} \perp \overline{BC}$ ناهيو.

ثابتي:


سبب / دليل	بيان
$\triangle ADF$ گوني ڪنڊ ٿڪنڊو آهي جنهن جي F گوني ڪنڊ آهي. جوڙجڪ.	ٿڪنڊي $\triangle ADB$ ۾ جڏهن $\angle ADB$ سوڙهي آهي. تنهنڪري
سڌيان 15.1.2 کي استعمال ڪري.	$(m\overline{AB})^2 = (m\overline{BD})^2 + (m\overline{AD})^2 - 2(m\overline{BD})(m\overline{FD}) \dots (i)$
سپليمنيٽ $\angle ADB$ جي	هان ٿڪنڊي $\triangle ADC$ ۾ جنهن ۾ $\angle ADC$ ويڪري ڪنڊ آهي D تي تنهنڪري
سڌيان 15.1.1 $m\overline{CD} = m\overline{BD}$	$(m\overline{AC})^2 = (m\overline{CD})^2 + (m\overline{AD})^2 + 2(m\overline{CD})(m\overline{FD})$
(i) ۽ (ii) کي جوڙ ڪرڻ سان	$(m\overline{AC})^2 = (m\overline{BD})^2 + (m\overline{AD})^2 + 2(m\overline{BD})(m\overline{FD}) \dots (ii)$
eqs. (i) and (ii)	تنهنڪري
	$(m\overline{AB})^2 + (m\overline{AC})^2 = 2(m\overline{BD})^2 + 2(m\overline{AD})^2$

Q.E.D

مشق 15.2

1. ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾ $m\angle A = 30^\circ$ ته ثابت ڪريو ته

$$(\overline{mBC})^2 = (\overline{mAC})^2 + (\overline{mAB})^2 = (\overline{mAC})^2 + (\overline{mAB})^2 - \sqrt{3}(\overline{mAB})(\overline{mAC}).$$



2. ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾ حل ڪريو جڏهن $m\angle A = 30^\circ$ ۽ $\overline{mAC} = 5\text{cm}$ س.م. ۽ $\overline{mBC} = 6\text{cm}$ س.م.

3. ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾ حل ڪريو جڏهن $m\angle A = 30^\circ$ س.م. ۽ $b = 8$ ته معلوم ڪريو

4. ٽڪنڊي جي مليل پاسن 3 س.م. ۽ 4 س.م. سان ٽڪنڊو سوڙهي ڪنڊ، ويڪري ڪنڊ يا گوني ڪنڊ ٿيندو معلوم ڪريو.

5. ٽڪنڊي جي مليل پاسن 4 س.م. ۽ 7 س.م. سان ٽڪنڊو ويڪري ڪنڊ، سوڙهي ڪنڊ يا گوني ڪنڊ ٿيندو معلوم ڪريو.

ورجائيل مشق 15

1. خال ڀريو.

(i) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾ $(\overline{mAC})^2 + \underline{\hspace{2cm}} = (\overline{mAB})^2$

(ii) ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾، ٻه پاسا 4 س.م. جي برابر آهي ان کي چئبو $\underline{\hspace{2cm}}$ ٽڪنڊو.

(iii) ٽڪنڊي $\triangle ABC$ ۾ $m\angle B = 90^\circ$ ته $(\overline{mAB})^2 + (\overline{mBC})^2 = \underline{\hspace{2cm}}$



(iv) 8 س.م، 15 س.م ۽ 17 س.م جا پاسا آهن.

2. ٽڪنڊي ΔABC ۾ $\overline{AC} = 3$ س.م، $\overline{BC} = 6$ س.م ۽ $\angle C = 120^\circ$ ته معلوم ڪريو.

خلاصو



ڪنهن ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ ويڪري ڪنڊ جي سامهون واري پاسي جو چورس، ٻنهي سوڙهين ڪنڊن وارن پاسن جي چورس جي جوڙ سان گڏ مستطيل تي مشتمل هڪ پاسي ۽ ان واڌاري جي ٻيٽ جي برابر آهي.

ڪنهن ٽڪنڊي ۾ سوڙهي ڪنڊ جي سامهون واري پاسي جو چورس، سوڙهي ڪنڊ جي انهن گهٽيل پاسن جي چورس جي ڪٽ سان گڏ مستطيل جي هڪ پاسي ۽ ان جي واڌاري جي ٻيٽ جي برابر آهي.

ڪنهن ٽڪنڊي ۾ ڪن به ٻن پاسن جي چورس جو جوڙ، ٽئي پاسي جي اڌ جي چورس سان گڏ، ان پاسي کي اڌواٽ ڪندڙ مڌيان جي چورس جي ٻيٽ جي برابر آهي.

KARV



يونٽ 16

تجزياتي / محددتي، جاميٽري جو تعارف Introduction to Coordinate Geometry / Analytical Geometry

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هن يونٽ جي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- تجزياتي جاميٽري جي تعريف ۽ وضاحت ڪرڻ.
- مفاصلي جي فارمولا کي حل ڪري، ڪارٽيسي مٿاڇري ۾ مليل ٻن ٽپڪن جي وچ ۾ مفاصلو معلوم ڪندا.
- فاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ٻن ٽپڪن جي وچ ۾ مفاصلو معلوم ڪري سگهن.
- هم ليڪ ٽپڪن جي تعريف ڪري، هم ليڪ ۽ غير هم ليڪ ٽپڪن ۾ فرق ڪري سگهن.
- مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ٽي يا وڌيڪ ٽپڪا هم ليڪ ٽپڪا آهن.
- مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ثابت ڪن ته ٽي غير هم ليڪ ٽپڪا ناهين ٿا.
- ٽپور پاسو ٽڪنڊو
- ٽپور پاسو ٽڪنڊو
- گوني ڪنڊ ٽڪنڊو
- مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ثابت ڪندا ته، چار غير هم ليڪ ٽپڪا ناهين ٿا.
- هڪ چورس
- مستطيل
- پورو چوٽ چوڪنڊو
- ٻن قليل ٽپڪن کي ملائيندڙ جو وچ وارو ٽپڪو معلوم ڪرڻ لاءِ فارمولا جي سڃاڻپ ڪري سگهندا.
- مفاصلي جو فارمولا ۽ وچ واري ٽپڪي معلوم ڪرڻ جو فارمولا استعمال ڪري جاميٽري سان تعلق رکندڙ مختلف نتيجن کي حل ڪري چڪاس ڪندا.



تعارف

ڪارٽيسي محدد (Coordinate) 17 صدي ۾ (بيني ڊيڪاٽر لاطينگي نالو ڪارٽيسوس) ايجاد ڪيو هن الجبرا جي وچ ۾ پهريون ڀيرو منظم ڳانڍاپو مهيا ڪيو، جنهن رياضي جي ميدان ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو ڪارٽيسي محدد نظام استعمال ڪري اسان جاميٽري جون شڪليون (جهڙوڪ ليڪون ۽ موڙ) مساواتن سان بيان ڪري سگهون ٿا.

16.1 مفاصلي جو فارمولا

16.1.1 محدد جاميٽري جي وصف ۽ وضاحت ڪريو.

محدد جاميٽري رياضي جي اهم ۽ دلچسپ شاخن مان هڪ آهي. خاص طور تي اسڪول ۾ رياضي جي لاءِ ان جي مرڪزي حيثيت آهي اها الجبرا ۽ جاميٽري ۾ گراف، ليڪن ۽ موڙن تعلق کي مهيا ڪري ٿي. محدد نظام جي مدد سان، جاميٽري جي الجبري مطالعي کي محدد جاميٽري / تجرباني جاميٽري چئبو آهي.

هي جاميٽري جي حسابن کي الجبري صورت ۾ حل ڪرڻ ۾ مدد ڏي ٿو ۽ الجبرا ۾ جاميٽري جو سڃاڻپ ڏي ٿو. اهو جاميٽري جو حصو آهي جنهن ۾ عددن جا ترتيب ڏنل جوڙا مٿاڇري تي ٽپڪي کي جڳهه کي بيان ڪن ٿا. هتي محدد جاميٽري جو تصور (ڪارٽيسي جاميٽري) ۽ ان جون مساواتون، فارمولا واضح ڪيا ويندا.

16.1.2 ڪارٽيسي مٿاڇري ۾ ٻن ٽپڪن جي وچ ۾ مفاصلو ڪيئن لاءِ مفاصلي جو فارمولا حاصل ڪريو.


بيان:

ٻن ٽپڪن جي وچ ۾ مفاصلو $P_1(x_1, y_1)$ ۽ $P_2(x_2, y_2)$ کي $|P_1P_2|$ سان ظاهر ڪيو ويندو آهي جنهن جي هن طرح تعريف آهي.

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

مفاصلي جي فارمولا جو حل:

فرض ڪريو ته $P_1(x_1, y_1)$ ۽ $P_2(x_2, y_2)$



ٻه مٿاڇري تي ٽپڪا آهن.

P_1 ۽ P_2 وٽان، $-x$ محور تي $\overline{P_1A}$ ۽ $\overline{P_2A}$ عمود ٺاهيو ۽ $-x$ محور جي پوروڇوٽ $\overline{P_1C}$ پڻ ٺاهيو.

$$|\overline{P_1C}| = |\overline{AB}| = |\overline{OB}| - |\overline{OA}| = |x_2 - x_1|$$

$$|\overline{P_2C}| = |\overline{P_2B}| - |\overline{BC}| = |y_2 - y_1|$$

ΔP_1CP_2 کي گوني ڪنڊ ٽڪنڊو سمجهيو. ۽ پيٿاگورس سڌيان استعمال ڪريو.

$$\therefore |\overline{P_2C}|^2 = |\overline{P_1C}|^2 + |\overline{P_2C}|^2$$

$$\Rightarrow |\overline{P_1P_2}|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$\Rightarrow |\overline{P_1P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

نوٽ: مفاصلي جو فارمولا اصل نقطي $P(x, y)$ جو آهي

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

16.1.3 ٻن مليل ٽپڪن جو مفاصلو معلوم ڪرڻ لاءِ مفاصلي وارو فارمولا استعمال ڪريو.

هيٺيان مثال مفاصلي واري فارمولا جي استعمال ڪرڻ کي سمجهڻ ۾ مدد ڪندا.

مثال 01 ٻن ٽپڪن $P(2, 3)$ ۽ $Q(-4, 5)$ جي وچ ۾ مفاصلو معلوم ڪريو.

حل: مفاصلي وارو فارمولا استعمال ڪري $|\overline{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ هتي

$$(x_1, y_1) = (2, 3), (x_2, y_2) = (-4, 5)$$

$$\therefore |\overline{PQ}| = \sqrt{(-4 - 2)^2 + (5 - 3)^2}$$

$$\Rightarrow |\overline{PQ}| = \sqrt{(-6)^2 + (2)^2} = \sqrt{36 + 4}$$

$$\Rightarrow |\overline{PQ}| = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$



مثال 02

هڪ گول 5 ايڪي رداس جو مرڪز $C(3,2)$ سان ٺاهيو ويو جنهن تي $L(6,6)$, $M(0, -1)$ ۽ $N(-2, -3)$ ٽيڪا مليل آهن معلوم ڪريو ته ڪهڙو ٽيڪو گول تي نه آهي (سبب ڏيو).

حل:

$C(3,2)$ گول جو مرڪز 5 ايڪا رداس سان آهي ۽ $L(6,6)$, $M(0, -1)$ ۽ $N(-2, -3)$ ٽي مليل ٽيڪا آهن اسان کي خبر آهي ته اسان کي C کان L , M ۽ N تائين ترتيبوار مفاصلو معلوم ڪرڻو آهي، جنهن لاءِ مفاصلي جو فرمولا استعمال ڪريو.

$$\begin{aligned}\therefore |CL| &= \sqrt{(6-3)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \text{ units,} \\ |CM| &= \sqrt{(0-3)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ units,} \\ |CN| &= \sqrt{(-2-3)^2 + (-3-2)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \text{ units,} \\ |CL| &= 5 \text{ units i.e, radius of the circle} \\ |CM| &= 3\sqrt{2} \text{ units} < 5 \text{ units} \\ |CN| &= 5\sqrt{2} \text{ units} > 5 \text{ units}\end{aligned}$$

تنهنڪري $N(-2, -3)$ ٽيڪو گول تي نه آهي.

مشق 16.1

1. مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري هيٺين ٽيڪن جي چوڙن جي وچ ۾ مفاصلو معلوم ڪريو.

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (i) $(-4, 5)$ ۽ $(6, 6)$ | (ii) $(2, 2)$ ۽ $(2, 3)$ |
| (iii) $(0, 1)$ ۽ $(2, 3)$ | (iv) $(0, 1)$ ۽ $(2, 3)$ |

2. $A(a, 0)$ ۽ $B(0, b)$ ٽيڪا $-x$ محور تي آهن، A ۽ B جي وچ ۾ مفاصلو معلوم ڪريو جڏهن


- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| (i) $a = -3, b = -4$ | (ii) $a = -9, b = 6$ |
| (iii) $a = 3, b = 4$ | (iv) $a = \sqrt{2}, b = -2\sqrt{2}$ |

3. ٽڪنڊي جو گهيراؤ معلوم ڪريو جيڪو ٽپڪن $A(0,0)$ ، $B(4,0)$ ۽ $C(2,2\sqrt{3})$ جو ٺهيل آهي.

16.2 هم ليڪ ٽپڪا


16.2.1 هم ليڪ ٽپڪن جي وصف ڏيو. هم ليڪ ٽپڪن ۽ غير هم ليڪ ٽپڪن ۾ فرق معلوم ڪريو.

اهڙا ٽپڪا جيڪي هڪ ئي ليڪ تي هجن تن کي هم ليڪ (Collinear Point) چئبو آهي. هيٺ شڪل ۾



A ، B ۽ C هم ليڪ ٽپڪا آهن جيئن $|\overline{AC}| = |\overline{AB}| + |\overline{BC}|$ غير هم ليڪ ٽپڪا

ٿي يا وڌيڪ ٽپڪا غير هم ليڪ ٽپڪا چئبا جيڪڏهن اهي ساڳيءَ ليڪ تي نه هجي. شڪل ۾



A ، B ۽ C غير هم ليڪ ٽپڪا آهن.

نوٽ: ٽي غير هم ليڪ ٽپڪا ٽڪنڊو ٺاهيندا، چار غير هم ليڪ ٽپڪا چوڪنڊو ٺاهيندا.

16.2.2 مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ثابت ڪريو ته ٽي (يا وڌيڪ) مليڪ ٽپڪا هم ليڪ آهن.

مثال 01 واضح ڪريو ته $A(3, -2)$ ، $B(1, 4)$ ۽ $C(-3, 16)$ هم ليڪ ٽپڪا آهن.

حل: $A(3, -2)$ ، $B(1, 4)$ ۽ $C(-3, 16)$ ٽي مليل ٽپڪا آهن. هاڻ اسان $|\overline{AB}|$ ، $|\overline{BC}|$ ۽ $|\overline{AC}|$ جو مفاصلو، مفاصلي وارو فارمولا استعمال ڪري معلوم ڪنداسين.



$$\begin{aligned}\therefore |\overline{AB}| &= \sqrt{(1-3)^2 + (4+2)^2} = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \text{ units,} \\ |\overline{BC}| &= \sqrt{(-3-1)^2 + (16-4)^2} = \sqrt{16+144} = \sqrt{160} = 4\sqrt{10} \text{ units,} \\ |\overline{AC}| &= \sqrt{(-3-3)^2 + (16-2)^2} = \sqrt{36+324} = \sqrt{360} = 6\sqrt{10} \text{ units,} \\ \text{هتي } |\overline{AB}| + |\overline{BC}| &= 2\sqrt{10} + 4\sqrt{10} = 6\sqrt{10} = |\overline{AC}| = d_3,\end{aligned}$$

تنهنڪري A، B ۽ C هم ليڪ ٿيڪا آهن. (واضح ٿيو)

مثال 02 مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ظاهر ڪريو ته

$$C(9, -5) \text{ ۽ } B(4, 7), A(-2, -3)$$

$$C(9, -5) \text{ ۽ } B(4, 7), A(-2, -3)$$

هاڻ اسان $|\overline{AB}|$ ، $|\overline{BC}|$ ۽ $|\overline{AC}|$ جو مفاصلو، مفاصلي وارو فارمولا استعمال ڪري معلوم ڪنداسين.

$$\begin{aligned}\therefore |\overline{AB}| &= \sqrt{(4+2)^2 + (7+3)^2} = \sqrt{36+100} = \sqrt{136} = 2\sqrt{34} \text{ units,} \\ \Rightarrow |\overline{BC}| &= \sqrt{(9-4)^2 + (-5-7)^2} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13 \text{ units,} \\ \Rightarrow |\overline{AC}| &= \sqrt{(9+2)^2 + (-5+3)^2} = \sqrt{121+4} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \text{ units,} \\ |\overline{AC}| &\neq |\overline{AB}| + |\overline{BC}| \text{ تنهنڪري}\end{aligned}$$


ته پوءِ مليل ٿيڪا A، B ۽ C غير هم ليڪ ٿيڪا آهن.

16.2.3 مفاصلي وارو فارمولا استعمال ڪري ثابت ڪريو ته ڏنل ٽي غير هم ليڪ ٿيڪا ناهين ٿا.

- (i) ٽپور پاسو ٽڪنڊو
- (ii) ٻيڙ پاسو ٽڪنڊو
- (iii) گوني ڪنڊ ٽڪنڊو
- (iv) اٿڀور پاسو ٽڪنڊو

مثال 01 ظاهر ڪريو ته ٽي ٿيڪا $A(1, 1)$ ، $B(-1, -1)$ ۽ $C(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ ، ٽپور

پاسو ٽڪنڊو ناهين ٿا.



حل: $B(-1, -1)$, $A(1, 1)$ ۽

$C(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ مليل ٿيڻا آهن.

هاڻ اسان $|AB|$ ، $|BC|$ ۽ $|AC|$

ٽڪنڊي جي پاسن جو مفاصلو معلوم ڪنداسين.

مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري

$$|AB| = \sqrt{(-1-1)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} \text{ units,}$$

$$|BC| = \sqrt{(-\sqrt{3}+1)^2 + (\sqrt{3}+1)^2} = \sqrt{3-2\sqrt{3}+1+3+2\sqrt{3}+1} = \sqrt{8} \text{ units,}$$

$$\text{and } |AC| = \sqrt{(-\sqrt{3}-1)^2 + (\sqrt{3}-1)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} \text{ units,}$$

Since, $|AB| = |BC| = |AC| = 2\sqrt{2}$ units, and the points are non-collinear.

Therefore ABC is an equilateral triangle.

جيئن ته $2\sqrt{2} = |AB| = |BC| = |AC|$ ايڪا آهن ۽ ٽيڪا غير هم ليڪ تنهنڪري

ABC هڪ ٽپور پاسو ٽڪنڊو آهي.

مثال 02 ظاهر ڪريو ته ٽيڪا $A(3, 2)$ ، $B(9, 10)$ ۽ $C(1, 16)$ ٻپور پاسو ٽڪنڊو

ناهي ٿا.

حل: فرض ڪريو ته $A(3, 2)$ ، $B(9, 10)$ ۽ $C(1, 16)$ مليل ٽيڪا هن مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري.


$$|\overline{AB}| = \sqrt{(9-3)^2 + (10-2)^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10 \text{ units},$$

$$|\overline{AC}| = \sqrt{(1-3)^2 + (16-2)^2} = \sqrt{4+196} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \text{ units},$$

$$|\overline{BC}| = \sqrt{(1-9)^2 + (16-10)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10 \text{ units},$$

جيئن ته $10 = |\overline{BC}| = |\overline{AC}|$ ايڪا ۽ ٽيڪا غير هم ليڪ آهن

مثال 03 جيئن ته ٻه پاسا ڏيگهه ۾ برابر آهن تنهنڪري ABC هڪ ٻيٻور پاسو ٽڪنڊو آهي.



سمجهو ته $A(2, 1)$, $B(5, 1)$ ۽

$C(2, 6)$ ٽڪنڊي ABC جون

چوٽيون آهن ته پوءِ مفاصلي جو

فارمولا استعمال ڪري.

$$|\overline{AB}|^2 = (5-2)^2 + (1-1)^2 = 9+0=9$$

$$|\overline{BC}|^2 = (2-5)^2 + (6-1)^2 = 9+25=34$$

and $|\overline{AC}|^2 = (2-2)^2 + (6-1)^2 = 0+25=25$

هتي

$$|\overline{AB}|^2 + |\overline{AC}|^2 = 9+25=34$$

$$\Rightarrow |\overline{AB}|^2 + |\overline{AC}|^2 = |\overline{BC}|^2$$

پيٿاگورس سڌيان مطابق مليل چوٽيون گوني ڪنڊ ٽڪنڊي مان آهن.


مثال 04 ظاهر ڪريو ته ٽيڪا $A(3, 4)$, $B(1, 2)$ ۽ $C(0, 4)$ اٺيٻور پاسو ٽڪنڊو

ٺاهيندا.

حل: فرض ڪريو ته ٽيڪا $A(3, 4)$, $B(1, 2)$

۽ $C(0, 4)$ مليل ٽيڪا آهن.

هاڻ هر هڪ پاسي جو مفاصلو معلوم



ڪرڻ لاءِ مفاصلي وارو فارمولا استعمال ڪريو.

$$\therefore |\overline{AB}| = \sqrt{(1-3)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} \text{ units,}$$

$$|\overline{BC}| = \sqrt{(0-3)^2 + (4-5)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10} \text{ units,}$$

$$\text{and } |\overline{AC}| = \sqrt{(0-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \text{ units,}$$

جيئن ته $|\overline{AB}| \neq |\overline{BC}| \neq |\overline{AC}|$ ۽ ٽيڪا غير هم ليڪ آهن.

جيئن ته تنهنجي پاسن جي ڊيگهه پاڻ ۾ برابر نه آهي ان ڪري ABC اٿپور پاسو ٿڪندو آهي.

16.4.6 مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ظاهر ڪريو ته چار غير هم ليڪ ٽيڪا ناهين ٿا.

(i) پورو چوٽ چوڪنڊو

(ii) مستطيل

(iii) چورس

ظاهر ڪريو ته $A(-8, -3)$, $B(-2, 6)$, $C(8, 5)$ ۽ $D(2, -4)$ ٽيڪا لاڳيتون، پورو چوٽ چوڪنڊي جون چوٽيون آهن.

مثال 01

حل: فرض ڪريو ته $A(-8, -3)$, $B(-2, 6)$


$C(8, 5)$ ۽ $D(2, -4)$

پورو چوٽ چوڪنڊي جون لاڳيتون چوٽيون آهن.

مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري.

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(-2+8)^2 + (6+3)^2} = \sqrt{36+81} = \sqrt{117} \text{ units,}$$

$$|\overline{BC}| = \sqrt{(8+2)^2 + (5-6)^2} = \sqrt{100+1} = \sqrt{101} \text{ units,}$$





$$|\overline{DC}| = \sqrt{(2-8)^2 + (-4-5)^2} = \sqrt{36+81} = \sqrt{117} \text{ units,}$$

and $|\overline{AD}| = \sqrt{(2+8)^2 + (-4+3)^2} = \sqrt{100+1} = \sqrt{101} \text{ units,}$

هاڻ $|\overline{AB}| = |\overline{CD}| = \sqrt{117}$

۽ $|\overline{BC}| = |\overline{AD}| = \sqrt{101}$

A, B, C ۽ D پورو چوٽ چوڪنڊي جو چوٽيون آهن.

مثال 02 ظاهر ڪريو ته A(0, -1), B(4, -3), C(8, 5) ۽ D(4, 7) مستطيل

جون لاڳيتيون چوٽيون آهن.

فرض ڪريو ته C(8, 5) ۽ B(4, -3)،

D(4, 7) ۽ C(8, 5) چوڪنڊي جا لاڳيتا

ٿيڻا آهن.

مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري



$$d = |\overline{P_1P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \text{ unit}$$

هاڻ اسين

$$\therefore |\overline{AB}| = \sqrt{(4-0)^2 + (-3+1)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \text{ units,}$$

$$|\overline{BC}| = \sqrt{(8-4)^2 + (5+3)^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} \text{ units,}$$

$$|\overline{DC}| = \sqrt{(4-8)^2 + (7-5)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \text{ units,}$$

$$|\overline{AD}| = \sqrt{(4-0)^2 + (7+1)^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} \text{ units,}$$

$$|\overline{AC}| = \sqrt{(8-0)^2 + (5+1)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} \text{ units,}$$

$$|\overline{BD}| = \sqrt{(4-4)^2 + (7+3)^2} = \sqrt{0+100} = \sqrt{100} \text{ units,}$$

$$\therefore |\overline{AB}| = |\overline{CD}| = \sqrt{20}$$


$$|\overline{BC}| = |\overline{AD}| = \sqrt{80}$$

$$|\overline{AC}| = |\overline{BD}| \quad (\text{Diagonals are equal})$$

اڻيون برابر آهن

مثال 03

ظاهر ڪريو ته لاڳيتا چار ٽپڪا $A(3, 4)$, $B(1, 2)$, $C(0, 4)$ ۽ $D(-1, 4)$ 4 چورس ناهين ٿا.



حل: مليل $A(3, 4)$, $B(1, 2)$, $C(0, 4)$ ۽ $D(-1, 4)$ چار لاڳيتا چوڪنڊي ABCD جا ٽپڪا آهن. مفاصلي وارو فارمولا استعمال ڪري

$$\therefore |\overline{AB}| = \sqrt{(3-1)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ units,}$$

$$|\overline{BC}| = \sqrt{(1-3)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ units,}$$

$$|\overline{DC}| = \sqrt{(1+1)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ units,}$$

$$\text{and } |\overline{AD}| = \sqrt{(-1-1)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ units,}$$

جيئن ته $|\overline{AB}| = |\overline{BC}| = |\overline{DC}| = |\overline{AD}| = 2\sqrt{2}$ چار پاسا ڏيکڻ ۾ برابر آهن.

هاڻ اربين جي ڏيکڻ معلوم ڪرڻ سان

$$\therefore |\overline{AC}| = \sqrt{(1-1)^2 + (2-6)^2} = \sqrt{0+16} = 4 \text{ units,}$$

$$\text{۽ } |\overline{BD}| = \sqrt{(-1-3)^2 + (4-4)^2} = \sqrt{16+0} = 4 \text{ units,}$$


جيئن ته $|\overline{AB}| = |\overline{BD}| = 4$ ته اربين جي ڏيکڻ ۾ پاڻ ۾ برابر آهن، تنهنڪري ABCD هڪ چورس آهي.

مشق 16.2

1. ظاهر ڪريو ته $P(-3, -4)$ ، $Q(2, 6)$ ، ۽ $R(0, 2)$ ٽيڪا هم ليڪ آهن.
2. ظاهر ڪريو ته $A(-1, 0)$ ، $B(1, 0)$ ، $N(0, \sqrt{3})$ ٽيڪا غير هم ليڪ آهن.
3. ظاهر ڪريو ته $L(0, \sqrt{3})$ ، $(-1, 0)$ ، $N(1, 0)$ هڪ ٽيپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهين ٿا يا نه.
4. ظاهر ڪريو ته $A(2, 3)$ ، $B(8, 11)$ ، ۽ $C(0, 17)$ ٽيڪا ٽيپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهين ٿا يا نه.
5. ڇا ٽيڪا $A(-1, 2)$ ، $B(7, 5)$ ، ۽ $C(2, -6)$ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو ٺاهين ٿا.
6. جيڪڏهن $A(3, 1)$ ، $B(9, 1)$ ، ۽ $C(6, k)$ کي هڪ ٽيپور پاسو ٽڪنڊو ظاهر ڪرڻ لاءِ k جو ملهه معلوم ڪريو.
7. ظاهر ڪريو ته $P(1, 2)$ ، $Q(3, 4)$ ، $R(0, -1)$ اٽپور پاسي ٽڪنڊي جون چوٽيون آهن.
8. ظاهر ڪريو ته $A(2, 3)$ ، $B(8, 11)$ ، $C(0, 17)$ ، ۽ $D(-6, 9)$ چوس جو چوٽيون آهن.
9. ظاهر ڪريو ته $A(-2, 0)$ ، $B(0, 3)$ ، $C(2, 0)$ ، ۽ $D(0, 3)$ هڪ چورسي معلوم ڪنديون.
10. ظاهر ڪريو ته $A(3, 2)$ ، $B(4, 1)$ ، $C(5, 4)$ ، ۽ $D(6, 3)$ هڪ مستطيل جون چوٽيون آهن.
11. مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ظاهري ڪريو ته $O(0, 0)$ ، $A(3, 0)$ ، $B(5, 2)$ ۽ $C(2, 2)$ پورو چوٽ چوڪنڊي جون چوٽيون ٺاهين ٿيون.

16.3 وچين ٽيڪي جو فارمولا

16.3.1 ٻن مليل ٽيڪن کي ملائيندڙ ليڪ جي وچ وارو ٽيڪو معلوم ڪرڻ لاءِ فارمولا جي سڃاڻپ ڪرڻ.



فرض ڪريو $A(x_1, y_1)$ ۽ $B(x_2, y_2)$ متاڃري تي مليل ليڪ $\overline{AB}$ جا ٻه ٽپڪا آهن ۽ $C(x, y)$ جو گچ ۾ وارو ٽپڪو آهي ته

$$\overline{AB} \text{ جي } C(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

جو وچ وارو ٽپڪو چئبو آهي.

مثال 01 ٽپڪن $A(2, 1)$ ۽ $B(3, 4)$ کي ملائيندڙ ليڪ تڪر جو گچ ۾ وارو ٽپڪو معلوم ڪريو.

حل: $A(2, 1)$ ۽ $B(3, 4)$ ليڪ تڪر جا ٽپڪا آهن.
وچ وارو ٽپڪو = ؟

وچين ٽپڪي کي معلوم ڪرڻ جا فارمولا استعمال ڪري

$$\overline{AB} = \left(\frac{2+3}{2}, \frac{1+4}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right)$$

مثال 02 جيڪڏهن ΔABC جون چوٽيون آهن ته ترتيبوار پاسن $\overline{AC}$ ، $\overline{AB}$ ، $\overline{BC}$ جي وچ وارا ٽپڪا P ، Q ۽ R معلوم ڪريو.

$$C(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$\therefore \overline{AC} = P = \left(\frac{2+3}{2}, \frac{1+4}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right),$$

$$\overline{AB} = Q = \left(\frac{2+5}{2}, \frac{1+2}{2} \right) = \left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2} \right),$$

$$\overline{BC} = R = \left(\frac{5+3}{2}, \frac{2+4}{2} \right) = (4, 3),$$

ته ٽڪنڊي ΔABC جي پاسن جا گھريل وچ وارا ٽپڪا آهن.

Thus, the required mid-points of the sides of a ΔABC are

$$\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right), \left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2} \right) \text{ ۽ } (4, 3).$$



16.4 مفاصلي معلوم ڪرڻ جو فارمولا ۽ وچين ٽپڪن جو فارمولا استعمال ڪري جاميٽري مان تعلق رکندڙ مختلف نتيجن کي حل ڪري چڪاس ڪريو.


مثال 01 تجزياتي طريقي سان ثابت ڪريو ته گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي هيٺائينوز کان مڌيان جي ڊيگهه هيٺائينوز جي ڊيگهه جي اڌ برابر آهي.

حل: فرض ڪري ته ABC ٽڪنڊي جي B ٽپڪي تي گوني ڪنڊ آهي. B کي $\overline{BC}$ جو اصل ٽپڪو ڪڍي، جيئن $-x$ محور ۽ $-y$ محور ترتيبوار شڪل ۾ ڏنل آهي.

فرض ڪريو ته $|AB| = b$ ۽ $|AC| = c$ ته پوءِ $B(0, 0)$ ، $A(0, b)$ ۽ $C(a, 0)$ آهن تنهنڪري $\overline{AC}$ جو وچ وارو ٽپڪو ٿيندو $\left(\frac{a+0}{2}, \frac{b+0}{2}\right)$ ، $\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$

$$\begin{aligned} \text{Now } |\overline{AM}| &= |\overline{CM}| = \frac{1}{2} |\overline{AC}| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{|\overline{AB}|^2 + |\overline{BC}|^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{a}{2} - 0\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - 0\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$




Therefore

$$|\overline{BM}| = \frac{1}{2} |\overline{AC}|$$

هاڻ تنهنڪري ۽

ته پوءِ مڌيان $|\overline{BM}|$ جي ڊيگهه هيٺائينوز $|\overline{AC}|$ جي ڊيگهه جي اڌ برابر آهي.

مثال 02 ڪنهن چوڪنڊي جي پاسن جي وچين ٽپڪن کي ترتيبوار هلائڻ سان حاصل ٿيندڙ شڪل پوروچوٽ چوڪنڊو آهي ثابت ڪريو.



حل: فرض ڪري ته ABCD هڪ

چؤڪنڊو ۽ E, F, G, H ترتيبوار پاسن $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ ۽ $\overline{DA}$ جا وچ وارا ٽپڪا آهن.

جيڪڏهن A کي اصل ٽپڪو تصور ڪجي ته A ٿيندو $(0, 0)$, B ٿيندو $(a, 0)$ ۽ C ٿيندو $(a, 0)$ ۽ D ٿيندو $(a-b, d+e)$

هاڻ وچ وارا ٽپڪا E, F, G ۽ H ترتيبوار ٿيندا.

$$\left(\frac{a}{2}, 0\right), \left(\frac{2a+c}{2}, \frac{e}{2}\right), \left(\frac{2a-b+c}{2}, \frac{d+2e}{2}\right) \text{ and } \left(\frac{a-b}{2}, \frac{d+e}{2}\right).$$

تنهنڪري مفاصلي واري فارمولا سان

$$|\overline{EF}|^2 = \left(\frac{2a+c}{2} - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{e}{2} - 0\right)^2$$

$$= \left(\frac{a+c}{2}\right)^2 + \left(\frac{e}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{4} \{(a+c)^2 + e^2\} \quad (i)$$

$$|\overline{GH}|^2 = \left(\frac{2a-b+c}{2} - \frac{a-b}{2}\right)^2 + \left(\frac{d+2e}{2} - \frac{d+e}{2}\right)^2$$

$$= \left(\frac{a+c}{2}\right)^2 + \left(\frac{e}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{4} \{(a+c)^2 + e^2\} \quad (ii)$$

From (i) and (ii), we have

$$|\overline{EF}| = |\overline{GH}|$$

$$|\overline{GF}| = |\overline{EH}| \text{ ساڳي طرح}$$

جيئن ته سامهون وارا پاسا برابر آهن ته پوءِ EFGH هڪ پوروچوٽ چؤڪنڊو آهي.

مشق 16.3

1. هيٺ ڏنل نقطن جي جوڙي جو وچ وارو نقطو معلوم ڪريو.
 - (i) $A(2,6)$ ۽ $B(4,8)$
 - (ii) $P(-3,-1)$ ۽ $Q(5,2)$
 - (iii) $M(-8,0)$ ۽ $L(0,6)$
 - (iv) $C(0,0)$ ۽ $D(2\sqrt{3}, 4\sqrt{3})$
2. گول جو وچ وارو نقطو معلوم ڪريو جڏهن ته قطر جا آخري نقطا $A(-5,6)$ ۽ $B(3,-4)$ آهن.
3. گول جو وچ وارو نقطو $(3,4)$ آهي ۽ قطر جا آخري نقطن مان هڪ نقطو $(4,6)$ آهي، ٻيو نقطو معلوم ڪريو.
4. گول جي قطر جا آخري نقطا $A(-3,4)$ ۽ $B(11,6)$ آهن. گول جو وچ وارو نقطو ۽ نيم قطر معلوم ڪريو.
5. ثابت ڪريو ته ڪو ٽڪنڊو ٻيڙو ٽڪنڊو آهي جيڪڏهن هن وٽ ٻه برابر ميدبان هجن.
6. ثابت ڪريو ته ٻورو چوٽ چوڪنڊي جا اديب هميشه هڪٻئي کي اڌ ڪن ٿا.

ورجائيل مشق

1. هيٺين جملن کي غور سان پڙهو، صحيح بيان لاءِ "T" ۽ غلط بيان جي لاءِ "F" تي گولو لڳايو.
 - (i) R ٽپڪو PQ وچيون ٽپڪو آهي، جيڪڏهن R موجود آهي. P ۽ Q جي وچ ۾. T/F
 - (ii) اٽپور پاسي ٽڪنڊي ۾ سڀ پاسا برابر آهن. T/F
 - (iii) عمودي ليڪون 135 جي ڪنڊ تي ملنديون آهن. T/F
 - (iv) هر ليڪ ٽپڪا ٽڪنڊو ٺاهي سگهن ٿا. T/F
 - (v) غير هر ليڪ ٽپڪا ٽڪنڊو ٺاهيندا آهن. T/F
 - (vi) ٻيڙو پاسي ٽڪنڊي ۾ ٻه پاسا، ڪنڊون برابر آهن. T/F
 - (vii) سڀئي ٽپڪا جيڪي y-محور تي هجن، هر ليڪ هوندا آهن. T/F
 - (viii) x-محور ۽ y-محور تي ڪاٺ (0, 0) آهي. T/F
 - (ix) اصل نقطي کان (6, 0) جو مفاصلو 36 ايڪا آهن. T/F
2. خال ڀريو.
 - (i) جيڪڏهن $A(x_1, y_1)$ ۽ $B(x_2, y_2)$ هڪ ليڪ جا ٻه ٽپڪا آهن ته پوءِ $|AB| =$ _____
 - (ii) هر ليڪ ٽپڪا هوندا ساڳي _____ تي.
 - (iii) چوٿين چوٽي (quadrant) ۾ $x > 0$ ۽ y _____.

3. صحيح جواب تي (✓) تڪ لڳايو.

(i) ٻه عمودي ليڪون پاڻ ۾ ڪنڊ تي ملنديون.

(a) 45° (b) 60° (c) 90° (d) 180°

(ii) $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ کي چئبو آهي. (a) وچين ٽيڪن جو فارمولا

(b) مفاصلي وارو فارمولا (c) ورهاست وارو فارمولا (d) نسبت وارو فارمولا

(iii) متاچري تي $A(3, 0)$ ۽ $B(0, 3)$ کي ٻه ٽيڪا آهن ته پوءِ $|AB| =$ _____

(a) 6 ايڪا (b) $6\sqrt{2}$

(c) $3\sqrt{2}$ (d) $3\sqrt{2}$

(iv) ڪنڊ جي سيني ٽن اندرين اڌ ڪنڊن جي ڪاٽ جو ٽيڪو چئبو آهي.

(a) ميلاپ جو ٽيڪو (b) اندريون مرڪز

(c) عمودي مرڪز (d) گهيرندڙ مرڪز



خلاصو

- ٻن ٽيڪن $A(x_1, y_1)$ جي وچ وارو مفاصلو مليل هوندو آهي

$$d = |P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \text{ (يونٽ) ايڪا.}$$

- $\overline{AB}$ ليڪ ٽڪر جو وچيون ٽيڪو مليل آهي، $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

- هر ليڪ ٽيڪا سڌي ليڪ ٺاهيندا آهن.


- ٽن ٽيڪن A, B, C جي هر ليڪ لاءِ $|AC| = |AB| + |BC|$ آهي.

- تي غير هر ليڪ ٽيڪا A, B, C ٽڪنڊو ٺاهيندا، جيڪڏهن ٻن پاسن جي ماپ جو

جوڙ تي پاسي جي ماپ کان وڌيڪ هجي.

- جيڪڏهن $|AB| = |BC| < |AC|$ ، ته پوءِ A, B, C ٽيڪن سان ڪو به ٽڪنڊو

ٺٽو ناهي سگهجي.



Answers







Exercise 1.1


- ii. غير ناطق عدد
iv. ناطق عدد
vi. غير ناطق عدد
viii. غير ناطق عدد
x. ناطق عدد
xii. غير ناطق عدد

- ii. نه ختم ٿيندڙ
iv. ختم ٿيندڙ
vi. نه ختم ٿيندڙ

- i. ناطق عدد
iii. غير ناطق عدد
v. غير ناطق عدد
vii. غير ناطق عدد
ix. ناطق عدد
xi. غير ناطق عدد

- i. ختم ٿيندڙ
iii. نه ختم ٿيندڙ
v. ختم ٿيندڙ





4. $\frac{3}{2}, \frac{5}{4}, \frac{9}{8}, \frac{7}{4}$

5. π هڪ غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻ ته ان کي نه ختم ٿيندڙ ڏهائي اڻپور آهي

6. i. T ii. T iii. T iv. F v. T vi. F

(i, ii, iii, v) صحيح بيان آهن

Exercise 1.2

1. جوڙ جي مٿا واري خاصيت

جوڙ جي سنگت واري خاصيت

ڪاٻي کان ضرب جي جوڙ تي ورهائجڻ واري خاصيت

ساڄي کان ضرب جي جوڙ تي ورهائجڻ واري خاصيت

ساڄي کان ضرب جي جوڙ تي ورهائجڻ واري خاصيت

جوڙ جي مٿا واري خاصيت

جوڙ جي سنگت واري خاصيت

ضربي ابتڙ

جمعي ابتڙ

ضربي ابتڙ

ڪاٻي کان ضرب جي ڪٽ تي ورهائجڻ واري خاصيت

ضربي ابتڙ

2. i. $\frac{\sqrt{2}}{5} + \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\boxed{3}}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}}{\boxed{5}}$ ii. $\frac{7}{10} + \left(\frac{70}{\boxed{10}} + \frac{16}{33} \right) = \frac{7}{\boxed{10}} + \left(\frac{\boxed{70}}{10} + \frac{16}{\boxed{33}} \right)$

iii. $\frac{99}{50} \times \frac{50}{99} = \boxed{1}$ iv. $\frac{59}{95} \times \frac{95}{59} = \boxed{1}$

v. $(-21) + (\boxed{21}) = 0$ vi. $\frac{5}{8} \times \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{7} \right) = \left(\frac{\boxed{5}}{8} \times \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{5}{8} \times \frac{\boxed{5}}{7} \right)$


3. i. $5 < 10$ ii. $10 > 5$ iii. $3 + 9 < 6 + 9$ iv. $4 + 8 < 6 + 8$ v. $8 + 8 > 6 + 8$

4. i. 7×12 ii. 5×12 iii. $<$ iv. $>$

5. i. جمعي ابتڙ $3 + (-3) = 0$
 ضربتي ابتڙ $3 \times \frac{1}{3} = 1$
- ii. جمعي ابتڙ $-7 + (7) = 0$
 ضربتي ابتڙ $-7 \times \frac{1}{-7} = 1$
- iii. جمعي ابتڙ $0.3 + (-0.3) = 0$
 ضربتي ابتڙ $0.3 \times \frac{1}{0.3} = 1$
- iv. جمعي ابتڙ $\left(\frac{-\sqrt{5}}{5}\right) \times \frac{\sqrt{5}}{5} = 0$
 ضربتي ابتڙ $\frac{-\sqrt{5}}{5} \times -\frac{5}{\sqrt{5}} = 1$
- v. جمعي ابتڙ $\frac{9}{12} \times \left(-\frac{9}{12}\right) = 0$
 ضربتي ابتڙ $\frac{9}{12} \times \frac{12}{9} = 1$
- vi. جمعي ابتڙ $0 + 0 = 0$
 ضربتي ابتڙ $0 \times \frac{1}{0} = 0$

Exercise 1.3

1. i. سگھ نما -3 بنياد $= 4$ ii. سگھ نما $\frac{1}{2}$ بنياد $= 3$
 ii. سگھ نما -30 بنياد $= 20$
2. i. 3 مول جي ڏسڻي، 5 مول جو پايو $= 3$
 ii. 4 مول جي ڏسڻي، $\frac{x}{y}$ مول جو پايو $= 4$
 iii. 5 مول جي ڏسڻي، x^2yz مول جو پايو $= 5$



3. i. $\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$ ii. $\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{5}{2}}$ iii. $\left(\frac{x}{y}\right)^{-\frac{5}{3}}$ iv. $(xy)^{\frac{7}{3}}$ v. $(27)^{\frac{1}{9}}$
 vi. $(-64)^{\frac{2}{3}}$ vii. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{10}{3}}$ viii. $(xy)^{\frac{3}{5}}$ ix. $\left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{6}}$

4. i. $\sqrt[7]{(5)^3}$ ii. $\sqrt[3]{(ab)^{-2}}$ iii. $\sqrt[7]{\left(\frac{5}{7}\right)^{15}}$ iv. $\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^m}$ v. $\sqrt[5]{\left(\frac{11}{13}\right)\left(\frac{12}{13}\right)}$

Exercise 1.4

1. i. 27 ii. 20 iii. $(a+b)(c+d)$
 2. i. $\left(\frac{1}{3}\right)^9$ ii. $\left(\frac{3}{4}\right)^7$ iii. $\left(-\frac{4}{5}\right)^8$ iv. $-3^3 \times 5^6$ v. $3^3 \times 16^3$
 vi. $\left(\frac{-a}{bc}\right)^9$ vii. $\left(\frac{-c}{d}\right)^{10}$ viii. $m^6 n^5 t^n$ ix. $a^9 b^6 c^8$ x. $10x^6 y^4 z^2$
 xi. $\frac{3}{5} r^{10} s^4 t^2$ xii. $\left(\frac{l}{m}\right)^{12}$
 3. i. 5^6 ii. $x^{15} y^{15}$ iii. $(-4)^{10}$ iv. $(-3)^9 \times (-4)^6$ v. $\frac{b^6}{5^3}$
 vi. $\frac{(-4)^6}{9^6}$ vii. z^{24} viii. m^{100} ix. $(0.1)^{18}$

Exercise 1.5

1. i. $1+2i$ ii. $2+2i$ iii. $3+4i$
 iv. $-1+i$ v. $-2+2i$ vi. $-3+4i$

2. i. $\operatorname{Re}(z)=1, \operatorname{Im}(z)=2$ ii. $\operatorname{Re}(z)=1, \operatorname{Im}(z)=2$
 iii. $\operatorname{Re}(z)=-5, \operatorname{Im}(z)=6$ iv. $\operatorname{Re}(z)=-1, \operatorname{Im}(z)=-1$
 v. $\operatorname{Re}(z)=\frac{-3}{4}, \operatorname{Im}(z)=\frac{4}{5}$ vi. $\operatorname{Re}(z)=-1, \operatorname{Im}(z)=2$

3. i. $\bar{z}=3-2i$ ii. $\bar{z}=4-9i$ iii. $\bar{z}=-1-i$
 iv. $\bar{z}=1+i$ v. $\bar{z}=\frac{-3}{4}+\frac{4}{5}i$ vi. $\bar{z}=1-3i$

5. i. $x=-5, y=5$ ii. $x=\frac{4}{3}, y=\frac{3}{5}$
 iii. $x=\frac{-27}{5}, y=11$ iv. $x=\frac{18\sqrt{3}}{\sqrt{10}}, y=\frac{4}{27}$

Exercise 1.6

1. i. $(12, 5)$ ii. $\left(\frac{13}{6}, \frac{13}{6}\right)$ iii. $\left(\frac{3xy}{2}, -y^2\right)$
 iv. $(5, 21)$ v. $\left(0, -\frac{1}{15}\right)$ vi. $(5, 0)$
 vii. $(0, -41)$ viii. $\left(\frac{3-6\sqrt{2}}{4}, \frac{3+3\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}\right)$ ix. $\left(\frac{-5}{13}, \frac{-27}{13}\right)$
 x. $\left(\frac{-7}{13}, \frac{22}{13}\right)$

2. i. $\frac{-1}{2}+\frac{1}{2}i$ ii. $0-4i$ iii. $\frac{-1}{10}-\frac{3}{2}i$ iv. $\frac{-1}{26}-\frac{5}{26}i$

Review Exercise 1

1. i. $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ii. حقيقي عدد iii. 0
 iv. 7 v. 0 vi. غير ناطق عدد
 vii. غير ناطق عدد viii. $-3-5i$ ix. $2[2i(3-i)=6i+2]$
 x. $(ac-bd, ab+bc)$
2. i. T ii. T iii. T iv. F v. T
3. i. a ii. b iii. c iv. b

Exercise 2.1

1. i. 9.7×10^3 ii. 4.98×10^6 iii. 9.6×10^7 iv. 4.169×10^3
 v. 8.4×10^4 vi. 6.43×10^{-3} vii. 7.4×10^{-3} viii. 2.75×10^5
2. i. 70000 ii. 0.0000000008072 iii. 6018000 iv. 786500000
 v. 0.000205 vi. 72500000000 vii. 4502000 viii. 0.00000002865
 ix. 3056000

Exercise 2.2

1. i. $\log_7 343 = 3$ ii. $\log_3 \frac{1}{81} = -4$ iii. $\log_{10}(0.001)$ iv. $\log_m(1) = \frac{2}{3}$
2. i. $(27)^{\frac{4}{3}} = 81$ ii. $(2)^{-3} = \frac{1}{8}$ iii. $10^0 = 1$ iv. $(10)^{-2} = 0.01$
3. i. $x = 4\sqrt{2}$ ii. $a = 9$ iii. $y = 4$ iv. $x = 8$
 v. $y = 2$ vi. $a = 4$ vii. $a^0 = 1$ viii. $y = 1$
 ix. $x = 1$

Exercise 2.3

1. i. گٹ : 0 ii. گٹ : 3 iii. گٹ : 0
مئٹیس : 0.9031 مئٹیس : 0.7036 مئٹیس : 0.9997
iv. گٹ : 2 v. گٹ : -3 vi. گٹ : -5
مئٹیس : 0.8839 مئٹیس : 0.5172 مئٹیس : 0.4771
2. i. 0.9542 ii. 1.7448 iii. 1.4711 iv. 2.6078
v. -3.6712 vi. -5.8808
3. i. -1.4926 ii. 1.4926 iii. -4.4926 iv. 2.4926
v. 1.4926 vi. 4.4926

Exercise 2.4

1. i. 3692 ii. 0.5530 iii. 2278
2. i. 2.954242509 ii. 1.658393026 iii. 4.563267445
iv. 2.917137753 v. -2.07007044 vi. -4.013228266
3. i. 56.2989 ii. 4.6659 iii. 163.38
iv. 79.5976 v. 1.002027 vi. 7087.6
vii. 0.024367 viii. 0.001668 ix. 0.00450
x. 0.00001427 xi. 0.0000001646 xii. 0.000000000205
xiii. 3019.95 xiv. 0.0000000991 xv. 0.000000000205

Exercise 2.5

1. i. $3\log_a x + \log_a y - 2\log_a z$ ii. $\frac{1}{2}\log_a x + \log_a y - \frac{1}{2}\log_a z$
iii. $-\frac{7}{2}\log_a(x) + \log_a y$ iv. $-5\log_a(z)$
v. $\frac{1}{3}\log_a x + \frac{1}{6}\log_a y - \frac{1}{6}\log_a z$ vi. $\frac{8}{3}\log_a x + \frac{3}{2}\log_a y - \frac{2}{3}\log_a z$
2. i. $\log_a\left(\frac{4}{3}\right) + \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{9}{2}\right)$ ii. $\log_a(x^2 - 1)$
iii. $\log \frac{(x+1)^2}{x(x-1)}$

3. i. 1.1761 ii. 1.8062 iii. 0.5 iv. 1.6812
v. 0.6276 vi. 1.4771 vii. 0.4260 viii. 0.4604

Exercise 2.6

1. i. $x = 253.688$ ii. $x = 6750$ iii. $x = 3147$ iv. $x = 930.80$
v. $x = 3147$ vi. $x = 15.20$ vii. $x = 7.56641$ viii. $x = 64998$
ix. $x = 1.84077 \times 10^{13}$ x. $x = 6298$
2. i. 8 ii. 22 iii. 15 iv. 3 v. 4

Review Exercise 2

1. i. F ii. F iii. T iv. F v. T
2. i. عام لاگرتھم ii. 0 iii. مثنیسا
iv. 2.7093 v. $\log_a n$ vi. $a^x = y$
vii. $\log_a y = 10$ viii. 1 ix. $\log m = \log n$
x. $\log 10 + \log 10$ or 2
3. i. d ii. b iii. b iv. b v. a
vi. c vii. c viii. b ix. b


Exercise 3.1

1. i. گھٹ رقمي نه آهي ii. گھٹ رقمي نه آهي iii. گھٹ رقمي آهي
iv. گھٹ رقمي نه آهي v. گھٹ رقمي نه آهي vi. گھٹ رقمي نه آهي
2. i. ناطق ii. ناطق نه آهي iii. ناطق نه آهي
iv. ناطق نه آهي v. ناطق vi. ناطق نه آهي
3. i. $1 - \frac{110}{p^2 + 10}$ ii. $\frac{b-a}{a+2b+b^2}$ iii. $\frac{a}{2(a+b)}$
iv. $x + y - z$ v. $\frac{3m(m+5)}{2}$ vi. $\frac{4}{t}$

4. i. $\frac{4x^2-1}{x^2-1}$ ii. $\frac{3x+7}{(x+2)(x+3)}$ iii. $\frac{5y^2+21y-25}{5y(y-1)}$
- iv. $\frac{2(xy)^2+xy+1}{(xy+1)(xy-1)}$ v. $\frac{9z-13}{2(z^2-1)(z-5)}$ vi. $\frac{2}{a+b}$
- vii. $\frac{2(y+1)}{y-1}$ viii. $\frac{4x+1}{(2x+y)(2x-y)}$ ix. $\frac{x^2-11x+18}{2(x+3)^2(x-3)}$
- x. $\frac{4a^3-20a}{(a^2-1)(a^2-9)}$
5. i. $\frac{8y^3}{(4y^2-x^2)(2y-x)}$ ii. $-\frac{2x+3y}{y}$ iii. 1
- iv. $\frac{5}{3}$ v. $\frac{(q-5)(q+3)}{q^2}$ vi. $\frac{8(z-1)}{z-5}$
6. i. $\frac{2(x^2+y^2)}{(x+y)(x-y)}$
7. i. $\frac{1}{6}$ ii. $9\frac{9}{55}$ iii. $-\frac{17}{73}$
- iv. $-\frac{40}{9}$ v. $\frac{12}{11}$

Exercise 3.2

1. $a-b=1$ 2. $a-b=7$ 3. $a^2+b^2=50, ab=7$
4. $a^2+b^2=50, ab=7$ 5. $a^2+b^2+c^2=55$ 6. $a^2+b^2+c^2=\frac{5}{9}$
7. $a+b+c=7$ 8. $a+b+c=\sqrt{2.5}$ 9. $ab+bc+ca=40$
10. $a^3+b^3=28$ 11. $ab=-8$ 12. $ab=-4$
13. $a^3+b^3=230$ 14. $125x^3+y^3=247$ 15. $216a^3-343b^3=12419$
16. $x^3+\frac{1}{x^3}=322$ 17. $x^3-\frac{1}{x^3}=1364$



18. i. $8x^6 + 27y^6$

ii. $x^8 - y^8$

iii. $(x^3 - y^3)(x^3 + y^3)(x^6 + y^6) = x^{12} - y^{12}$

iv. $256x^8 + 6561y^8$

19. i. $\frac{27b^3}{8} + \frac{8}{27b^3}$

ii. $\frac{343y^6}{729} + \frac{729}{343y^6}$

iii. $\frac{x^{12}}{8} - \frac{1728}{x^{12}}$

iv. $c^6 + \frac{1}{c^6}$

Exercise 3.3

1. i. $\frac{3z}{x^2}$

ii. $4\sqrt[3]{4a^2b^4c^3}$

iii. 2

iv. $36\sqrt{6}$

v. $\frac{25}{32}$

vi. $\frac{14\sqrt{3}}{11}$

vii. 1.79441

viii. 2

2. i. $8 + 4\sqrt{3}$

ii. $6\sqrt{6} - 2\sqrt{3}$

iii. $8\sqrt{12} - \sqrt{8}$

iv. $2\sqrt{3}$

3. i. $6\sqrt{30} + 60\sqrt{2}$

ii. $\frac{\sqrt{2}}{10} + 2\sqrt{2}$

iii. $20 + 9\sqrt{3}$

iv. $15\sqrt{10}$

v. $4\sqrt{5} + 25$

vi. $\sqrt{11}$

vii. 136

viii. $3\sqrt{2}$

ix. $\frac{1}{3}$

x. 2

xi. $134 - 24\sqrt{30}$

xii. $30 + 12\sqrt{6}$

4. i. $2\sqrt{2}$

ii. $66\sqrt{3}$

iii. $-\frac{9\sqrt{2}}{2}$

iv. 170

v. $5\sqrt{2}$

vi. $8\sqrt{3}$

Exercise 3.4

1. i. $\sqrt{6} + 2$

ii. $10 - \sqrt{10}$

iii. $3 + 2\sqrt{2}$

iv. $3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$

v. $5\sqrt{10} - 3$

vi. $4\sqrt{5} + 11$

vii. $\sqrt{11} - \sqrt{7}$

viii. $9 + 3\sqrt{7}$


2. i. $\frac{10-\sqrt{2}}{98}$ ii. $\frac{2\sqrt{5}-3}{11}$ iii. $\frac{-4\sqrt{3}+3\sqrt{6}}{6}$ iv. $16(2\sqrt{3}-11)$
 v. $\frac{83-18\sqrt{2}}{79}$ vi. $\frac{11+3\sqrt{3}}{2}$ vii. $\frac{15(7+2\sqrt{5})}{29}$ viii. $\frac{123-22\sqrt{2}}{119}$
 ix. $\sqrt{17}-4$ x. $\sqrt{17}+4$
3. i. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=256$ ii. $x=\frac{1}{2\sqrt{28}-11}$
 iii. $x+\frac{1}{x}=6, x-\frac{1}{x}=-4\sqrt{2}, x^2+\frac{1}{x^2}=34, x^2-\frac{1}{x^2}=-24\sqrt{2}, x^4+\frac{1}{x^4}=1154$
4. i. $\frac{(\sqrt{x+3}+\sqrt{x-3})^2}{6}$ ii. $\frac{(\sqrt{x+3}-y)^2}{5}$ iii. $-\frac{10(6+\sqrt{y^2+36})^2}{y^2}$
 iv. $-\frac{5(6-\sqrt{y^2+36})^2}{y^2}$ v. $30+40\sqrt{2}$ vi. $\frac{3(4-\sqrt{6})}{46}$

Review Exercise 3

1. i. b ii. b iii. a iv. a v. a vi. a
 vii. b viii. a ix. a x. a xi. a xii. b
2. i. Non-negative ii. $2+\sqrt{3}$ iii. 4
 iv. Irrational expression v. x^4+y^4

Exercise 4.1

1. i. $4(x+4y+6z)$ ii. $x^2(1+3y+4y^2z)$
 iii. $3pq(r+2t+5)$ iv. $9qr(s^2+t^2)(1+2qr)$
 v. $\frac{xz}{4}\left(\frac{z}{4}-\frac{xz}{2}+\frac{xz^2}{3}\right)$ vi. $a(x-y)(1-ab+ab^2)$
2. i. $(7+z)(x+z)$ ii. $(9ab-6c)(a+2b)$
 iii. $(t-2p)(6+4q)$ iv. $(r+9s)(r-7s)$



v. $\frac{1}{4}(y^2 - 4^2z) - \frac{z^2t}{9}(1+z)$

vi. $\frac{5x}{11}(2y+z) - \frac{7y}{11}(2z+x)$

3. i. $(2a+3b)^3$

ii. $(6x^2+1)^2$

iii. $\frac{1}{4x^2}(2x^2+1)^2$

iv. $(9y+8z)^2$

v. $(a^2b+25)^2$

vi. $(a+0.2)^2$

4. i. $(b^2-2c^2)^2$

ii. $\left(\frac{3x^2}{2} + \frac{2}{3x^2}\right)^2$

iii. $2ab^3(a-4b)^2$

iv. $[3(p+q)-r^2]^2$

v. $(xy-0.05)^2$

vi. $[(a-b)-9]^2$

5. i. $(2a+3b)(2a-3b)$

ii. $(4x+5y)(4x-5y)$

iii. $(10xz+y^2)(10xz-y^2)$

iv. $\left(\frac{x^2}{10}+10y^2\right)\left(\frac{x^2}{10}-10y^2\right)$

v. $\left(\frac{8f}{9}+\frac{9g^2}{8}\right)\left(\frac{8f}{9}-\frac{9g^2}{8}\right)$

vi. $\left(\frac{x^2}{11}+11y\right)\left(\frac{x^2}{11}-11y\right)$

6. i. $[(2x+z)+(2x-z)][(2x+z)-(2x-z)]$

ii. $[(4a-9b)+(2a+5b)][(4a-9b)-(2a+5b)]$

iii. $[(13x^2)+(3t+4)][(13x^2)-(3t+4)]$

iv. $[(9x^2-4y^2)+(4x^2-y^2)][(9x^2-4y^2)-(4x^2-y^2)]$

v. $\left[\left(a+\frac{1}{a}\right)+\left(b-\frac{1}{b}\right)\right]\left[\left(a+\frac{1}{a}\right)-\left(b-\frac{1}{b}\right)\right]$

vi. $\left[\left(3x+\frac{1}{3x}\right)+\left(2y-\frac{1}{2y}\right)\right]\left[\left(3x+\frac{1}{3x}\right)-\left(2y-\frac{1}{2y}\right)\right]$

7. i. $((x+y)+3z^2)((x+y)-3z^2)$ ii. $((2a+2b^2)+3c)((2a+2b^2)-3c)$

iii. $(4d^2+(c^2-d))(4d^2-(c^2-d))$ iv. $(2(x+y^2)+3y^3)(2(x+y^2)-3y^3)$



$$\text{v. } \left(\frac{8f}{9} + \frac{9g^2}{8} \right) \left(\frac{8f}{9} - \frac{9g^2}{8} \right)$$

$$\text{vi. } \left(\frac{x^2}{11} + 11y \right) \left(\frac{x^2}{11} - 11y \right)$$

$$8. \text{ i. } (\sqrt{ab} - \sqrt{c})(\sqrt{ab} + \sqrt{c})$$

$$\text{ii. } (\sqrt{4x} + \sqrt{9y})(\sqrt{4x} - \sqrt{9y})$$

$$\text{iii. } \left(\sqrt{yz} + \frac{1}{\sqrt{yz}} \right) \left(\sqrt{yz} - \frac{1}{\sqrt{yz}} \right)$$

$$\text{iv. } \left(\sqrt{xzt} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right) \left(\sqrt{xzt} - \frac{1}{\sqrt{t}} \right)$$

Exercise 4.2

$$1. \text{ i. } (a^2 + x^2 + ax)(a^2 + x^2 - ax)$$

$$\text{ii. } (b^2 - b + 1)(b^2 + b + 1)$$

$$\text{iii. } (a^4 + x^4 + a^2x)(a^4 + x^4 - a^2x)$$

$$\text{iv. } (z^2 + z + 1)(z^2 - z + 1)(z^4 - z^2 + 1)$$

$$2. \text{ i. } 2(7x+1)(3x-1)$$

$$\text{ii. } (b^2 - b + 1)(b^2 + b + 1)$$

$$\text{iii. } y(y + 21z^4)$$

$$\text{iv. } 3(8a-3)(a-3)$$

$$3. \text{ i. } (x+2y)^2 - 4xy$$

$$\text{ii. } 9(4x^4z^4 + y^4)$$

$$\text{iii. } (2t^2 + 10t + 25)(2t^2 - 10t + 25)$$

$$\text{iv. } (2t^2 + 2t + 1)(2t^2 - 2t + 1)$$

$$4. \text{ i. } (x-2)(x+5)$$

$$\text{ii. } (ab+2)(ab-5)$$

$$\text{iii. } (y-7)(y+14)$$

$$\text{iv. } (xyz-4)(xyz+6)$$

$$5. \text{ i. } \text{No factors}$$

$$\text{ii. } 2(21z^2 + 4)(z^2 + 1)$$

$$\text{iii. } (2x+1)(2x+5)$$

$$\text{iv. } (3x+y)(x-13y)$$

$$6. \text{ i. } (9x^2 + 4y^2 + 6xy)(9x^2 + 4y^2 - 6xy)$$

$$\text{ii. } (x^2 + 5 + 3x)(x^2 + 5 - 3x)$$

$$\text{iii. } (y^2 + 1)(y^2 - 8)$$

$$\text{iv. } (a+b)(a-b)(4a+9b)(4a-9b)$$

Exercise 4.3

$$1. \text{ i. } (x^2 - 4x + 4)(x^2 - 4x - 21)$$

$$\text{ii. } (x^2 + 5x + 3)(x^2 + 5x + 7)$$

$$\text{iii. } (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x + 10)$$

$$\text{iv. } (x^2 - 8x + 1)(x^2 - 8x - 1)$$

$$\text{v. } (x^2 + 9x - 2)(x^2 + 9x + 6)$$

$$\text{vi. } (x^2 - 5x - 6)(x^2 - 5x + 16)$$

2. i. $(x^2 + 5x - 2)(x^2 + 5x + 12)$ ii. $(x^2 - 12x + 30)(x^2 - 12x + 32)$
 iii. $(x - 5x - 5)(x - 5x + 15)$ iv. $(x^2 - 7x + 27)(x^2 - 7x - 5)$
 v. $(x^2 - 5x - 10)(x^2 - 5x + 20)$ vi. $(x^2 - 7x + 27)(x^2 - 7x - 5)$
3. i. $(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + 2\sqrt{3})(x - 2\sqrt{3})$
 ii. $(x + 1)(x - 1)(x + \sqrt{14})(x - \sqrt{14})$ iii. $(x^2 - 3)^2$
 iv. $(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})(x + 4\sqrt{2})(x - 4\sqrt{2})$
 v. $(x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5})(x + 2\sqrt{5})(x - 2\sqrt{5})$ vi. $(x^2 - 12)(x^2 - 2x - 12)$

Exercise 4.4

1. i. $(b + c)^3$ ii. $(2x + y)^3$ iii. $\left(4x + \frac{1}{4}\right)^3$
 iv. $(2x + 3)^3$ v. $\left(\frac{1}{3} + y^2\right)^3$ vi. $\left(\frac{2}{3}x + \frac{3}{2}y\right)^3$
 vii. $\left(\frac{4}{3} + x\right)^3$ viii. $\left(\frac{z}{2} + \frac{y}{3}\right)^3$
 2. i. $(d - 2c)^3$ ii. $\left(x^2 - \frac{4}{3}\right)^3$ iii. $\left(\frac{x}{5} - y\right)^3$
 iv. $(5z - y^2)^3$ v. $\left(\frac{z}{3} - 6\right)^3$ vi. $\left(\frac{b^2}{3} - \frac{c^2}{2}\right)^3$
 vii. $\left(6 - \frac{z}{2}\right)^3$ viii. $\left(\frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y\right)^3$

Exercise 4.5

1. i. $(x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2)$ ii. $a^2(a + b)(a^2 - ab + b^2)(a^6 - a^3b^3 + b^6)$
 iii. $(a^2 + 1)(a^4 - a^2 + 1)$ iv. $(ab + 8)(a^2b^2 - 8ab + 64)$

v. $b^3(a+3b)(a^2-3ab+9b^2)$ vi. $\left(\frac{x}{5} + \frac{5}{x}\right)\left(\frac{x^2}{25} + \frac{25}{x^2} - 1\right)$

vii. $(x^3 + xy^2z^3)(x^6 - x^4y^2z^3 + x^2y^4z^6)$

viii. $\left(\frac{x^2}{3} + \frac{2}{x}\right)\left(\frac{x^4}{9} - \frac{2x}{3} + \frac{4}{x^2}\right)$

2. i. $(x-2y)(x^2+2xy+4y^2)$ ii. $(x^3+2y^3)(x^6+2x^3y^3+4y^6)$

iii. $\left(10 - \frac{xy}{5}\right)\left(100 + 2xy + \frac{x^2y^2}{25}\right)$

iv. $(a+b)(a^2-ab+b^2)(a-b)(a^2+ab+b^2)$

v. $\left(\frac{x^2}{4} - \frac{4}{x^4}\right)\left(\frac{x^4}{16} + \frac{1}{x^2} + \frac{16}{x^8}\right)$ vi. $(x^4-y^4)(x^8+x^4y^4+y^8)$

vii. $\left(\frac{3}{x} - 2y^2\right)\left(\frac{9}{x^2} + \frac{6y^2}{x} + 4y^2\right)$ viii. $\left(2x^2 - \frac{1}{9}\right)\left(4x^4 + \frac{2x^2}{9} + \frac{1}{81}\right)$

Exercise 4.6

1. i. $R = -2$ ii. $R = 2$ iii. $R = 18$ iv. $R = -42$ v. $R = -11$

vi. $R = \frac{3}{2}$ vii. $R = -8$ viii. $R = 3y^4$

2. $m = -1$

3. $k = -24$

4. $r = 1, r = -3$

Exercise 4.7

1. i. $R = 0, q(x) = x^2 + 1$

ii. $R = -2, q(x) = x^2 - 2x + 1$

iii. $R = -60, q(x) = x^2 - 8x + 27$

iv. $R = 4, q(x) = x^2 + 8x + 5$

v. $R = 29, q(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - 15$

vi. $R = 1, q(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$

vii. $R = 29, q(x) = x^4 - 3x^3 + 10x^2 - 32x + 96$

viii. $R = 174, q(x) = x^4 + 2x^3 + 7x^2 + 18x + 60$

ix. $R = 175, q(x) = 2x^3 + 2x^2 + 104x + 40$

x. $R = -300$, $q(x) = 6x^3 - 42x^2 + 90x - 114$

2. $k = 24$

3. $m = 4$

4. $m = -24$

5. $m = -1$

Exercise 4.8

1. i. $(x-1)(x^2+1)$

ii. $(x+1)(x+1)(x-1)$

iii. $(x-1)(x-2)(x-3)$

iv. $(x+2)(x-2)(x+3)$

v. $(x+1)^2(x-1)$

vi. $(x-2)(x+3)(x-3)$

vii. $(x+1)(2x-1)(3x+2)$

viii. $(x+1)(x+3)(x+4)$

ix. $(x+1)(2x-1)(x+3)$

x. $(x+1)(x+2)(x+4)$

xi. $(x+2)(x+3)(x+4)$

xii. $(x+2)(x+4)(x+6)$

Review Exercise 4

1. i. True

ii. True

iii. True

iv. False

v. False

vi. True

2. i. $4x + y^2$

ii. $x^2 + 4xy + 16y^2$

iii. $x + 3$

iv. $2xy$

v. $a^2 - 3ab + 9b^2$

3. i. b

ii. c

iii. d

iv. a

v. b

vi. c

Exercise 5.1

1. i. $و.ع.پ.و = 1$

ii. $و.ع.پ.و = 6r^3s^3t^3$

iii. $و.ع.پ.و = (x+3)$

iv. $و.ع.پ.و = (2x-3)$

v. $و.ع.پ.و = 2(a+2b)$

vi. $و.ع.پ.و = (x+3)(x+4)$

2. i. $و.ع.پ.و = (x+1)$

ii. $و.ع.پ.و = (x+3)(x+4)$

iii. $و.ع.پ.و = 1$

iv.

3. i. $ن.ع.پ.و = 81a^4b^5c^8$

ii. $7800p^5q^4r^8$

iii. $(x-1)(3x-2)$

iv. $(x+4)(x+7)(x-3)$

v. $(3x+1)(2x+3)(2x^2-5x-11)(x-4)$

vi. $(x^3 + y^3)(x + y)(x^4 + x^2y^2 + y^4)$

4. i. $(x - 20)(x - 5)(x + 4)$

ii. $(3x + 2)(x + 4)(2x - 1)$

iii. $(x^2 - y^2 - z^2 - 2yz)(y^2 - z^2 - x^2 - 2xz)$

iv. $12x^2(x - 4)(x + 7)(x - 2)$

5. $(x - 8)(x - 3)(x^2 - 6x + 6)$

6. $x^2 + 2x - 3$

7. $9x^4 + 15x^3 - 12x - 14x^2 + 8$

8.

9. 6 س.س

10. 48 منت

Exercise 5.2

1. i. $\frac{7x + 3}{(x + 1)^2}$

ii. $\frac{12x^2 + 29x + 16}{3x(2x + 1)(x + 1)}$

iii. $\frac{-4x^3 + x^2 + 9x - 4}{(x + 1)^2(x - 3)}$

iv. $\frac{2(x^2 + 3x + 3)}{(x + 1)(x + 2)(x + 3)}$

v. $2x + 6$

vi. $\frac{x + 3}{x + 9}$

vii. $\frac{-(x + 3)(4x + 7)}{(-x - 1)^2(x + 2)}$

viii. $\frac{-2x - 7}{(x - 2)(x - 3)}$

ix. $\frac{x^2 - 5x - 42}{(x^2 - 9)(x + 4)(x + 5)}$

x. $\frac{2(x^2 + 5)}{4x^2 + x + 2}$

Exercise 5.3

1. i. $6x - 5y$

ii. $3x + \frac{1}{x}$ iii. $2x^2y^2 - \frac{3xy}{z^2}$

iv. $2\sqrt{9(2x - 3)^2 + 2y(24 + 10x - 15)}$

v. $\sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 4\left(x - \frac{1}{x}\right) + 2}$

vi. $x - 1 + \frac{1}{x}$

vii. $x^2 - 4 + \frac{1}{x^2}$

viii. $x^3 - 2 + \frac{1}{x^3}$

2. i. $x^2 + x + 1$

ii. $(x - 1)(x - 3)$

iii. $(x + 3)(x + 5)(x + 2)$

iv. $\left(\frac{x}{y} + 7 - \frac{y}{x}\right)$

v. $x - 1 + \frac{1}{x}$

vi. $x + \frac{y}{3} + 3z$

vii. $x^2 - 4 + \frac{1}{x^2}$

viii. $x^3 - 2 + \frac{1}{x^3}$

3. -7

4. $-(24x^2 - 9)$

5. $m = 20$

6. $p = -56, q = -49$

Review Exercise 5

1. i. True

ii. False

iii. False

iv. False

v. True

2. i. 2

ii. $p(x)xq(x)$

iii. y

iv. $(y+1)(y+2)(y+3)$

v. $y + \frac{1}{y}$

3. i. d
vii. c

ii. d
viii. b

iii. b
ix. b

iv. c
x. c

v. b

vi. d

Exercise 6.1

1. i. $x = 20$

ii. $x = -12$

iii. $x = 30$

iv. $x = 40$

v. $y = \frac{1}{15}$

vi. $y = \frac{11}{20}$

vii. $x = \frac{44}{17}$

viii. $x = 105$

ix. $\frac{105}{13}$

x. $x = 1$

xi. $x = -\frac{20}{7}$

xii. $x = 12$

xiii. $x = -\frac{5}{4}$

xiv. $x = -4$

xv. $m = \frac{-11}{6}$

2. $x = \frac{25}{2}$

3. $x = 7$

4.

سال = 18 بلال
سال = 12 علي

5. i. $x = 1$

ii. $x = 10$

iii. $y = 100$

iv. $x = -12$

v. $y = 143$

vi. $x = 4$

vii.

viii. $x = 81$


ix. $x = 80$

Exercise 6.2


1. i. $\left\{-\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right\}$ ii. $\left\{1, \frac{19}{5}\right\}$ iii. $\{-42, 42\}$ iv. $\left\{-\frac{25}{2}, \frac{23}{2}\right\}$
 v. $\left\{-\frac{9}{5}, 3\right\}$ vi. $\left\{-\frac{78}{5}, \frac{76}{5}\right\}$ vii. $\left\{-\frac{23}{2}, \frac{17}{2}\right\}$ viii. $\{-10, 6\}$
 ix. $\left\{-\frac{19}{14}, -\frac{13}{14}\right\}$ x. $\{-41, 44\}$
2. $x \geq 87$ 3. $\frac{-8}{3}, \frac{-4}{3}$

Exercise 6.3


1. i.
- $x > 13$




- ii.
- $y < 5$




- iii.
- $y < 5$



- iv.
- $-\frac{5}{3} < x$
- and
- $x < -1$



- v.
- $-\frac{19}{2} < y$
- and
- $y < \frac{3}{2}$



vi. $y > -\frac{33}{4}$




Review Exercise 6


1. i. T ii. F iii. F iv. F v. T
 2. i. 2 ii. $p(x)xq(x)$ iii. y
 iv. $(y+1)(y+2)(y+3)$ v. $y + \frac{1}{y}$
 3. i. a ii. a c a iii. b iv. c
 v. c vi. c c a

Exercise 7.1


1. i. $x = -2, y = 2$ ii. $x = 5, y = -1$ iii. $x = 4, y = 0$
 iv. $x = 4, y = 0$ v. $x = 3, y = 4$ vi. $x = -\sqrt{8}, y = \sqrt{8}$
 2. i. چوتائي ۾ موجود آهي - IV ii. چوتائي ۾ موجود آهي - II
 iii. چوتائي ۾ موجود آهي - IV iv. چوتائي ۾ موجود آهي - III
 v. چوتائي ۾ موجود آهي - I vi. چوتائي ۾ موجود آهي - I
 3. i.




ii.




iii.




4.




5.




6.



7.



8.

9. i. $y = 2 - x$

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
Y	5	4	3	2	1	0	-1

ii. $y = 2x - 6$

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
Y	12	10	8	6	4	2	0

iii. $x = 12 - 2y$

Y	-3	-2	-1	0	1	2	3
X	18	16	14	12	10	8	6


iv. $x = 2y - 3$

Y	-3	-2	-1	0	1	2	3
X	-9	-7	-5	-3	-1	1	3

Exercise 7.2


1. $y = 6 - x$

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
Y	9	8	7	6	5	4	3




3. i.

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
Y	3	3	3	3	3	3	3




ii.

X	3	3	3	3	3	3	3
Y	-3	-2	-1	0	1	2	3




iii.

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
Y	0	0	0	0	0	0	0




v.

X	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Y	-3	-2	-1	0	1	2	3



vi.

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
Y	6	4	2	0	-2	-4	-6



4. i.

مساوات	-X محدد	-Y محدد
$y = \frac{1}{2}x$	0	0
	4	2

ii.

مساوات	-X محدد	-Y محدد
$y = \frac{2}{3}x$	1	$\frac{3}{2}$
	1	$\frac{3}{2}$

iii.


مساوات	-X محدد	-Y محدد
$2x + 4y = 8$	0	2
	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{4}$

iv.

مساوات	-X محدد	-Y محدد
$2x + y = 6$	1	4
	3	0

v.	مساوات	X - محدد	Y - محدد
	$x - y = 2$	2	0
		1	-1

vi.	مساوات	X - محدد	Y - محدد
	$x - 3y = 6$	3	-1
		3	-1



6. a. 100 کلومیٹر سواری کرڻ لاءِ عائشہ کی گھربل وقت 5 کلاڪ آهي
b. ٽوٽل 3 کلاڪن ۾ عائشہ جو طئه ڪيل مفاصلو 60 کلومیٽر آهي

Exercise 7.3

کلومیٽر

1. i. 1.6 کلومیٽر ii. 4.8 کلومیٽر iii. 1.2 ميل iv. 4.9 ميل ۽ 5 ميل
2. i. 5 acres ii. 12 acres iii. 2 hectares iv. 6 hectares
3. i. 35.6°F ii. 35.24°F iii. 0°C iv. 2.44°C
4. i. 131.8 روپيه ii. 228.47 روپيه iii. 3.41 ريال iv. 1.78 ريال
5. i. $\{3, -2\}$ ii. $\{3, 1\}$ iii. $\{3, 1\}$ iv. $\{4, 7\}$ v. $\{1, 1\}$
vi. $\{-3, -4\}$ vii. $\{-3, 2\}$ viii. $\{1, 1\}$ ix. $\{8, 4\}$ x. $\{5, 1\}$

Review Exercise 7

1. i. T ii. F iii. F iv. F
3. i. c ii. b iii. a iv. b v. c vi. a vii. a

Exercise 8.1

1. i. $\{-2, -3\}$ ii. $\left\{\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right\}$ iii. $\{6, 5\}$ iv. $\{2, 0\}$
 v. $\{5, -3\}$ vi. $\left\{\frac{8}{3}, \frac{3}{4}\right\}$ vii. $\{8, 2\}$ viii. $\left\{0, -\frac{8}{3}\right\}$
2. i. $\{2\sqrt{2} - 3, 2\sqrt{2} - 3\}$ ii. $\left\{0, -\frac{10}{3}\right\}$ iii. $\left\{\frac{4+\sqrt{3}}{3}, \frac{4-\sqrt{3}}{3}\right\}$
 iv. $\left\{\frac{3}{4}, -\frac{7}{6}\right\}$ v. $\left\{4, -\frac{3}{2}\right\}$ vi. $\left\{\frac{-1+\sqrt{6}}{2}, \frac{-1-\sqrt{6}}{2}\right\}$
3. i. $b = -2$ ii. $\frac{-b-6}{3}$

Exercise 8.2

1. i. $\{5, -3\}$ ii. $\left\{\frac{3}{5}, \frac{5}{2}\right\}$
 iii. $\left\{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$ iv. $\left\{\frac{-1+2\sqrt{7}}{3}, \frac{-1-2\sqrt{7}}{3}\right\}$
 v. $\left\{\frac{2+3i\sqrt{5}}{3}, \frac{2-3i\sqrt{5}}{3}\right\}$ vi. $\left\{\frac{-3+\sqrt{41}}{4}, \frac{-3-\sqrt{41}}{4}\right\}$
 vii. $\left\{\frac{1+i\sqrt{5}}{3}, \frac{1-i\sqrt{5}}{3}\right\}$ viii. $\left\{\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right\}$
 ix. $\left\{\frac{5}{2}, 0\right\}$ x. $\{1, -1\}$
 xi. $\{3, 3\}$ xii. $\{\sqrt{14}, -\sqrt{14}\}$

Exercise 8.3

1. i. $\{\pm 3, \pm i\}$ ii. $\{\pm 2, \pm i\}$
 iii. $\left\{\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{6}}{3}\right\}$ iv. $\left\{-\frac{3}{4}, -2\right\}$
 v. $\left\{\frac{\pm \sqrt{(6+2\sqrt{14})3}}{3}\right\}$ vi. $\{-1, 2\}$
 vii. $\{1\}$ viii. $\{1\}$
 ix. $\{1+i, 1-i\}$ x. $\{-2\}$
 xi. حل نه آهي xii. $\left\{\frac{-7 \pm \sqrt{45+4\sqrt{81}}}{2}, \frac{-7 \pm \sqrt{45-4\sqrt{81}}}{2}\right\}$
 xiii. $\{-1, 1\}$ xiv. $\{-1, 1\}$
 xv. $\left\{1, \frac{1 \pm i\sqrt{55}}{2}\right\}$ xvi. $\{1\}$

Exercise 8.4

2. i. $x=4$ ii. $x=6$ iii. $x=1$
 iv. $x=2$ v. $\{3, 0\}$ vi. $\{1, -4\}$
1. i. 2 ii. $ax^2 + bx + c = 0$ iii. سگه واري صورت
 iv. $x=2$ v. $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
2. i. b ii. a iii. c iv. a v. a
 vi. c vii. b viii. a ix. c x. a
3. i. F ii. T iii. F iv. F
 v. F vi. T vii. T

Review Exercise 9


1. 30°
2. i. T ii. F iii. T iv. F v. F
3. i. $\overline{DF}$ ii. $\angle PQR$ iii. 65°
iv. ٽپور پاسو v. هٿپاتينيوڙ vi. 180°
4. i. b ii. c iii. b iv. c

Review Exercise 10

1. i. يڪسان ii. يڪسان iii. يڪسان iv. اڌڪنڊڙ
v. برابر vi. يڪسان vii. 180°
2. i. d ii. a iii. d iv. a v. c
vi. b vii. b viii. a

Exercise 11.1

3. گول جو مرڪز ليڪ جي عمودي اڌڪنڊڙ جي ميلاپ سان حاصل ٿيندو آهي ڇاڪاڻ ته هي ڪيپڊڙ ٽپڪو هر هڪ ليڪ کان هڪ جيتري مفاصلي تي هوندو آهي




Review Exercise 11


3. i. T ii. F iii. T
4. i. c ii. a iii. b iv. a

Exercise 12.1

2.



3.




Review Exercise 12


1. i. T ii. F iii. T iv. F v. True
2. i. عمود ii. وڌو آهي iii. BC
3. i. a ii. b

Exercise 13.1


1.




2.



3.




4.




6.


i.



ii.




iii.




7.


i.



ii.




iii.




Exercise 13.2


1.




2.




3.




4.




5.



6.




7.




8.


i.




ii.



9.




10.






Exercise 13.3

1.



2.





Review Exercise 13

1. i. هٽپاٽينوز ii. ٽڪنڊي جو عمود iii. Median
iv. هڪ جيتري مفاصلي تي v. برابر
2. i. c ii. b iii. c iv. b v. a
vi. d vii. c viii. b ix. d

Exercise 14.1

3. $\Delta BCD = 25.7 \text{ cm}$
4. ΔBCD ٽڪنڊي جي ايراضي $\Delta ACD =$ ٽڪنڊي جي ايراضي
6. ٽڪنڊي جا عمود
8. $\Delta BOC =$ ايراضي ΔAOB ايراضي ΔDOA ايراضي ΔCOD

Review Exercise 14

1. i. T ii. T iii. F iv. T v. F
vi. F vii. T viii. T
2. i. c ii. b iii. c iv. b v. d vi. b

Exercise 15.1

1. i. $AB = 3\sqrt{7}cm$, ایراضي $=8cm$
 ii. $AB = 4\sqrt{7}cm$, ایراضي $=14cm$
2. $AC = 2cm$, ایراضي $=6cm$ پاسي جي ڊيگهه
3. $AC = 4cm$, ایراضي $=17cm$ پاسي جي ڊيگهه

Exercise 15.2

1. i. $m\overline{AB} = 10cm$ ii. $x = 6$ iii. $x = 1$
 iv. $x = 2$ v. $\{3, 0\}$ vi. $\{1, -4\}$
2. $m\overline{AB} = 10cm$ 3. $m\angle A = 37^\circ$
4. اڻپور پاسو ڳوٺي ڪنڊ ٽڪنڊو 5. اڻپور پاسو سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو

Review Exercise 15

1. i. $(m\overline{BC})^2$ ii. ٽيپور پاسو iii. iv. ٽڪنڊو
2. $m\overline{AB} = 8cm$

Exercise 16.1

1. i. $\sqrt{101}$ ii. 1 iii. $2\sqrt{2}$ iv. $2\sqrt{2}$
2. i. $4\sqrt{2}$ ii. $\sqrt{117} 1$ iii. 5 iv. $\sqrt{6}$
3. $P = 12$

Exercise 16.2

4. ٽپڪا A, B ۽ C پور پاسو ٽڪنڊو ٺاهيندا
5. ٽپڪا A, B ۽ C ڳوٺي ڪنڊ ٽڪنڊو ٺاهيندا
6. $K = 4, K = -2$ يا $\{4, -2\}$
9. ڇا ڪاڻ ته چورسن جا پاسا برابر هوندو آهن ۽ هي ٽپڪا برابر آهن.

Exercise 16.3

1. i. $(-1, 7)$ ii. $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ iii. $(-4, 3)$ iv. $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$
2. $(-1, 1)$ 3. $B = (2, 2)$ 4. $(4, 5)$

Review Exercise 16

1. i. T ii. F iii. F iv. F v. T
vi. T vii. F viii. T ix. T
2. i. $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ii. لیك iii. $y < 0$
3. i. c ii. a iii. d iv. d