

علم کیمیا

دھین کلاس



سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ چامشورو

چینڈر: گابا سنز، کراچی.



سڀ حق ۽ واسطا سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄامشورو وٽ محفوظ آهن.

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق) پاران سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄامشورو لاءِ تيار ڪيو ويو. ڊائريڪٽوريٽ آف ڪريڪيولر ۽ ريسرچ سنڌ ڄامشورو جي صوبائي ريويو ڪميٽي پاران نظرثاني ڪيل. بورڊ آف انٽرميڊيئيٽ اينڊ سيڪنڊري ايجوڪيشن، حيدرآباد، ڪراچي، سکر، لاڙڪاڻو، ميرپورخاص ۽ شهيد بينظيرآباد لاءِ ڏهين درجي لاءِ درسي ڪتاب طور منظور ٿيل. اسڪول ايجوڪيشن اينڊ لٽريسي ڊپارٽمينٽ حڪومت سنڌ کان نوٽيفڪيشن نمبر No. SED/HCW/181/2018 dated 03-09-2020 موجب منظور شده.

سرپرست اعليٰ:

پرويز احمد بلوچ

چيئرمين سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄامشورو

شاهد وارثي

مينيجنگ ڊائريڪٽر

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق)

خواجہ آصف مشتاق

پروجيڪٽ ڊائريڪٽر

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق)

دريوش ڪافي

سپروائزر

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

يوسف احمد شيخ

چيف سپروائزر

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

رفيع مصطفيٰ

پروجيڪٽ مينيجر

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ

ڪوالٽي (آفاق)

ليکڪ:

ڊاڪٽر آفتاب احمد ڪانڌڙو ★

ڊاڪٽر مظهر اقبال ★

مسٽر حنيف دراني ★

مس پروين آرائين ★

مسٽر مير محمد ★

سنڌيڪار:

شاهنواز بلوچ ★

ايڊيٽر:

نريش ڪمار شيواڻي ★

انور علي چانڊيو ★

نظرثاني ڪندڙ:

پروفيسر ڊاڪٽر آفتاب احمد ڪانڌڙو ★

مسٽر محمد حنيف خان ★

مسٽر باسط محي الدين ★

مسٽر قدير خان پنهور ★

مسٽر ڪامران نواز ميمڻ ★

مسٽر انور علي چانڊيو ★

مس ماجدا سومرو ★

مس ردا سحر ★

ڪمپوزنگ:

فرحان علي ڀٽي ★

سهڪار ڪندڙ ۽ ٽيڪنيڪي معاونت:

مسٽر محمد ارسلان شفاعت گدي ★

هي ڪتاب پنجاب پرنٽنگ پريس، ڪراچي ۾ ڇپيو

جنهن صدي ۾ اسان قدم رکيو آهي اها سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي صدي آهي. جديد علم ڪيميا نه صرف سائنس جي سڀني شاخن، پر انساني زندگيءَ جي هر پهلو تي به اثر انداز ٿي رهي آهي.

شاگردن کي جديد معلومات کان آگاهه رکڻ لاءِ اهو لازمي آهي ته ڪيمسٽري جي سڀني شاخن ۾ گهڻ طرفي ترقي سان مطابقت رکندي، نصاب کي سڀني سطحن تي باقاعدي طور تي اپڊيٽ ڪيو وڃي.

ڏهين ڪلاس لاءِ ڪيمسٽري جو هي ڪتاب به تازو ان تناظر ۾ وزارت تعليم، حڪومت پاڪستان، اسلام آباد پاران تيار ڪيل ۽ ڊائريڪٽوريٽ آف ڪريڪيولم اسيسمنٽ ۽ ريسرچ ڄام شورو سنڌ جي ٽيم پاران جائزو ورتل نصاب جي مطابق لکيو ويو آهي. ڪيمسٽري جي اهميت ۽ وقت جي ضرورتن کي نظر ۾ رکندي عنوانن تي نظرثاني ڪري ٻيهر لکيو ويو آهي.

هي ڪتاب انن بابن تي مشتمل آهي جن کي نصاب جي ضرورتن پٽاندڙ سهيڙي لکيو ويو آهي. روزمره جي زندگي تي ڪيمسٽري جي اثرن ۽ عملي استعمال تي خاص زور ڏنو ويو آهي. ڪيمسٽري جي مختلف شاخن تي ڌيان ڏنو ويو آهي. جديد دنيا جو حصو هجڻ جي ناتي ملڪي مسئلا ۽ پهلو به بحث هيٺ رهيا آهن.

تعارفي پيراگراف، معلومات وارا خانا، باب جو خلاصو ۽ مختلف نوعيت جون مشقون وڌائڻ سان نه رڳو ٻارن جي دلچسپي وڌندي پر ڪتاب جي افاديت ۾ پڻ اضافو ٿيندو.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ هن ڪتاب جي اشاعت ۾ گهڻي محنت، ڪوشش ۽ خرچ ڪيو آهي. هي درسي ڪتاب حرف آخر نه آهي، هميشه سڌارن لاءِ گنجائش موجود رهي ٿي. ليکڪن پنهنجي وس آهر بهترين ڪوشش ڪئي، تنهن هوندي به تصورن توڙي پيشڪش ۾ اوڻاين جو انديشو رهي ٿو. تنهنڪري محترم استاد صاحبان ۽ شاگردن کي گذارش آهي ته مهرباني ڪري متن يا خاڪن ۾ خامين ۽ غلطي جي نشاندهي ڪن ۽ ايندڙ چاپي جي وڌيڪ بهتري لاءِ مناسب تجويزون پڻ موڪلين.

آخر ۾ آئون هن علمي مقصد لاءِ ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق)، ليکڪن، ايڊيٽرن ۽ بورڊ جي ماهرن جي خدمتن جو شڪر گذار آهيان.

چيئرمين

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

فهرست



نمبر	مضمون	صفحو
1	کیمیائی توازن	01
2	تیزاب، اساس ۽ لوڻ	19
3	نامیاتی کیمیا	33
4	حیاتیاتی کیمیا	56
5	ماحولیاتی کیمیا I: وایومنڊل	74
6	ماحولیاتی کیمیا II: پاڻي	89
7	تجزیاتی کیمیا	104
8	صنعتی کیمیا	123
9	لغت (Glossary)	137



باب 1

کیمیائي توازن

وقت جي ورهاست

تدریسی پیریڈ = 12

تشخیصی پیریڈ = 02

سلیبس ۾ حصو = 12%

اهم تصورات:

- 1.1 بہ طرفو (Reversible) ردعمل ۽ متحرک (Dynamic) توازن.
- 1.2 ماس ایکشن وارو قانون ۽ توازن واري مستقل (Equilibrium Constant) جو ماخذ کیل اظہار.
- 1.3 توازن وارو مستقل ۽ ان جو ایکو (Unit).
- 1.4 توازن واري مستقل جي اہمیت.

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (Student Learning Outcomes)

هن باب سکڻ کان پوءِ شاگرد:

- کیمیائي توازن کي بہ طرفي ردعمل سان تشریح کری سگھندا.
- اڳيان وڌندڙ (Forward) ۽ موٽ کائيندڙ (Backward) ردعمل کي لکي سگھندا ۽ انھن جي میکرو اسڪوپ (Macroscopic) خاصیتن جي وضاحت کری سگھندا.
- ماس ایکشن (Mass Action) واري قانون جي وصف لکي سگھندا.
- توازن واري مستقل ۽ ان جي ایکي جو اظہار (Expression) لکي سگھندا.
- توازن لاءِ ضروري حالتن (Necessary conditions) ۽ توازن جي سڃاڻپ جي طریقن کي لکي سگھندا.
- ڪنھن ردعمل لاءِ توازن واري مستقل جي مساوات (Equation) جي وضاحت کری سگھندا.



تعارف

توهان کي خبر آهي ته اسان جي چوڌاري ڪيتريون ئي ڪيميائي ۽ طبعي تبديليون ٿين ٿيون جن جو ڪارڻ ڪيميائي رد عمل ٿي سگهي ٿو. انهي ردعمل دوران عامل (Reactants) پيداواري شين (Products) ۾ تبديل ٿين ٿا.

ردعمل ٻه طرفو (Reversible) ٿي سگهي ٿو جيئن: تڪثيف جو عمل، تبخير، ڄمڻ، پگهرجڻ وارو عمل. ۽ اهو هڪ طرفو (Irreversible) عمل به ٿي سگهي ٿو جيئن: زنگجڻ، سڙڻ وارو عمل. ٻه طرفو ردعمل ڪڏهن به مڪمل ناهي ٿيندو، ڇو ته پيداوار شيون واپس عامل ۾ تبديل ٿينديون آهن انڪري اهو ردعمل ٻه طرفو (اڳيان وڌندڙ ۽ واپس موٽ کائيندڙ) ٿئي ٿو. ان رد عمل دوراها حالت جتي اڳيان وڌندڙ



(Forward) ردعمل ۽ واپس موٽ کائيندڙ ردعملن جي شرح / رفتار برابر هجي ته ان حالت کي ”توازن“ (Equilibrium) چئجي ٿو جنهن کي اسان هن باب ۾ تفصيل سان پڙهنداسين.


شڪل 1.1 ٻه طرفو ۽ هڪ طرفو ردعمل

ڇا توهان کي خبر آهي؟

اسان جي جسم ۾ توازن

اسان جي جسم ۾ روزانو توازن هلندو رهي ٿو. هيٺو گلوبن هڪ وڏو سالمو (Molecule) آهي، جيڪو اسان جي جسم اندر آڪسيجن کي ٽرانسپورٽ ڪري ٿو. ان جي بغير اسان زندهه نه رهي سگهنداسين. هيٺو گلوبن کي نه صرف آڪسيجن کڻڻ جي صلاحيت آهي پر ان کي آڪسيجن کي ڇڏي ڏيڻ جي به صلاحيت آهي. اهو عمل ڪيميائي توازن جي مدد سان اسان جي جسم اندر مختلف جڳهن تي ٿيندو رهي ٿو.

1.1 ٻه طرفو ردعمل ۽ متحرڪ (Dynamic) توازن



شڪل 1.2 ٻه طرفو عمل ذريعي حالتن جو تبديل ٿيڻ

ڪيميائي توازن



هڪ ڪيميائي ردعمل ڪيميائي تبديلي آهي جنهن ۾ عامل ۽ پيداوار شيون شامل هونديون آهن. مثال طور، پاڻي جو هائيڊروجن ۽ آڪسيجن گئسن مان ٺهڻ، سوڊيم بائڪاربونيت (NaHCO_3) جو سوڊيم ڪاربونيٽ (Na_2CO_3)، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2) ۽ پاڻي (H_2O) ۾ ٽٽڻ وغيره. ڪنهن به ڪيميائي ردعمل ۾ ٻه شيون هونديون آهن. هڪ عامل (Reactant) ۽ ٻي پيداوار شئي (Product)، جيڪي تير نشان ذريعي هڪ ٻئي کان الڳ هونديون آهن.



عامل


پيداوار شيون

ردعمل جي نوعيت جو اندازو تير جي قسم مان لڳائي سگهجي ٿو. هڪ منهن واري تير ($\rightarrow$) کي هڪ طرفي ردعمل (Irreversible) لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي ۽ ٻه اڌ منهن وارن تيرن ($\rightleftharpoons$) کي ٻه طرفي ردعملن لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي جيڪي ڪڏهن به پورا نٿا ٿين. ٻه طرفي ردعمل ۾ ٻه عمل ٿيندا آهن؛ اڳيان وڌڻ ۽ موٽ کائڻ. تنهنڪري حالتن جي آڌار ٻه طرفو ردعمل ڪنهن به طرف وڃي سگهي ٿو.




شڪل 1.3 تجربي گاهه ۾ امونيا جي تياري لاءِ
R.L. Rossignol ۽ F. Haber طرفان
استعمال ڪيل آلات (1908 ۾)


اچو ته امونيا (NH_3) جي ٺهڻ جو مثال وٺون. جڏهن نائيٽروجن گئس (N_2) جو هڪ مول هائيڊروجن (H_2) جي ٽي مولز سان تعامل ڪن ٿا ته ٻه مول امونيا گئس جا ٺهڻ ٿا. ان کي اڳيان وڌڻ وارو (Forward) ردعمل چئجي ٿو.



ان جي برعڪس، امونيا جي ٻه مولز کي نائيٽروجن جي هڪ مول ۽ هائيڊروجن جي ٻه مولز ۾ تبديل ڪري سگهجي ٿو. ان کي واپس موٽڻ وارو ردعمل چئجي ٿو.



جڏهن ٻنهي قسمن جي ردعمل کي گڏ ڪري ٻه طرفي ردعمل طور لکيو ويندو آهي ته ان کي هن ريت ڏيکارجي ٿو:






توهان کي خبر آهي ته توازن جي معنيٰ ”برابري“ آهي. اسان جي چوڌاري توازن مختلف حالتن ۾ موجود آهي.


ردعمل جي رفتار عامل جي مقدار تي دارومدار رکي ٿي. ردعمل جي شروعات ۾ عامل جي مقدار گهڻي هجڻ ڪري پيداوار شين جي نهڻ جي رفتار تيز هجي ٿي پر جيئن ئي عامل جي مقدار گهٽجندي آهي ته ردعمل جي رفتار به گهٽجي ويندي آهي. ڪجهه وقت کان پوءِ ان ردعمل دوران عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار مستقل ٿي ويندي آهي، ان لمحي يا حالت کي متحرڪ توازن (Dynamic Equilibrium) چئجي ٿو.

ردعمل جي اڳيان وڌڻ جي شرح = ردعمل جي واپس موٽ کائڻ جي شرح
 ٻه طرفي واري ردعمل ۾، ردعمل جي مڪمل ٿيڻ کان پهرين متحرڪ توازن قائم ٿي پوندو آهي. توازن قائم ٿيڻ سان اڳيان وڌڻ ۽ موٽ کائڻ وارن عملن جي شرح برابر ٿئي ٿي. هيٺين شڪل، جيڪا مقدار ۽ وقت سان لاڳاپيل آهي، ڏيکاري ٿي ته توازن تي ٻنهي عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار مستقل هجي ٿي.




شڪل 1.4 متحرڪ توازن

بند سرشتي يا نظام ۾ هائيڊروجن ۽ آئيڊين (I_2) جو ردعمل ڪري هائيڊروجن آئيڊائيڊ (HI) جو نهڻ، ردعمل دوران توازن جو هڪ مثال آهي. ردعمل جي شروعات ۾ I_2 ۽ H_2 جي مقدار گهڻي هجي ٿي ۽ پوءِ HI جي نهڻ سان انهن جي مقدار گهٽجي ويندي آهي. جيئن جيئن ردعمل اڳيان وڌندو آهي ته HI جي مقدار به وڌندي ويندي آهي ۽ جيئن ئي HI نهڻو آهي ته واپس موٽ کائڻ وارو ردعمل به شروع ٿي ويندو آهي.



جيتوڻيڪ ٻئي عمل اڳيان وڌڻ ۽ موٽ کائيندڙ ردعمل گڏ ٿيندا آهن پر بظاهر ڪابه تبديلي نظر نه ايندي آهي. ان حالت ۾ ردعمل مڪمل ناهي ٿيندو پر متحرڪ توازن تي پهچي ويندو آهي.



شکل 1.5 هائیڊروجن آئیوڊين وارو توازن

اڳيان وڌڻ واري ۽ موت کائيندڙ ردعمل جون مئڪرواسڪوپڪ خاصيتون.

اڳيان وڌڻ وارو ردعمل (Forward Reaction)

1. اهو ڪيميائي عمل دوران ڪافي ڪان ساڃي طرف ٿيندو (وڌندو) آهي.
2. عامل رد عمل ڪري پيداوار شيون ٺاهيندا آهن. پيداوار شيون $\longrightarrow$ عامل
3. ردعمل جي شروعاتي رفتار تيز هجي ٿي ۽ پوءِ اها گهٽجي ويندي آهي.

موت کائيندڙ ردعمل (Reverse Reaction)

1. اهو ڪيميائي عمل دوران ڪافي ڪان ساڃي طرف ٿيندو آهي.
2. پيداوار شين مان واپس عامل ٺهندا آهن. پيداوار شيون $\longleftarrow$ عامل
3. ردعمل جي شروعاتي رفتار سست هجي ٿي پر آهستي آهستي تيز ٿيندي آهي.

متحرڪ توازن تي اڳيان وڌڻ واري ۽ موت کائيندڙ ردعمل جون

مئڪرواسڪوپڪ (Macroscopic) خاصيتون:



1. متحرڪ توازن صرف بند نظام ۾ ٿيندو آهي جنهن ۾ نه عامل نه ئي پيداوار شيون داخل ٿين ٿيون نه ئي نڪرنديون آهن.
2. توازن تي، عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار مستقل ٿيندي آهي.
3. توازن تي، اڳيان وڌڻ وارو ۽ موت کائيندڙ ردعمل ساڳي شرح سان ٿين ٿا پر هڪ ٻئي جي ابتڙ طرفن ۾ هوندا آهن.
4. توازن ڪيميائي رد عمل (Chemical Reaction) جي ڪنهن به طرف کان ٿي سگهي ٿو.
5. توازن بگاڙجي سگهجي ٿو ۽ واپس قائم به ٿي سگهي ٿو. (ملييل مقدار، داپ ۽ گرمي پد تي).



آزمائشي سوال



1. هيٺ ڏنل ردعملن جو اڳيان وڌڻ وارو ۽ موٽ کائيندڙ ردعمل لکي ڏيکاريو.



1.2 ماس ايڪشن وارو قانون ۽ توازن واري مستقل جو ماخذ ڪيل اظهار:

ماس ايڪشن جو قانون چوي ٿو ڪنهن به ڪيميائي ردعمل جي شرح عامل شين جي ماسي جي ضرب اپت سان سڌي نسبت (Directly proportional) رکي ٿي. ماس ايڪشن جو قانون اهو به تجويز ڪري ٿو ته ڪيميائي توازن تي عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار جو تناسب (Ratio) مستقل ٿيندو آهي.

اچو ته ماس ايڪشن جي قانون کي خيالي به طرفي ردعمل تي لاڳو ڪيون.



پهرين اڳيان وڌڻ واري ردعمل تي بحث ڪريون ٿا، جتي A ۽ B عامل آهن جڏهن ته ”a“ ۽ ”b“ ڪيميائي مساوات کي متوازن ڪرڻ لاءِ مولز جي گهربل تعداد (سرا) آهن. ماس ايڪشن جي قانون مطابق اڳيان وڌڻ واري ردعمل کي هيئن لکبو:

$$R_f \propto [\text{A}]^a [\text{B}]^b$$

$$R_f = k_f [\text{A}]^a [\text{B}]^b$$

جڏهن ته k_f ردعمل جو ريت مستقل (Rate constant) آهي.

ساڳي طرح، موٽ کائيندڙ ردعمل جي رفتار C ۽ D جي مقدار سان سڌي نسبت رکي ٿي. جڏهن ته ”c“ ۽ ”d“ مولز جي تعداد آهن.

$$R_r \propto [\text{C}]^c [\text{D}]^d$$

$$R_r = k_r [\text{C}]^c [\text{D}]^d$$

هتي k_r موٽ کائيندڙ ردعمل جو مستقل آهي. توهان کي خبر آهي ته اڳيان وڌڻ واري ردعمل ۽ موٽ کائيندڙ ردعمل جي رفتار توازن تي برابر هوندي آهي.

$$R_f = R_r \quad \text{ان ڪري:}$$

R_f ۽ R_r جون قيمتون رکڻ کانپوءِ اسان کي مليو:

$$k_f [\text{A}]^a [\text{B}]^b = k_r [\text{C}]^c [\text{D}]^d$$

مستقلن کي ڪاٽي ۽ متغيرن / متجندڙ کي ساڄي پاسي رکڻ کان پوءِ مليو:

$$\frac{k_f}{k_r} = \frac{[\text{C}]^c [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b}$$



ڇا توهان کي خبر آهي؟



فعال ماس (Active Mass) ڇا آهي؟

فعال ماسي جو مطلب آهي مادي جي مقدار في يونٽ حجم (Volume) ۾. ان جو ايڪو mol-dm^{-3} آهي ۽ ان جي قيمت کي وڏي ڏنگي [] ۾ رکيو ويندو آهي.

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

$$K_c = \frac{k_f}{k_r}$$

تنهنڪري،

$$K_c = \frac{[\text{پيداوار شيون}]}{[\text{عامل}]}$$

جڏهن ته K_c کي توازن وارو مستقل سڏيو ويندو آهي.

اهو ثابت ٿي ويو ته ماس ايڪشن وارو قانون ردعمل جي رفتار کي عامل ۽ پيداوار شين جي فعال ماسي (Active Mass) سان نسبت ڏيکاري ٿو. سڀني ٻه طرفي ردعملن کي هيٺين ريت ظاهر ڪري سگهجي ٿو.

مثال نمبر 1:

سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ آڪسيجن گڏجي سلفر ٽراءِ آڪسائيڊ ٺاهن ٿيون. ان ٻه طرفي ردعمل جي متوازن مساوات هيٺين ريت آهي:



ماس ايڪشن جي قانون موجب:

$$k_f [\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2] = R_f = \text{رفتار}$$

$$k_r [\text{SO}_3]^2 = R_r = \text{موت ڪائيندڙ ردعمل جي رفتار}$$

توازن واري مستقل K_c جو اظهار هن ريت ٿيندو:


$$K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]}$$

آزمائشي سوال





فعال ماس جي وصف لکو.

ڏنل خيالي ردعملن جي مساوات مان سرن (Coefficients) جي سڃاڻپ ڪريو:



هيٺ ڏنل ردعمل جي K_c واري مساوات لکو:





1.3 توازن وارو مستقل (Equilibrium Constant) ۽ ان جو ايڪو (Unit)

جيسٽائين ردعمل جو توازن قائم ٿئي رد عمل دوران هر جز جي ارتڪاز جو مشاهدو ڪري توازن وارو مستقل معلوم ڪيو ويندو آهي ۽ پوءِ ان جي عددي قيمت (Numerical Value) معلوم ڪبي آهي. جنهن لاءِ توهان کي عامل ۽ پيداوار شين جي ارتڪاز جو تناسب معلوم ڪرڻو پوندو. جيئن ته ارتڪاز (Concentration) کي توازن تي معلوم ڪيو ويندو آهي ان ڪري ردعمل جي توازن واري مستقل جو تبديل ٿيڻ ناممڪن آهي ۽ تبديلي شروعاتي ارتڪاز تي دارو مدار نٿي رکي.


گرمي پڌ واحد عنصر آهي جيڪو توازن واري مستقل جي قيمت تي اثر انداز ٿئي ٿو. توازن واري مستقل جي اظهار جون اهم خاصيتون هي آهن:

1. K_c جو اطلاق صرف توازن تي ٿئي ٿو.
2. اها عامل ۽ پيداوار شين جي توازن مقدار کي mol-dm^{-3} ۾ ظاهر ڪري ٿي.
3. K_c عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار تي دارو مدار نٿي رکي.
4. K_c گرمي پڌ سان تبديل ٿئي ٿي.
5. K_c متوازن ڪيميائي مساوات جو سڀرو (Coefficient) آهي جنهن ۾ هر عامل ۽ پيداوار شين جي ارتڪاز K_c جي برابر هوندي آهي.
6. K_c توازن جي جڳهه يا طرف کي ظاهر ڪري ٿي. جيڪڏهن K_c جي قيمت 1 کان گهٽ آهي ردعمل موٽ کائيندڙ آهي. اگر 1 کان وڌيڪ آهي ته پوءِ ردعمل اڳيان وڌڻ وارو ٿيندو.
7. ياد رکو K_c عامل ۽ پيداوار شين جو تناسب آهي جيڪا ڪيميائي ورتاءُ جي وضاحت ڪري ٿي.

توازن تي:

اڳيان وڌڻ واري ردعمل جي رفتار = موٽ کائيندڙ ردعمل جي رفتار


مساوات جي ٻنهي پاسي اگر مولز جي برابر تعداد هوندي ته K_c جو ڪوبه يونٽ / ايڪو نه ٿيندو ڇو ته K_c جي اظهار ۾ ارتڪاز جي ايڪي کي استعمال ڪيو ويندو آهي جيڪو ڪٽجي ويندو آهي. ارتڪاز جو ايڪو mol-dm^{-3} آهي. هڪ ردعمل تي ويچار ڪيو:



$$K_c = \frac{[\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CO}_2][\text{H}_2]}$$

$$K_c = \frac{[\text{mol.dm}^{-3}][\text{mol.dm}^{-3}]}{[\text{mol.dm}^{-3}][\text{mol.dm}^{-3}]} = \text{ڪوبه ايڪو نه}$$

اگر ڪنهن مساوات ۾ عامل ۽ پيداوار شين جا مولز برابر نه هوندا ته پوءِ K_c جو ڪونه ڪو ايڪو ٿيندو. جيئن هيٺين مساوات ۾:






$$K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$$

$$K_c = \frac{[\text{mol.dm}^{-3}]^2}{[\text{mol.dm}^{-3}][\text{mol.dm}^{-3}]^3} = \frac{1}{[\text{mol.dm}^{-3}]^2} = \text{mol}^{-2}.\text{dm}^6$$

حسابي مثال نمبر 1:

جڏهن نائٽروجن مونو آڪسائيڊ (NO) گئس آڪسيجن (O₂) سان ردعمل ڪري نائٽروجن ڊاء آڪسائيڊ (NO₂) گئس ٺاهي ٿي ته توازن قائم ٿئي ٿو.



230°C گرمي پد تي توازن تي مائيل ارتڪاز آهي:

$$[\text{NO}] = 0.0542 \text{ mol.dm}^{-3}, [\text{O}_2] = 0.127 \text{ mol.dm}^{-3}, [\text{NO}_2] = 15.5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

ان گرمي پد تي توازن وارو مستقل معلوم ڪريو.

حل:

عامل ۽ پيداوار شين جي توازن مقدار مليل آهي:

$$[\text{NO}] = 0.0542 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{O}_2] = 0.127 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{NO}_2] = 15.5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

توازن جي اظهار کي هن ريت لکيو:

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{NO}]^2[\text{O}_2]}$$


هاڻي توازن مقدارن جي قيمت کي توازن واري اظهار ۾ رکيو:

$$K_c = \frac{[15.5 \text{ mol.dm}^{-3}]^2}{[0.0542 \text{ mol.dm}^{-3}]^2 [0.127 \text{ mol.dm}^{-3}]}$$

$$K_c = 6.44 \times 10^5 \text{ mol}^{-1}.\text{dm}^3$$

حسابي مثال نمبر 2:

آئرن ٿو (Ion) ۽ ڪلورائيڊ ٿو ۾ ردعمل هن ريت ٿئي ٿو:



توازن تي مائيل مقدار آهي:

$$[\text{Fe}^{3+}] = 0.2 \text{ mol.dm}^{-3}, [\text{Cl}^{-}] = 0.28 \text{ mol.dm}^{-3}, [\text{FeCl}_4^{-}]$$

$$= 0.95 \times 10^{-4} \text{ mol.dm}^{-3}$$

مليل مقدارن مان Kc کي معلوم ڪريو.



حل: عامل ۽ پيداوار شين جي مليل مقدار آهي:

$$[\text{Fe}^{+3}] = 0.2 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{Cl}^-] = 0.28 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{FeCl}_4^-] = 0.95 \times 10^{-4} \text{ mol.dm}^{-3}$$

توازن اظهار کي هن ريت لکبو:

$$K_c = \frac{[\text{FeCl}_4^-]}{[\text{Fe}^{+3}][\text{Cl}^-]^4}$$

هاڻي توازن مقدارن کي توازن واري اظهار ۾ رکبو:

$$K_c = \frac{[0.95 \times 10^{-4} \text{ mol.dm}^{-3}]}{[0.2 \text{ mol.dm}^{-3}][0.28 \text{ mol.dm}^{-3}]^4}$$

$$K_c = 7.72 \times 10^{-2} \text{ mol}^{-4} \cdot \text{dm}^{12}$$

حسابي مثال نمبر 3:

نائيتروجن آڪسائيڊس (NO_x) هوائي الودگي ڪندڙ آهن جيڪي گهڻي گرمي پد تي نائيتروجن ۽ آڪسيجن جي ردعمل سان پيدا ٿيندا آهن. 2000°C گرمي پد تي مليل ردعمل جي K_c جي قيمت آهي 4.1×10^{-4} .



ان گرمي پد ۽ 1 atm دٻ تي NO جي توازن مقدار (Equilibrium concentration)

معلوم ڪريو. هوا ۾ N_2 جي مقدار 0.36 mol/L ۽ O_2 جي 0.0089 mol/L آهي.

حل:

اسان کي NO کانسواءِ ٻين جي مقدار مليل آهي. انهيءَ ڪري اسان K_c واري اظهار جي مساوات کي ترتيب ڏئي ڪري ان جي مقدار معلوم ڪري سگهون ٿا.

$$K_c = \frac{[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2][\text{O}_2]}$$

$$[\text{NO}]^2 = K_c[\text{N}_2][\text{O}_2]$$

ٻنهي پاسي ٻيو مول (Square root) وٺڻ کان پوءِ مليو:

$$\sqrt{[\text{NO}]^2} = \sqrt{(4.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L})(0.036 \text{ mol/L})(0.0089 \text{ mol/L})}$$

$$[\text{NO}] = 3.6 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

1.4 توازن واري مستقل جي اهميت

K_c جي قيمت جو تبديل ٿيڻ جوابي عمل (Response) تي آڌار رکي ٿي. K_c نه صرف مستقل جو معلوم ڪرڻ آهي پر اها ردعمل جي طرف (Direction) ۽ وسعت (Extent) تي پڻ اثر انداز ٿئي ٿي.




1. ڪيميائي ردعمل جو طرف

جڏهن ٻه طرفو ردعمل ٿيندو آهي ته ردعمل جو طرف ڪنهن مخصوص وقت لاءِ معلوم ڪرڻ ڏکيو ٿي پوندو آهي. مثال طور N_2 ۽ H_2 مان NH_3 جي ججهي مقدار ٺاهڻ لاءِ اسان کي عمل جي طرف کي معلوم ڪرڻو پوندو. جيئن ته ان ردعمل دوران مخصوص وقت لاءِ ردعمل جي طرف جي اڳڪٿي ڪرڻ ڏکيو آهي. ردعمل جي ونڊ اُپٽ Q_c (Reaction quotient) ان معاملي ۾ اڳڪٿي ڪري سگهجي ٿي. ان جي مساوات K_c وانگر هوندي آهي، پر Q_c حقيقي مقدارن جو تناسب آهي نڪي توازن مقدارن جو.

Q_c ۽ K_c کي ڀيٽ ڪري ردعمل جي طرف جي اڳڪٿي ڪري سگهجي ٿي. ان لاءِ اسان وٽ ٽي زمرا آهن:

1. جيڪڏهن عامل ۽ پيداوار شين جي توازن مقدار جي لحاظ کان $Q_c = K_c$ آهي ته پوءِ سسٽم مستحڪم هوندو.
2. جيڪڏهن $Q_c < K_c$ آهي ته پوءِ توازن قائم ڪرڻ لاءِ پيداوار شين جو اضافو ٿيندو ۽ اڳيان وڌندڙ ردعمل ٿيندو.
3. جيڪڏهن $Q_c > K_c$ آهي ته پوءِ توازن قائم ڪرڻ لاءِ عامل شين جي مقدار وڌندي ۽ ردعمل موٽ کائيندڙ ٿيندو.




شڪل 1.6: ڪيميائي ردعمل جا طرف.

2. ردعمل جي وسعت:

مخصوص گرمي پد تي ردعمل جي وسعت ماپي ويندي آهي. توازن وارو مستقل ردعمل جي وسعت جي اڳڪٿي ڪري سگهجي ٿو. جيئن ته K_c جي قيمت تمام گهڻي، تمام ٿوري ۽ درمياني ٿي سگهجي ٿي ان ڪري وسعت ۾ به ائين ئي رجحان ٿيندو. K_c (i) جي تمام ٿوري قيمت:


جن ردعمل جي K_c تمام ٿوري هوندي آهي اهي ڪڏهن به پورا ناهن ٿيندا. مطلب ته عامل جي مقدار گهڻي ۽ پيداوار شين جي مقدار ٿوري ٿيندي. انهن کي موٽ کائيندڙ ردعمل سڏبو آهي.





(ii) Kc جي تمام گهڻي قيمت:

جن ردعمل جي Kc گهڻي هوندي آهي، اهي عملي طور پورا ٿيندا آهن. مطلب ته پيداوار شين جي مقدار گهڻي ٿيندي ۽ عاملن جي گهٽ. ان کي اڳيان وڌندڙ ردعمل سڏبو آهي.



(iii) Kc جي درمياني قيمت:

جن ردعملن جي Kc درمياني آهي اهي توازن ۾ هوندا آهن. عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار برابر هوندي آهي.



ڇا توهان کي خبر آهي؟ 

توازن وارو مستقل مخصوص ردعملن جي توازن لاءِ هوندو آهي جيئن ڪمزور تيزابيت ۽ ڪمزور اساسيت وارن لاءِ، پاڻي جي خود ٽوٽائڻ (Autoionization) لاءِ ۽ ٿوري مقدار ۾ ڳرندڙ لوڻ لاءِ وغيره.




آزمائشي سوال: 

717K گرمي پد تي هيٺ ڏنل ردعمل جي Kc جي 48 قيمت آهي.



هڪ مخصوص وقت لاءِ H_2 جي 0.2 mol/L، I_2 جي 0.2 mol/L ۽ HI جي 0.6 mol/L مقدار آهي.

ان ردعمل جي Qc معلوم ڪريو ۽ ردعمل جو طرف به معلوم ڪريو.


	(i)	Kc جي ٿوري قيمت ملاوت ۾ عاملن جي گهڻي مقدار ٻڌائي ٿي.	الف
	(ii)	Kc جي درمياني قيمت ملاوت ۾ عاملن ۽ پيداوار شين جي برابر مقدار ٻڌائي ٿي.	ب
	(iii)	Kc جي گهڻي قيمت ملاوت ۾ پيداوار شين جي وڌيڪ مقدار ٻڌائي ٿي.	ج

سماج، سائنس ۽ ٽيڪنالاجي

وايومنڊل نائٽروجن، آڪسيجن، ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ، ميٿين، نائٽرس آڪسائيڊ ۽ اوزون تي مشتمل آهي، پر نائٽروجن ۽ آڪسيجن وايومنڊل جا اهم جز آهن. اهي وايومنڊل جا 99% حصا آهن ۽ ڪيميائي پاڻ ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا، جيئن نائٽروجن امونيا جي تياري لاءِ استعمال ٿئي ٿي ۽ امونيا نائٽروجن واري پاڻ کي ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿيندي آهي. آڪسيجن سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ جي تياري ۾ استعمال ٿيندي آهي ۽ پوءِ انهيءَ سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ مان سلفيورڪ ائسڊ (گندرفي تيزاب) ٺاهيو ويندو آهي.

خلاصو

- اسان پنهنجي روزمره زندگي ۾ طبعي ۽ ڪيميائي تبديلين جو مشاهدو ڪندا آهيون. ٻه طرفي ڪيميائي ردعمل جو مشاهدو ڪجي ته اڳيان وڌندڙ ۽ موت کائيندڙ ردعمل توازن تي شرح جي لحاظ سان برابر هجن ٿا.
 - ڪيميائي توازن جو مشاهدو هميشه ٻه طرفو ردعملن ۾ ڪيو ويندو آهي. ٻه طرفي ردعمل ۾ عامل ۽ پيداوار شيون پاڻ ۾ تبديل ٿينديون رهنديون آهن. اهي ردعمل ڪڏهن به مڪمل ناهن ٿيندا. ٻه طرفا ردعمل اڳيان وڌي به سگهن ٿا ته موت به کائي سگهن ٿا.
 - ردعمل جي شروعات ۾ اڳيان وڌندڙ ردعمل جي رفتار، موت کائيندڙ جي رفتار کان وڌيڪ هجي ٿي، جيئن ئي متحرڪ توازن قائم ٿيندي آهي ته ٻنهي جي رفتار برابر ٿي ويندي آهي.
 - متحرڪ توازن صرف بند سرشتي ۾ مخصوص گرمي پد تي قائم ڪري سگهجي ٿو.
 - ماس ايڪشن جي قاعدي مطابق:
- ڪنهن به ڪيميائي ردعمل جي رفتار عامل شين جي مادي جي ضرب اُپت سان سڌي نسبت رکي ٿي.



توازن مساوات هن ريت لکبي:

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

جڏهن ته K_c توازن وارو مستقل آهي.

- K_c عامل ۽ پيداوار شين جي مولر مقدار جي وچ ۾ تعلق ڏيکاري ٿي. K_c جو ڪوبه مخصوص ايڪو ناهي ٿيندو، ڇو ته اها تناسب هوندي آهي. K_c عامل ۽ پيداوار شين جي شروعاتي ارتڪاز تي دارومدار نٿي رکي بلڪه گرمي پد تي رکي ٿي.
- K_c جي قيمت ردعمل جي وسعت ٻڌائي ٿي. مثال طور اها ٻڌائي ٿي ته ردعمل ڪيتري حد تائين وڃي مخصوص گرمي پد تي پيداوار شين ۾ اضافو ڪري ٿو. اها اسان کي ردعمل جو طرف پڻ ٻڌائي ٿي.
- ردعمل جي غير توازن واري حالت ۾ Q_c جي هن ريت وضاحت ڪبي ته اها پيداوار ۽ عامل شين جي مقدار جو ضرب اُپت جو تناسب آهي.



تصوراتي خاڪو





مشق

ڀاڱو (الف): صحيح جوابن جي چونڊ ڪريو.

1. متحرڪ توازن جي باري ۾ هيٺين مان ڪهڙو بيان غلط آهي:
 (الف) اهو بند سرشتي ۾ ٿئي ٿو
 (ب) عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار ۾ تبديلي نٿي اچي.
 (ج) اڳيان وڌندڙ ردعمل جي رفتار ۽ موت ڪائيندڙ ردعمل جي رفتار برابر آهي.
 (د) توازن کي ٻاهرئين دٻ سان بگاڙي نٿو سگهجي.
 2. هيٺين ردعمل کي تصور ڪيو ۽ ٻڌايو ته هيٺين مان ڪهڙو ان ردعمل جو بهترين اظهار آهي:

$$4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightleftharpoons 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$$

$$K_c = \frac{[\text{NO}]^4 [\text{H}_2\text{O}]^6}{[\text{NH}_3]^4 [\text{O}_2]^5} \quad (\text{الف})$$

$$K_c = \frac{[\text{NH}_3]^4 [\text{O}_2]^5}{[\text{NO}]^4 [\text{H}_2\text{O}]^6} \quad (\text{ب})$$

$$K_c = \frac{[\text{NH}_3][\text{O}_2]}{[\text{H}_2\text{O}][\text{NO}]} \quad (\text{ج})$$

$$K_c = \frac{[4\text{NO}][6\text{H}_2\text{O}]}{[4\text{NH}_3][5\text{O}_2]} \quad (\text{د})$$

3. ٻه طرفي ردعمل کي ڇا سان ڏيکاريو ويندو آهي.
 (الف) نڪتن واري ليڪ سان
 (ب) اڪيلي تير سان
 (ج) ٻيٽي تير سان
 (د) ٽيٽي ليڪن سان
 4. جڏهن K_c جي قيمت ٿوري هجي ته:
 (الف) ردعمل واري ملاوت ۾ گهڻا عامل آهن.
 (ب) ردعمل واري ملاوت ۾ گهڻيون پيداوار شيون آهن.
 (ج) ردعمل واري ملاوت ۾ تقريباً عامل ۽ پيداوار شيون برابر آهن.
 (د) ردعمل پورو ٿيندو.



5. ڪهڙي ردعمل لاءِ K_c جو يونٽ/ايڪو ٿيندو:



6. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ ردعمل لاءِ K_c جو ايڪو ٿيندو:



7. ردعمل جو توازن مستحڪم ٿيندو، جڏهن:



8. Q_c کي هن ريت بيان ڪري سگهجي ٿو:


(الف) عامل ۽ پيداوار شين جو تناسب

(ب) عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار جو تناسب

(ج) عامل جي حجم ۽ پيداوار شين جي مقدار جو تناسب

(د) عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار جو تناسب جيڪا سرن جو Exponent آهي.

9. ڪهڙو موت ڪائيندڙ ردعمل کي ظاهر ڪري ٿو.



(الف) (i) ۽ (ii) (ب) (ii) ۽ (iii) (ج) صرف (ii) (د) صرف (iii)




10. K_c جي قيمت وڌي هوندي آهي جڏهن:

(الف) [پيداوار] گهٽ آهي (ب) [پيداوار] گهڻي آهي

(ج) [عامل] نه گهٽ نه وڌ آهي (د) [عامل] گهڻي آهي

ڀاڱو (ب): مختصر سوال

1. ڪيميائي توازن جي مثال سان گڏ وصف لکو.
2. ڪيميائي توازن ڇو متحرڪ هجي ٿو؟
3. ٻه طرفو ۽ هڪ طرفو ردعمل کي مساوات ذريعي لکڻ ۾ ڪيئن فرق ڪري سگهجي ٿو.
4. توازن واري مساوات لکي ڏيکاريو جنهن ۾ ڪاربان (C) اڪيلو آڪسيجن (O₂) سان ردعمل ڪري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ٺاهي ٿو.
5. ٻه طرفي ردعمل جي خاصيت لکي ڏيکاريو.
6. ٻه طرفو ۽ هڪ طرفو ردعمل ۾ فرق ڏيکاريو.
7. ماس ايڪشن جي قانون کي بيان ڪريو. فعال ماسي (Active Mass) کي ڪيئن لکبو؟
8. K_c جي مدد سان ردعمل جو طرف ڪيئن معلوم ٿيندو آهي؟
9. هيٺين مساواتن لاءِ K_c جو اظهار لکي ڏيکاريو:



ڀاڱو (ج): تفصيلي سوال

1. متحرڪ توازن جي ٻن مثالن سان گڏ وضاحت ڪريو.
2. ماس ايڪشن وارو قانون ڇا آهي؟ K_c جي مساوات جي اظهار کي ماخذ ڪريو؟
3. K_c جي خاصيتن کي بيان ڪريو؟
4. Q_c ۽ K_c جي قيمتن کي استعمال ڪري (پيٽ ڪري) هيٺيون اڳڪٿيون ڪيئن ڪري سگهجن ٿيون:

(i) ردعمل اڳيان وڌندڙ آهي.

(ii) ردعمل موٽ کائيندڙ آهي.

5. اڳڪٿي ڪريو ته ڪهڙي سرشتي ۾ گهڻي مقدار ۾ عامل هوندا ۽ ڪهڙي ۾ گهڻي مقدار ۾ پيداوار شيون:






ڀاڱو (د): حسابي سوال

1. N_2O_4 موت کائيندڙ ردعمل ۾ ٿئي ڪري NO_2 ٺاهي ٿي. ان ردعمل جي K_c جي اظهار کي ماخذ (Drive) ڪريو. K_c جي ايڪي جو پڻ ٻه طرفي ردعمل مان معلوم ڪريو.

2. بند ڪنٽينر ۾ 500 K تي PCl_5 ، PCl_3 ۽ Cl_2 توازن تي آهن ۽ انهن جي ارتڪاز $0.8 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ، $1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ۽ $1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ آهي. ايڪي يونٽ سان K_c جي قيمت معلوم ڪريو.

3. هيٺ ڏنل ردعمل جي K_c جي 1×10^{-4} قيمت آهي:



مليل درجہ حرارت تي عامل ۽ پيداوار شين جي مقدار آهي $2 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3} = HI$ ، $1 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3} = I_2$ ۽ $1 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3} = H_2$ ردعمل جي طرف جي اڳڪٿي ڪريو.



تيزاب، اساس ۽ لوڻ

باب 2

وقت جي ورهاست

تدريسي پيريد = 14
تشخيصي پيريد = 02
سليبس ۾ حصو = 15%

اهم تصورات:

تيزاب ۽ اساس جو تصور	2.1
pH ۽ pOH جو تصور	2.2
لوڻ	2.3

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (Student Learning Outcomes)

هن باب سکڻ کان پوءِ شاگرد:

- آرھينيس تيزاب ۽ اساس (Base) کي مثال ڏئي بيان ڪندا.
- برانسٽڊ لووري نظريي کي استعمال ڪري مادن جي تيزاب ۽ اساس ۾ درجہ بندي ڪري سگھندا.
- شين جي ليوس تيزاب ۽ اساس طور درجہ بندي ڪري سگھندا.
- پاڻي جي ٽوٽائڻ (Ionization) واري مساوات لکي سگھندا.
- H^+ ۽ OH^- جي بنياد تي ڳارن جي تيزابي، اساسي ۽ معتدل/بي عمل (Netural) طور درجہ بندي ڪري سگھندا.
- معتدل ردعمل کي متوازن ڪري سگھندا.
- بفر کي مثالن سان بيان ڪري سگھندا.



تعارف


اسان پنهنجي روزاني زندگيءَ ۾ وڏي تعداد ۾ مختلف شيون استعمال ڪندا آهيون جيئن عام لوڻ، کنڊ، سرڪو، ليمو ۽ گدامري وغيره. ڇا انهن سڀني شين جو ذائقو ساڳيو آهي؟ انهن مان ڪجهه شين جو کٽو ذائقو هوندو آهي، جڏهن ته ڪجهه جو ڪڙو، مٺو يا ڪارو ذائقو هوندو آهي. مثال طور ڏهي، سرڪو، ليمو ۽ نارنگي جي رس جو ذائقو کٽو ٿيندو آهي، اهي تيزابي (Acidic) آهن. ڪريلو، ڪافي ۽ چاڪليٽ جو ڪڙو ذائقو هوندو آهي، اهي اساسي (Basic) آهن، پر عام لوڻ ۽ ڦٽڪي جو ذائقو ڪارو ٿيندو آهي، اهي لوڻ (Salts) سڏبا آهن. تيزاب هوميوپيٿڪ ۽ ايلوپيٿڪ دوائن، شربت (Syrup) ۽ گورين جي پيداوار ۾ ڪافي فائديمند هوندا آهن. ان کان علاوه بيٽريون، رنگ، پيپر، پاڻ ۽ صابن ۾ پڻ تيزاب جو استعمال ٿئي ٿو.

اسان جي معدي ۾ ڪاڏي کي ٽوڙڻ/ ڳاڙڻ لاءِ لوڻ جو تيزاب (HCl) موجود آهي. اساس (Bases) مختلف حالتن ۾ فائديمند هوندا آهن. مثال طور صابن ۽ ڪاغذ جي صنعتن ۾، سوڊيم هائيڊرو آڪسائيڊ (NaOH) استعمال ڪيو ويندو آهي. سيمينٽ ۽ پلاسٽر آف پيرس ٻئي ڪيلشيم هائيڊرو آڪسائيڊ (Ca(OH)_2) مان ٺهيل هوندا آهن. امونيا پاڻ جي پيداوار ۾ استعمال ٿيندي آهي، جهڙوڪ امونيم نائٽريٽ، سلور برومائيد کي فوٽوگرافي ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي ۽ ڪيلشيم ڪلورائيڊ کي سڪائڻ واري ايجنٽ (Drying agent) طور استعمال ڪيو ويندو آهي.

2.1 تيزاب ۽ اساس جا تصور

2.1.1 تيزاب ۽ اساس وارو آرهينيس (Arrhenius) نظريو (1880ع)

Svante Arrhenius تيزاب ۽ اساس سان لاڳاپيل هڪ نظريو پيش ڪيو. هن نظريي موجب تيزاب اهي مادا آهن جيڪي پاڻيءَ ۾ حل ٿي هائيڊروجن (H^+) ٿا ٺاهن ٿا. مثال طور HCl ، HNO_3 ، CH_3COOH ۽ HCN ۽ اساس اهي مادا آهن جيڪي پاڻيءَ ۾ هائيڊرو آڪسائيڊ ٿا ٺاهن ٿا. مثال طور NaOH ، KOH ، NH_4OH ۽ Ca(OH)_2 .



شکل 2.1 تيزاب ۽ اساس جا هائيڊروجن ۽ هائيڊروآڪسائيڊ ٿا



ايسڊ جون خاصيتون هائيڊروجن آئنز (H^+) جي موجودگيءَ سبب آهن.



اساس جون خاصيتون هائيڊرو آڪسائيڊ آئنز (OH^-) جي موجودگيءَ جي ڪري آهن.



لوڻ هڪ ٿوٺائي (Ionic) مرڪب آهي جيڪو ايسڊ ۽ اساس جي ردعمل مان ٺهندو آهي.



پاڻي + لوڻ اساس + تيزاب


آرھينيس نظريي جون خاميون (Limitation of Arrhenius Theory)

- پاڻي جي محلول ۾ هائيڊروجن آئنز اڪيلا آزاد نه هوندا آهن بلڪه اهي پاڻي سان ردعمل ڪري Hydronium آئن (H_3O^+) ٺاهيندا آهن.
- اهو نظريو امونيا (NH_3) جي اساسيت ۽ ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2) جي تيزابيت ۽ ٻين ملندڙ جلندڙ مرڪبن جي اساسيت ۽ تيزابيت کي بيان نٿو ڪري.
- اهو صرف آبي حل (Aqueous solution) ۾ لاڳو ٿئي ٿو.

2.1.2 برانستڊ لووري وارو تيزاب ۽ اساس جو نظريو


(Bronsted-lowery theory of acids and basis)

1923ع ۾ هڪ ڊنمارڪ ڪيمسٽ برانستڊ ۽ هڪ انگلش ڪيمسٽ لووري تيزاب ۽ اساس جون نيون وصفون تجويز ڪيون. هن نظريي موجب ڪوبه مادو جيڪو پروٽان (H^+) عطيو ڪري ان کي ايسڊ چئجي ٿو ۽ ڪوبه مادو جيڪو پروٽان کي قبول ڪري ٿو ان کي اساس چئجي ٿو، تنهنڪري ايسڊ پروٽون ڏيندڙ آهن ۽ اساس پروٽون قبول ڪندڙ آهن. هيءَ ٻئي پاڻي جي محلول ۾ هائيڊرونيئم (H_3O^+) آئن ٺاهيندا آهن. اچو ته پاڻي ۾ هائيڊروجن ڪلورائيڊ جي حل ٿيڻ تي غور ڪريون. هن عمل ۾ (HCl) پنهنجي هڪ پروٽان کي پاڻي (H_2O) ۾ آزاد ڪري ٿو ۽ پاڻي جو سالمو اهو پروٽان قبول ڪري (H_3O^+) ۾ تبديل ٿئي ٿو.




اهڙيءَ طرح HCl هڪ برانستڊ تيزاب ۽ H_2O جو سالمو برانستڊ اساس آهي. جڏهن ته H_3O^+ هڪ Conjugated تيزاب (جيڪو پروٽون ڏئي سگهي) ۽ Cl^- وري Conjugated اساس آهي (جيڪو پروٽون وٺي سگهي ٿو).

اچو ته هڪ ٻئي هيٺ ڏنل ردعمل تي غور ڪريون.



ڪانجوگيٽ تيزاب + ڪانجوگيٽ اساس اساس + تيزاب



$\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^{-}_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{aq})}$

تیزاب اساس کانجوگیت کانجوگیت
اساس تیزاب

Conjugated acid-base pair


Acid		Base		Conjugated acid		Conjugated base
HCl	+	H ₂ O	$\rightleftharpoons$	H ₃ O ⁺	+	Cl ⁻
H ₂ SO ₄	+	H ₂ O	$\rightleftharpoons$	H ₃ O ⁺	+	HSO ₄ ⁻
HSO ₄ ⁻	+	H ₂ O	$\rightleftharpoons$	H ₃ O ⁺	+	SO ₄ ²⁻
CH ₃ COOH	+	H ₂ O	$\rightleftharpoons$	H ₃ O ⁺	+	CH ₃ COO ⁻
NH ₄ ⁺	+	H ₂ O	$\rightleftharpoons$	H ₃ O ⁺	+	NH ₃
H ₂ O	+	CN ⁻	$\rightleftharpoons$	HCN	+	OH ⁻
HCl	+	NH ₃	$\rightleftharpoons$	NH ₄ ⁺	+	Cl ⁻

برانستد لووری نظریی جون خامیون (Limitation of Bronsted-lowery concept)

- اهو نظريو ڪجهه مرڪبن جي تيزابيت جي وضاحت نٿو ڪري سگهي جن ۾ پروٽان ڏيڻ جو ڪوبه رجحان ناهي هوندو. مثال CO_2 , SO_3 .
- اهو نظريو ڪجهه مرڪبن جي اساسيت جي نوعيت جي وضاحت نٿو ڪري جن ۾ پروٽون قبولڻ جو رجحان ناهي هوندو. مثال طور NaOH , Ca(OH)_2 ۽ KOH .

گلبرٽ جي. اين. ليوس 1923ع ۾ تيزاب ۽ اساس جي نئين وصفن کي پيش ڪيو. هن نظريي مطابق تيزاب اهو مادو آهي جيڪو هڪ اليڪٽراني جوڙو قبول ڪرڻ جي صلاحيت رکندو آهي ۽ اساس اهو مادو آهي جيڪو هڪ اليڪٽراني جوڙو عطيو (Donate) ڪرڻ جي صلاحيت رکندو آهي. اهڙيءَ طرح ليوس تيزاب هڪ اليڪٽراني جوڙو قبول ڪندڙ ۽ ليوس اساس هڪ اليڪٽراني جوڙو ڏيندڙ آهي.

پروٽان (H^+) اليڪٽرانن جي هڪ جوڙي کي قبول ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿو، جڏهن ته H_2O ڪوآرڊينيت ڪوولنٽ بانڊ ٺاهڻ لاءِ اليڪٽرانن جو هڪ جوڙو عطيو ڪرڻ جي صلاحيت رکندو آهي. تنهنڪري، ليوس تصور جي مطابق H^+ هڪ ليوس تيزاب آهي ۽ H_2O جو ماليڪيول هڪ اساس آهي.



هن ردعمل ۾ NH_3 اليڪٽرانن جوڙو ڏيندڙ ۽ BF_3 اليڪٽرانن جوڙو وٺندڙ آهي، تنهنڪري ليوس نظريي مطابق NH_3 اساس آهي ۽ BF_3 تيزاب آهي.

ليوس تيزاب اساس واري نظريي جون خاميون (Limitation of Lewis acid-base)


- اهو نظريو ڪوويلنٽ بانڊ جي ٺهڻ دوران توانائي جي نڪرڻ جي وضاحت نه ٿو ڪري.
- اهو نظريو ماليڪيولز جي شڪل جي وضاحت نه ٿو ڪري.
- اهو ماليڪيول جي ايٽمن جي وچ ۾ ڪششي قوتن جي فطرت جي وضاحت نه ٿو ڪري.

جدول 2.2 ايسڊ اساس جي نظرين جو خلاصو

ليوس نظريو	برانسٽيڊ لووري نظريو	آرهينيئس نظريو
ايسڊ اليڪٽران قبوليندڙ ۽ اساس اليڪٽران ڏيندڙ آهن.	ايسڊ پروٽان H^+ ڏيندڙ آهي ۽ اساس پروٽان قبوليندڙ آهي	ايسڊ آهي مادو آھن جن ۾ (H^+) ائٽم هوندو آهي ۽ اساس ۾ OH^-
مثال طور NH_3 ۽ BF_3	مثال طور NH_3 ۽ H_2O	مثال طور HCl ۽ $NaOH$

تعديلي عمل (Neutralization reaction) جو توازن

جيئن ته اسان ڄاڻون ٿا ته تعديل ردعمل ۾ ايسڊ ۽ اساس ردعمل ڪن ٿا جنهن جي نتيجي طور لوڻ ۽ پاڻي جو سالمو ٺهندو آهي. تعديل ردعمل کي هڪ متوازن ڪيميائي مساوات جي ذريعي ڏيکاري سگهجي ٿو جنهن ۾ عامل ۽ پيداوار شين ٻنهي طرف ايٽمن جي برابر تعداد سان گڏوگڏ واڌو ۽ ڪاٽو بار (Positive & Negative charges) به متوازن هونديون آهن. تعديل ردعمل ۾ تيزاب ۽ اساس مان H^+ ۽ OH^- آئنز نڪري ڪري پاڻ ۾ ملي پاڻي جو سالمو ٺاهيندا آهن. مثال طور، سوڊيم هائيڊروآڪسائيڊ ۽ هائيڊرو ڪلورڪ ايسڊ جي بي تاثير ٿيڻ جي ڪيميائي مساوات هن ريت آهي.



$NaOH$ ۽ HCl هڪ ٻئي کي 1:1 جي تناسب ۾ بي تاثير ڪري رهيا آهن، ڇاڪاڻ ته $NaOH$ ڳار ۾ هڪ مول OH^- جو چڱي ٿو ۽ HCl به هڪ مول H^+ جو ڏيندو آهي.



1. آرھینیس نظریو صرف آبی ڳارن تي ڇو لاڳو ٿئي ٿو؟
2. ھینین ردعملن جا ڪنجو گیتید تیزاب ۽ ڪنجو گیتید اساس ڪهڙا ٿیندا؟
(i) $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O}$ (ii) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (iii) $\text{NH}_4 + \text{H}_2\text{O}$

پانی جي ٽوٽائي (Water Ionization):

پاڻي هڪ معتدل ڀتڙو آهي جنهن ۾ هائيڊروجن (H^+) ۽ هائيڊروآڪسائيڊ (OH^-) آئنز جي برابر تعداد هوندي آهي، تنهنڪري خالص پاڻي کي هڪ ڪمزور اليڪٽرولائٽ (برق پاش) سمجهيو ويندو آهي، اهو هيٺين ردعمل جي مطابق آئنائيز ٿئي ٿو.



پاڻيءَ جي توازن واري مستقل (K_c) کي هن ريت ڏيکاري سگهجي ٿو:

$$K_c = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]}$$

چورس ڏنگي [] مادن جي مولر مقدار (Concentration) جي نمائندگي ڪري ٿي جنهن جو ايڪو mol dm^{-3} آهي، جيئن ته اسان ڄاڻون ٿا ته پاڻي جي آئونائيزيشن تمام ٿوري ٿيندي آهي، تنهنڪري ارتڪاز ۾ تبديلي تقريباً نه هجڻ برابر آهي ۽ اها مستقل سمجهي ويندي آهي.

$$K_c [\text{H}_2\text{O}] = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$K_c [\text{H}_2\text{O}] = K_w$$

$$K_w = [H^+][OH^-]$$

جتي K_w پاڻيءَ جي آئنز جي ضرب اُپت جو مستقل آهي ۽ ان جي قيمت $1 \times 10^{-14} (\text{mol dm}^{-3})^2$ آهي.

:pOH & pH

pH جو تصور پهريون ڀيرو 1909ع ۾ کارلسبرگ ليبارٽري ۾ ڊئمارڪ جي ڪيمسٽ سورن پيڊر لورٽز سورنسن متعارف ڪرايو هو. ”pH“ جو مخفف ”Potential Hydrogen“ آهي ۽ اهو هڪ اسڪيل آهي جيڪو ڪنهن پٽڙو/ ڳار جي نسبتي تيزابيت يا اساسيت کي معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

pH: حل / گار ۾ هائيڊروجن آئنز $[H^+]$ جي مقدار جي ماپ کي pH چيو وڃي ٿو. ان کان علاوه pH کي ”هائيڊروجن آئن جي مقدار جو ڪاٿو لاگارٿم“ پڻ سڏيو ويندو آهي.

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

pOH: حل / ڳار ۾ $[OH^-]$ آئنز جي مقدار جي ماپ کي pOH چيو وڃي ٿو. ان کان علاوه ان کي "هائيڊرو آڪسيل آئن مقدار جو کاتو لاڳا ٿرڻ" جي طور تي پڻ بيان ڪري

$$\text{pH} = -\log [\text{OH}^-]$$

pH پیمانو: پی ایچ پیمانو ٻڌائيندو آهي ته ڪا شئي ڪيتري تيزابي يا اساسي آهي. اها شيءِ

جنهن جي pH=7 هجي اها تعديل يعني نه تيزابي ۽ نه اساسي آهي. pH واري پيماني تي 0 (سڀ کان وڌيڪ تيزابي) کان 14 (سڀ کان وڌيڪ اساسي) تائين قيمتون / انگ اکر آهن. مختلف ڳارن جي pH کي پيپر ۽ pH پڌرو ڪندڙ (Indicator) ميٽر ذريعي ماپي سگهجي ٿو.

جدول 2.3 $[H^+]$, $[OH^-]$ ۽ ڳار جي pH ۾ تعلق

	$[H^+]$ (mol dm ⁻³)	$[OH^-]$ (mol dm ⁻³)	pH	آبي حل (Aqueous system)
	1×10^0	1×10^{-14}	0.0	1M HCl (0.0)
	1×10^{-1}	1×10^{-13}	1.0	0.1M HCl (1.0)
	1×10^{-2}	1×10^{-12}	2.0	Gastric juice (1.6–1.8)
	1×10^{-3}	1×10^{-11}	3.0	Lemon juice (2.3), vinegar (2.4–3.4)
	1×10^{-4}	1×10^{-10}	4.0	Soda water (3.8), tomato juice (4.2)
	1×10^{-5}	1×10^{-9}	5.0	Black coffee (5.0)
	1×10^{-6}	1×10^{-8}	6.0	Milk (6.3–6.6), urine (5.5–7.0)
	1×10^{-7}	1×10^{-7}	7.0	Pure water (7.0), saliva (6.2–7.4)
	1×10^{-8}	1×10^{-6}	8.0	Blood (7.35–7.45), bile (7.8–8.6)
	1×10^{-9}	1×10^{-5}	9.0	Sodium bicarbonate (8.4), sea water (8.4)
	1×10^{-10}	1×10^{-4}	10.0	Milk of magnesia (10.5)
	1×10^{-11}	1×10^{-3}	11.0	Household ammonia (11.5)
	1×10^{-12}	1×10^{-2}	12.0	Washing soda (12.0)
	1×10^{-13}	1×10^{-1}	13.0	0.1M NaOH (13.0)
	1×10^{-14}	1×10^0	14.0	1M NaOH (14.0)

مثال 2: KOH جي $2.46 \times 10^{-9}M$ ڳار جي pH، pOH، $[H^+]$ ۽ $[OH^-]$ معلوم ڪريو.

حل:

$$KOH \longrightarrow K^+ + OH^-$$

$$[OH^-] = 2.46 \times 10^{-9}M$$

$$[H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$[H^+] = \frac{1 \times 10^{-14}}{2.46 \times 10^{-9}}$$

$$[H^+] = 4.07 \times 10^{-6} \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$= -\log [4.07 \times 10^{-6}]$$

$$pH = 5.39$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pOH = 14 - pH$$

$$= 14 - 5.39$$

$$pOH = 8.61$$

مثال 1: HCl جي ڳار جي pH 2.3 آهي، ان جي pOH ۽ $[H^+]$ جو حساب لڳايو.

حل:

$$pH + pOH = 14$$

$$pOH = 14 - pH$$

$$= 14 - 2.3$$


$$pOH = 11.7$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$10^{-pH} = [H^+]$$

$$10^{-2.3} = [H^+]$$

$$5 \times 10^{-3}, \text{mol.dm}^{-3} = [H^+]$$



شڪل 2.2 pH وارو پيمانو

آزمائشي سوال



- خالص پاڻي کي ڪمزور برق پاش ڇو سمجهيو وڃي ٿو؟
- هينين شين جي pH قيمت ڪيتري آهي؟
ليمي جو رس، سودا پاڻي، ڪاري ڪافي، ڪير، ڌوڻڻ جي سوڍا.



2.3 لوڻ


لوڻ هڪ آئونڪ مرڪب آهي جنهن ۾ ڪٽو (Cation) ۽ ڪاٽو (Anion) موجود هوندا آهن.

لوڻ سمند جي پاڻيءَ ۾ وڏي مقدار ۾ موجود آهي. لوڻ جانورن جي زندگيءَ لاءِ اهم آهي ۽ لوڻ انسان جي بنيادي ذائقن مان هڪ آهي. لوڻ هڪ آئونڪ مرڪب آهي جنهن ۾ H^+ کان سواءِ ڪيٽ آئن ۽ OH^- کان سواءِ اين آئن هوندا آهن. لوڻ تيزاب ۽ اساس جي وچ ۾ تعديل واري ردعمل جي نتيجي ۾ پاڻي سان گڏ حاصل ڪيو ويندو آهي.




2.3.1 لوڻ جي تياري

1. ڌاتو يا ڌاتو جي مرڪبن (ڌاتي آڪسائيڊس، ڌاتي هائيڊرو آڪسائيڊ، ڌاتي ڪاربونيٽ ۽ ڌاتي باءِ ڪاربونيٽ) جو تيزاب سان تعامل ڪرڻ لوڻ کي ٺاهي ٿو.



2. هڪ اساس جو تيزاب سان يا هڪ ڌات جو اساس سان تعامل ڪرڻ به لوڻ کي



2.3.2 لوڻ جا قسم (Types of Salts)

(i) تيزابي لوڻ (Acidic Salt): اهي لوڻ جيڪي پاڻي ۾ حل ٿي تيزابي / ڳار ٺاهن تن کي ايسڊڪ لوڻ سڏيو ويندو آهي. انهن ڳارن جي pH قيمت 7 کان گهٽ ٿيندي آهي. مثال طور NaH_2PO_4 , NaHSO_4 , $\text{Ca(NO}_3)_2$, NH_4Cl وغيره.

(ii) اساسي لوڻ (Basic Salt): اهي لوڻ جيڪي پاڻي ۾ حل ٿي اساسي ڳار ٺاهن تن کي اساسي لوڻ سڏيو ويندو آهي. انهن ڳارن جي pH قيمت 7 کان وڌيڪ ٿيندي آهي. مثال طور K_2CO_3 , Na_2CO_3 , KCN , CH_3COONa وغيره.



(iii) **تعديلي لوڻ (Neutral Salt):** اهي لوڻ جيڪي پاڻي ۾ حل ٿي بي عمل (Neutral) ڳار ٺاهن تن کي **تعديلي لوڻ** سڏيو ويندو آهي. انهن ڳارن جي pH قيمت 7 ٿيندي آهي. مثال طور NaCl , KCl , K_2SO_4 , NaNO_3 , KClO_3 , KClO_4 وغيره.

2.3.3 لوڻ جا استعمال (Uses of some Salts)

1. لوڻ اسان جي روزاني زندگي ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. هيٺ ڏنل ڪجهه مثال آهن:
 1. هارين پاران زراعت ۾ استعمال ٿيندڙ ڪيميائي پاڻن مان اڪثر ڪيميائي طور تي لوڻ هوندا آهن. مثال طور: امونيم ڪلورائيڊ، امونيم نائٽريٽ، امونيم فاسفيٽ، پوٽاشيم ڪلورائيڊ ۽ نائٽروجن، فاسفورس ۽ پوٽاشيم (NPK) پاڻ.
 2. لوڻ فصلن جي جيت مار دوا (Pesticide) ۾ پڻ استعمال ڪيا ويندا آهن. مثال طور: آئرن (II) سلفيٽ، مرڪيورڪ ڪلورائيڊ.
 3. طبي ميدان ۾ آبيده چيرولي ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) پلاسٽر آف پيرس ۾ موجود هوندو آهي. اهو تتل هڏن کي سهارو ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
 4. رت جي گهٽتائي ۾ مبتلا مريض آئرن II سلفيٽ هيپٽاهائيڊريٽ ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) کي استعمال ڪن ٿا.
 5. سوڊيم هائيڊروجن ڪاربونيٽ اينٽي ايسڊز جو جزو آهي. هي لوڻ معدي مان نڪرندڙ ايسڊ کي بي اثر ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو.
 6. بيريم سلفيٽ بيريم جي ماني ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. اها ماني انهن مريضن کي ڪارائي ويندي آهي جن کي پنهنجي پيٽ جو ايڪسري وٺڻو پوندو آهي. اهو لوڻ اندروني نرم عضون کي جهڙوڪ آڏن کي X-ray فلمن تي ظاهر ٿيڻ ۾ مدد ڪري ٿو.
 7. پوٽاشيم منگنيٽ (VII) بيڪٽيريا کي ماري سگهي ٿو ۽ ان ڪري اهو جراثيم ڪش دوا ۾ استعمال لاءِ مناسب آهي.

2.3.4 بفر جو تصور (Concept of Buffer)

بفر (Buffer) سان لاڳاپيل ٻه اهم اصطلاح آهن. بفر هڪ آبي حل آهي جنهن جي انتهائي مستحڪم pH هوندي آهي. بفرنگ ايڇنٽ هڪ ڪمزور تيزاب ۽ ان جو ڪانجو گيٽڊ اساس يا ڪمزور اساس ۽ ان جو ڪانجو گيٽڊ تيزاب وارو مادو آهي جيڪو ڳار جي pH کي برقرار رکي ٿو. جيڪڏهن توهان بفر ٿيل حل ۾ هڪ تيزاب يا اساس شامل ڪيو، ان جي pH خاص طور تي تبديل نه ٿيندي. اهڙي طرح بفر ۾ پاڻي شامل ڪرڻ يا پاڻي جي تبخير سان بفر جي pH تبديل نه ٿيندي آهي.

”تنهنڪري بفر هڪ حل / ڳار آهي جيڪو تيزابي يا اساسي جزن جي اضافي تي pH جي تبديلي کي روڪي ٿو. اهو شامل ڪيل ايسڊ يا اساس جي ننڍڙي مقدار کي بي عمل ڪرڻ جي قابل آهي، اهڙيءَ طرح حل جي pH کي نسبتاً مستحڪم رکي ٿو.“

- بفر جي pH آئوونڪ طاقت کان بي اثر هوندي آهي.
- بفر جي pH جو دارومدار درج حرارت (Temperature) تي هوندو آهي.



آزمائشي سوال



1. هيٺين مان ڪهڙا لوڻ آهن؟

HCl, NaCl, NaOH, KOH, K₂SO₄, KNO₃, HNO₃, BaCl₂

2. لوڻ جي قسمن جي فهرست ٺاهيو؟

ڇا توهان کي خبر آهي؟



سماج، ٽيڪنالاجي ۽ سائنس

pH تي منحصر ڪاڌو


اسان جيڪو ڪاڌو کائيندا آهيون ان کي تيزابي اساسي يا تعديلي سمجهيو ويندو آهي، جهڙوڪ گوشت، مڇي، کير جون شيون، بيضا ۽ اناج ايسڊڪ هوندا آهن. ڪجهه پاجيون، نشاستو ۽ کنڊ قدرتي تعديلي آهن جڏهن ته ڪجهه ميوا ۽ پاجيون قدرتي اساسي آهن. ايسڊڪ ڪاڌي جي pH 0 کان 7 هوندي آهي، جڏهن ته تعديلي ڪاڌي جي pH 7 هوندي آهي. اساسي ڪاڌي جي pH 7 کان 14 تائين هوندي آهي. هڪ صحتمند انساني جسم کي رت جي pH 7.4 (ٿوري اساسي) تائين برقرار رکڻ لازمي هوندي آهي.

ايسڊڪ/تيزابي برسات جا نقصانڪار اثر

اها ٻنهي جانورن ۽ انسانن جي ساهه کڻڻ جي سرشتي کي متاثر ڪري ٿي. تيزابي بارش آبي ماحوليات (درياءُ تلاءُ وغيره) تي اثر انداز ٿئي ٿي. اها پاڻي جي ڪيميائي ساخت کي تبديل ڪندي پاڻي جي آلودگي پيدا ڪري ٿي، جيڪا پاڻي جي ماحولياتي نظام جي وجود کي نقصان پهچائي ٿي. تيزابي مينهن پاڻي جي پائپ لائنن کي خراب ڪرڻ جو سبب پڻ بڻجندي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ گرا ڌاتو جهڙوڪ آئرن، ليڊ ۽ ٽن پيئڻ جي پاڻي ۾ داخل ٿي ويندا آهن. اهو پٿر، ڌاتو جي اڏاوتن ۽ يادگارن کي پڻ نقصان پهچائي ٿو.



ٽيڙاب ۽ اساس جو تصوراتي خاڪو





خلاصو

- ايسڊ ڌائقي ۾ ڪٿا هوندا آهن، آبي محلول ۾ H^+ آئن ڏين ٿا ۽ نيري لٽمس پيپر جو رنگ ڳاڙهي ۾ تبديل ڪن ٿا.
- اساس ڌائقي ۾ ڪٿا آهن، آبي محلول ۾ OH^- آئن ڏين ٿا ۽ ڳاڙهي لٽمس پيپر جي رنگ کي نيري ۾ تبديل ڪن ٿا.
- آرهينيس نظريي موجب ايسڊ آبي محلول ۾ H^+ ۽ اساس OH^- آئن ڏئي ٿو.
- برانسٽڊ لووري نظريي موجب اساس پروٽون ڏيندڙ آهن ۽ اساس پروٽون قبول ڪندڙ آهن.
- ڪانجوگيٽ ايسڊ هڪ اساس طرفان پروٽون جي قبوليت جي نتيجي ۾ ٺهندو آهي.
- ڪانجوگيٽ اساس هڪ ايسڊ طرفان پروٽون ڏيڻ جي نتيجي ۾ ٺهندو آهي.
- ليوس ايسڊ هڪ مادو آهي جيڪو اليڪٽران جي هڪ جوڙي کي قبول ڪري سگهي ٿو.
- ليوس بيس هڪ مادو آهي جيڪو اليڪٽران جو هڪ جوڙو ڪوآرڊينيت ڪولنٽ بانڊ ٺاهڻ لاءِ عطيو ڪري سگهي ٿو.
- پاڻي فطرت ۾ ٻه عملو (amphoteric) آهي، اهو هڪ ايسڊ ۽ اساس طور ڪم ڪري ٿو.
- پاڻيءَ جي آئونائيزيشن مستقل کي پاڻي جو آئن پراڊڪٽ ڪانسٽنٽ به سڏيو ويندو آهي. ان جي قيمت $25^\circ C$ تي 1×10^{-14} آهي.
- خالص پاڻي ۾ $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ آهي، ڇو ته پاڻي بي تاثير آهي ۽ ان جي $pH = 7$ آهي.
- ايسڊ جي pH 7 کان گهٽ هوندي آهي.
- اساس جي pH 7 کان وڌيڪ ٿيندي آهي.
- حل/ڳار جي pH ڪيترن ئي طريقن سان ماپي سگهجي ٿي مثال طور لٽمس پيپر، يونيورسل انڊيڪيٽر پيپر، انڊيڪيٽر ۽ پي ايچ ميٽر استعمال ڪندي.
- انڊيڪيٽر ڪمزور نامياتي ايسڊ يا اساس آهن جيڪي pH جي ننڍڙي تبديلي تي پنهنجي رنگ کي تبديل ڪن ٿا.
- لوڻ ايسڊ ۽ اساس جي ردعمل جي پيداوار آهي ان ۾ $anion$ ۽ $cation$ هوندا آهن.
- ايسڊ ۽ اساس جي تعديلي ردعمل جي نتيجي ۾ لوڻ ۽ پاڻي ٺهي ٿو.
- بفر محلول هڪڙو حل آهي جيڪو حل جي pH ۾ تبديلي جي مزاحمت ڪري ٿو جڏهن گهٽ مقدار ۾ ايسڊ يا اساس حل ۾ ملايو وڃي.



مشق

ڀاڱو (الف): گهڻا چونڊ سوال

درست جواب تي دائرو لڳايو.

1. چمڙي تي جلڻ جو اثر _____ جو سبب آهي:
(الف) تيزاب (ب) اساس (ج) لوڻ (د) الف ۽ ب
2. _____ کي محفوظ ڪرڻ لاءِ Preservatives استعمال ڪيا ويا آهن:
(الف) اساس (ب) ايسڊ (ج) ڪاڌو (د) پاڻي
3. هيٺين مان ڪهڙو هڪڙو آرهينيس تيزاب نه آهي:
(الف) HCl (ب) CO₂ (ج) HNO₃ (د) H₂SO₄
4. NH₃ اساس ٿي سگهي ٿو:
(الف) آرهينيس نظريي مطابق (ب) برانسٽڊ نظريي مطابق
(ج) ليوس نظريي مطابق (د) ٻئي ب ۽ ج مطابق
5. هيٺين مان هڪڙو ليوس اساس آهي؟
(الف) HNO₃ (ب) CN⁻ (ج) HCl (د) AlCl₃
6. _____ اليڪٽران جو هڪ جوڙو عطيو ڪري سگهي ٿو ڪوآرڊينيت ڪوولنٽ بانڊ ٺاهڻ لاءِ:
(الف) ليوس تيزاب (ب) ليوس اساس
(ج) برانسٽڊ لوري تيزاب (د) برانسٽڊ لوري اساس
7. جيڪڏهن pH جي قيمت 7 کان وڌيڪ آهي، پوءِ حل آهي:
(الف) تيزابي (ب) اساسي (ج) تعديلي (د) ايمفوٽيرڪ
8. هيٺين مان لوڻ آهي:
(الف) HCl (ب) KCl (ج) HNO₃ (د) H₂SO₄
9. اهي شيون جيڪي تيزاب ۽ اساس ٻنهي سان ردعمل ڪن ٿيون، تن کي چئبو آهي:
(الف) ڪانجوگيٽ تيزاب (ب) ڪانجوگيٽ اساس
(ج) ٻه عملو (د) بفرز
10. لوڻ ۽ پاڻي ٺهڻ لاءِ ايسڊ ۽ اساس جي ردعمل کي چئبو آهي:
(الف) آبيدگي (ب) تعديلي ردعمل
(ج) هائيڊرولائيسز (د) ٻئي الف ۽ ب



ڀاڱو (ب): مختصر سوال

1. تيزاب ۽ اساس جون خاصيتون بيان ڪريو.
2. آرهينيس جي تيزاب ۽ اساس واري نظريي کي مثال ڏئي سمجهايو.
3. برانستڊ لووري جي تيزاب ۽ اساس وارو نظريو ڇا ٿو چوي؟
4. ڪانجوگيٽ تيزاب ۽ اساس جوڙا ڇا آهن؟ مثال ڏئي وضاحت ڪريو.
5. هيٺين ڳارن جي تيزابي، اساسي ۽ تبديلي طور درج بندي ڪريو.
 - (الف) ڳار جنهن جي $[H^+] = 1 \times 10^{-4}$ آهي.
 - (ب) ڳار جنهن جي $[H^+] = 1 \times 10^{-11}$ آهي.
 - (ج) ڳار جنهن جي $[OH^-] = 1 \times 10^{-9}$ آهي.
 - (د) ڳار جنهن جي $[OH^-] = 1 \times 10^{-3}$ آهي.
6. پاڻي جي سالملي جي آئونائيزيشن واري مساوات لکو.
7. هيٺين جي وصف لکو:
 - (الف) pH
 - (ب) انڊيڪيٽر
 - (ج) بي تاثير ردعمل
8. بفر ڇا آهن؟ انهن جي جوڙجڪ ٻڌايو ۽ روزمره زندگي ۾ بفر جي اهميت پڻ ٻڌايو.

ڀاڱو (ج): تفصيلي سوال

1. لوڻ ڇا آهي؟ ان جي تياري ۽ ان جي قسمن کي بيان ڪريو.
2. تفصيل سان ٻڌايو ته پاڻي جي آئونائيزيشن سان ڳار جي pH جو ڪهڙو تعلق آهي.
3. تفصيل سان بحث ڪريو ته آبي محلول ۾ ڪيئن H^+ ۽ OH^- آئن جي مقدار وڌڻ سان تيزابيت ۽ اساسيت وڌي ٿي.
4. تبديلي ردعمل کي مثال ڏئي سمجهايو.
5. روزمره زندگي ۾ لوڻ جا استعمال ٻڌايو.

ڀاڱو (د): حسابي سوال

1. NaOH جي 5M ڳار جي pH معلوم ڪريو.
2. سلفيورڪ ايسڊ (H_2SO_4) جي ڳار جي pH = 1.05 آهي ان جي pOH ۽ $[H^+]$ معلوم ڪريو.
3. هڪ ڳار جي $[H^+]$ مقدار $1 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$ آهي. ان جي pH معلوم ڪريو.



باب 3

نامياتي ڪيميا

وقت جي ورهاست

تدريسي پيريد 15 =

تشخيصي پيريد 03 =

سليبس ۾ حصو 15% =

اهم تصورات:

- 3.1 نامياتي مرڪب (Organic Compounds)
- 3.2 نامياتي مرڪبن جا ذريعا
- 3.3 نامياتي مرڪبن جا استعمال
- 3.4 الڪين (Alkane) ۽ الڪائل ريڊيڪل (Alkyl Radical)
- 3.5 سادن Alkanes, Alkenes ۽ Alkynes جي نالي لکڻ جا اصول (Nomenclature)
- 3.6 عمل واري گروپ (Functional Group) جو تعارف

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (Student Learning Outcomes)

هن باب سکڻ کان پوءِ شاگرد:

- ◉ سالم (Molecular)، ڳنڍيل (Condensed) ۽ بناوتي (Structural) فارمولن کي سڃاڻيندا.
- ◉ هائيڊروڪاربان جي سلسلي کي ڏهن ڪاربانن تائين سڃاڻي سگهندا.
- ◉ نامياتي مرڪبن جي ڪجهه عام خاصيتن کي سڃاڻي سگهندا.
- ◉ نامياتي مرڪبن جي گهڻائي (Diversity) جي وضاحت ڪري سگهندا.
- ◉ نامياتي مرڪبن جي ذريعن جي فهرست ٺاهي سگهندا.
- ◉ نامياتي مرڪبن جي استعمال جي فهرست ٺاهي سگهندا.
- ◉ سالم جي عمل واري گروپ کي ڳولي ۽ سڃاڻي سگهندا.
- ◉ Saturated ۽ Unsaturated هائيڊروڪاربان ۾ فرق ڪري سگهندا.
- ◉ Alkanes, Alkenes ۽ Alkynes فيملي جي شروعاتي ڏهن ميمبرن جا نالا لکي سگهندا.
- ◉ Alkane کي Alkyl ريڊيڪل ۾ تبديل ڪري سگهندا.
- ◉ Alkane ۽ Alkyl ريڊيڪل ۾ فرق ڪري سگهندا.
- ◉ عمل واري گروپ جي وصف لکي سگهندا.
- ◉ عمل واري گروپ جي بنياد تي نامياتي مرڪبن ۾ فرق ڪري سگهندا.
- ◉ نامياتي مرڪبن جي سڌي سلسلي (Straight chain)، شاخدار سلسلي (Branched chain) ۽ گولائي دار (Cyclic) مرڪبن ۾ درجہ بندي ڪري سگهندا.



تعارف

روزمره زندگي ۾ اسان جيڪي شيون استعمال ڪريون ٿا تقريباً نامياتي مرڪبن جون نهيل هونديون آهن. جهڙوڪ: ڪمپيوٽر، فرنيچر، کاڌي وارو تيل، صابن، صرف، سرڪو وغيره. 1828ع کان پهرين اهو سمجهيو ويندو هو ته نامياتي مرڪب صرف اهم قوت (Vital force) جي موجودگي ۾ ٺهي سگهن ٿا ۽ اهو Vital force جو نظريو 1815ع ۾ Berzelius متعارف ڪرايو. ان جي مطابق ”نامياتي مرڪب صرف جاندارن (جانور ۽ ٻوٽا) جي تاندورن (Tissue) ۾ ٺهن ٿا ۽ انهن کي تجربہ گاهه ۾ ڪنهن غير نامياتي مرڪب مان نٿو ٺاهي سگهجي. 1828ع ۾ جرمن ڪيميادان Friedrich Wohler پهريون ڀيرو تجربہ گاهه ۾ غير نامياتي مرڪب Ammonium Cyanate مان نامياتي مرڪب Urea ٺاهيو. Urea هڪ نامياتي مرڪب آهي، جيڪو جانورن مان پيشاب ذريعي نڪال ٿئي ٿو. Wohler ان کي اهم قوت جي غير موجودگي ۾ ٺاهيو.



اهو پهريون دفعو هو تجربہ گاهه ۾ ڪنهن نامياتي مرڪب جو ٺهڻ. ان ردعمل Vital force واري نظريي کي مڪمل ختم ڪيو ۽ نامياتي ڪيميا جي هڪ نئين وصف تجويز ڪئي ته ”نامياتي ڪيميا علم ڪيميا جي شاخ آهي جيڪا هائيڊروڪاربان ۽ ان مان اخذ ڪيل مرڪبن جي علم سان تعلق رکي ٿي. سڀني نامياتي مرڪبن ۾ ڪاربان هڪ ضروري عنصر جي حيثيت رکي ٿو.

3.1 نامياتي مرڪب

نامياتي مرڪب اهي مرڪب آهن جن ۾ ڪاربان Covalent بانڊ ذريعي ٻين عنصرن (جهڙوڪ: H, O, N) جي ائٽمن سان جڙيل هجي ٿو. مثال طور: Alcohol, Ethane, Chloroform, Amine وغيره.

نامياتي مرڪبن جون عام خاصيتون:

(i) ذريعا

نامياتي مرڪب جاندارن ۽ معدنيات مان ملن ٿا.

(ii) جوڙجڪ

سڀني نامياتي مرڪبن ۾ ڪاربان اهم عنصر آهي. ڪاربان سان گڏ عام طور تي H عنصر هوندو آهي. انهن مرڪبن ۾ O, S, N, P ۽ Halogens به ٿي سگهن ٿا. نامياتي مرڪبن ۾ ٻنهي قسمن جا Covalent بانڊ قطبي (Polar) ۽ غير قطبي (Non-polar) ٿي سگهن ٿا.

(iii) حل ٿيڻ جي صلاحيت

Like dissolve like واري قانون مطابق، نامياتي مرڪب پاڻي ۾ نٿا حل ٿين پر نامياتي محلول / ڳاريندڙ (Organic solvent) ۾ حل ٿي ويندا آهن. غير قطبي نامياتي مرڪب Ether, Carbondisulphide, Benzene ۾ حل ٿي ويندا آهن ۽ قطبي نامياتي مرڪب Alcohol ۾ حل ٿيندا آهن.

(iv) رجڻ پڌ ۽ تهڪڻ پڌ

جيئن ته هم گرفت (Covalent) باند ٿوڻائي (Ionic) باند کان ڪمزور ٿيندو آهي تنهنڪري نامياتي مرڪبن جو رجڻ ۽ تهڪڻ پڌ گهٽ هوندو آهي.

(v) ردعمل ڪرڻ جي رفتار

نامياتي مرڪبن جو ردعمل ڪرڻ تمام سست ٿيندو آهي ۽ ان لاءِ مخصوص حالتون پڻ گهربل هونديون آهن.

(vi) بجلي پسرائڻ

عام طور تي نامياتي مرڪب بجلي جا پسرائيندڙ ٺاهڻ هوندا ڇو ته اهي هم گرفت (Covalent Molecule) جا ٺهيل هوندا آهن.

(vii) سڙڻ جو عمل

ڪاربان جي گهڻي مقدار هجڻ ڪري سڙڻي نامياتي مرڪب آساني سان O_2 جي موجودگي ۾ سڙيو وڃن. سڙڻ سان عام طور تي CO_2 گئس ٺهندي آهي.

(viii) استقامت / پائيداري

غير نامياتي مرڪبن جي پيٽ ۾ نامياتي مرڪب گهڻي گرمي پڌ تي ٿوري استقامت رکي ٿا.

نامياتي فارمولن جي درجه بندي

جيتوڻيڪ Oxides (جيئن CO , CO_2 , Carbides, Carbonates ۽ Bicarbonates) سڙڻي ڪاربان جا مرڪب آهن پر انهن کي نامياتي مرڪب ناهي سمجهيو ويندو ڇو ته انهن جون بنيادي خاصيتون مختلف ٿينديون آهن. هر ڪيميائي مرڪب جو فارمولو مخصوص ٿيندو آهي. نامياتي مرڪبن جا چار مختلف قسمن جا فارمولا ٿيندا آهن.

- سالم (Molecular) فارمولو
- بناوتي (Structural) فارمولو
- ڳنڍيل (Condensed) فارمولو
- Cross ۽ Dot فارمولو




سالمی (Molecular) فارمولو:


اھو فارمولو نامیاتی مرکب جي مالیکیول ۾ موجود ائٽمن جو تعداد بلڪل درست ٻڌائيندو آھي. مثال طور: Butane جو سالمی فارمولو C_4H_{10} آھي. اھو واضح ڏيکاري ٿو ته Butane ڪاربان ۽ H جو ٺھيل آھي جنھن جي ھر ھڪ سالمی ۾ چار ڪاربان ۽ ڏھ H ائٽم آھن.

بناوٽي (Structural) فارمولو:

سالمی اندر مختلف عنصرن جي ھر ھڪ ائٽم جي بلڪل درست ترتيب سالمی جي بناوٽي فارمولي ذریعی ڏيکاري ويندي آھي. جڙیل ائٽمن جي وچ ۾ واحد Covalent بانڊ کي ھڪ سڌي لیک (-)، ٻئي Covalent بانڊ کي ٻئي لیک (=) ۽ ٽيئي Covalent بانڊ کي ٽن لیک ($\equiv$) ذریعی ڏيکاريو ويندو آھي. ٻن نامیاتی مرکبن کي ساڳیو سالمی فارمولو ٿي سگھي ٿو، پر انھن کي مختلف بناوٽي فارمولو ٿيندو آھي. جيئن:



n-butane



Isobutane

گنڊيل (Condensed) فارمولو:

ھن فارمولو ۾ ڪاربن ائٽمن سان جڙیل ائٽمن جي وچ ۾ موجود بانڊ لیک کي ناھي ڏيکاريو ويندو.




n-Butane




isobutane

Cross ۽ Dot فارمولو (اليڪٽراني):

ھن فارمولي کي اليڪٽراني فارمولو پڻ چيو ويندو آھي ۽ اھو سالمی ۾ مختلف ائٽمن وچ ۾ متاسٽائيل اليڪٽرانن کي ڏيکاريندو آھي.



Propane



Butane




جدول 3.1

شروعاتي ڏهن هائڊروڪاربان جا سالمی، بناوتي ۽ ڳنڍيل فارمولا

مرڪب	سالمی فارمولا	بناوتي فارمولا	ڳنڍيل فارمولا
Methane	CH_4	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	CH_4
Ethane	C_2H_6	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	H_3CCH_3
Propane	C_3H_8	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{H}_3\text{CCH}_2\text{CH}_3$
Butane	C_4H_{10}	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$
Pentane	C_5H_{12}	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$
Hexane	C_6H_{14}	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$
Heptane	C_7H_{16}	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$
Octane	C_8H_{18}	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$
Nonane	C_9H_{20}	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$
Decane	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_8\text{CH}_3$



نامياتي مرڪبن جي درجہ بندي:



نامياتي مرڪبن جي گهڻائي (Diversity):

توڻل 118 عنصر آهن جن جي اڄ تائين خبر پئي آهي. نامياتي مرڪب (جن ۾ کاربان آهي) ڏهن لکن کان مٿي آهن. کاربن جي مرڪبن جو اهو تعداد ٻين عنصرن جي مرڪبن کان تمام گهڻو آهي. هيٺيان سبب آهن جن جي ڪري نامياتي مرڪبن جو ايڏو تعداد آهي.

1. ڪيٽنيشن (Catenation):

ڪاربان ائٽم پاڻ ۾ هم گرفت باند ذريعي جڙي وڏو سلسلو يا گهيرو ٺاهن ٿا، ڪاربان ائٽم جي ان صلاحيت جي ڪري ئي نامياتي مرڪبن جو وسيع تعداد موجود آهي. ڪاربان جو سلسلو سڌو به ٿي سگهي ٿي ته شاخ وارو به. Catenation ڪاربان ائٽم جي اها صلاحيت آهي جنهن ذريعي هو ٻين ڪاربان ائٽمن کي سڌي Chain يا Ring ۾ جوڙي ٿو. Catenation جا ٻه معيار آهن جيڪي عنصر لاءِ ضروري آهن:

- عنصر جي گرفت (Valency) ٻه يا ٻه کان مٿي هجي.



ii. عنصر جي ائٽمن جو ٻين عنصرن جي ائٽمن جي پيٽ ۾ (جهڙوڪ آڪسيجن)


پنهجن ائٽمن سان مضبوط باند هجڻ گهرجي.

جيتوڻيڪ C ۽ Si کي ساڳي اليڪٽراني بناوت آهي پر C ائٽم کي Si کان وڌيڪ Catenation جي صلاحيت هوندي آهي. ان جو سبب اهو آهي ته C-C باند 355 kJ mol^{-1} Si-Si (200 kJ mol^{-1}) کان وڌيڪ مضبوط آهي. ٻئي طرف Si-O باند 452 kJ mol^{-1} C-O (351 kJ mol^{-1}) کان وڌيڪ مضبوط آهي، Si قدرت ۾ Silica ۽ Silicate طور ملي ٿو.

2. هم ترکيبي (Isomerism):

نامياتي مرڪبن جو ججهي مقدار ۾ هجڻ جو ٻيو سبب هم ترکيبي آهي. اهي ٻه مرڪب جن کي ساڳيو سالمی فارمولو هجي پر مختلف بناوتي فارمولو هجي انهن کي هم ترکيب (Isomers) چيو ويندو آهي.

هم ترکيبي ذريعي بناوٽن جي تعداد وڌي ٿي جيئن C_5H_{12} کي ٽن مختلف بناوٽن ذريعي ڏيکاري سگهجي ٿو، ان کي C_5H_{12} کي ٽي هم ترکيب ٿيندا آهن جيڪي هيٺ ڏيکاريل آهن.



هم ترکيب جي تعداد ڪيميائي فارمولي ۾ C جي تعداد وڌڻ سان وڌي ٿي.

3. کاربان جي هم گرفت (Covalent) باند جي مضبوطي:

کاربان ائٽم جي ننڍڙي سائيز هجڻ سبب اهو ٻين کاربان ائٽمن سان ۽ پڻ O، H، N ۽ Halogens سان انتهائي مضبوط Covalent باند ٺاهي ٿو. انهي خاصيت کي ڪيترائي مرڪب ٺهن ٿا.

4. گهڻي بانڊنگ:

کاربان ائٽم پنهنجي چوگرتي (Tetra valency) کي پورو ڪرڻ لاءِ گهڻا بانڊ ٺاهي ٿو (جيئن واحد، ٻيو ۽ ٽيٿو). ان کي ڪيترائي بناوتي (Structure) ٺهي سگهن ٿا. Ethane ۾ هڪ Covalent باند ٻن کاربان ائٽمن کي جوڙي ٿو، Ethylene ۾ ٻيو Covalent باند ٻن کاربان ائٽمن کي جوڙي ٿو ۽ Acetylene ۾ ٽيٿو Covalent باند ٻن کاربان ائٽمن کي جوڙي ٿو.

آزمائشي سوال




1. نامياتي مرڪبن جي عام خاصيتن جي فهرست ٺاهيو.

2. نامياتي مرڪب جي ردعمل جي رفتار ڪيتري آهي؟




3.2 نامياتي مرڪبن جا ذريعا:

جاندار ۽ معدنيات نامياتي مرڪبن جا ٻه اهم ذريعا آهن. اهي ذريعا هيٺ وضاحت ٿيل آهن:



3.2.1 ڪوئلو:


ڪوئلو ڪيترن ئي هائڊروڪاربان جي قسمن جو ٺهيل هوندو آهي. اهو ٻارڻ (Fuel) جو اهم ذريعو آهي. ان کي زمين جي سطح کان هيٺ مختلف گهرائين ۾ ڳولي سگهجي ٿو. ڪوئلو مختلف قسمن جو ٿئي ٿو. ڪوئلي جي باري ۾ چيو وڃي ٿو ته هزارين سال اڳ موجود وڻ جيڪي مٽي ۾ ڊبجي ويا ان مان ٺهيو آهي. شروع ۾ Bacteria ۽ ڪيميائي ردعملن جي ڪري ڪاٺ Peat ۾ تبديل ٿيو ۽ پوءِ زمين جي سطح کان گهڻي گرمي پد ۽ دٻاءُ جي ڪري Peat ڪوئلي ۾ تبديل ٿيو آهي. Carbonization هڪ قدرتي مرحلو آهي جنهن ۾ ڪاٺ ڪوئلي ۾ تبديل ٿئي ٿو. ڪاٺ ۾ 40% ڪاربان آهي. Carbonization جي شدت جي بنياد تي ڪوئلي جا چار قسم آهن.



شڪل 3.1 ڪوئلي جي تشڪيل

چائڻ، آمريڪا، روس، يورپ، جرمني، پولينڊ، آسٽريليا ۽ پاڪستان ڪوئلي جي گهڻي پيداوار وارا ملڪ آهن. سنڌ جي ضلعي ٿرپارڪر ۾ دنيا جي وڏي ڪوئلي جي کاڌ آهي جنهن ۾ 185 بلين ٽن کان وڌيڪ ڪوئلو آهي. ڊگاري سور رينج، ڪوست شاهرگ (بلوچستان) ۽ سالت رينج (پنجاب) ڪوئلي جون Active ڪاٿون آهن.


3.2.2 پيٽروليم:



شڪل 3.2 فريڪشنل ڊسٽيليشن

پيٽروليم ناسي يا سائو ڪارڙي رنگ جو گهاٽو پٽڙو آهي. اهو هڪ نهري، پٽڙو ۽ گئسي هائڊروڪاربان، زميني ذرڙن ۽ لوڻ جو پيچيده مجموعو آهي. نامياتي مرڪب گهڻو قدر پيٽروليم مان ملن ٿا. اهو گهڻن ئي قسمن جي مرڪبن جو ٺهيل هوندو آهي، جنهن ۾ گهڻي تعداد هائڊروڪاربان جي آهي. ڀاڱياري عرق ڪشي (Fractional Distillation) جي ذريعي انهن مرڪبن کي الڳ ڪيو ويندو آهي. (مرڪبن کي سندن تهڪڻ پد جي بنياد تي مختلف ڀاڱن ۾ الڳ / جدا ڪيا وڃن ٿا). هر ڀاڱي ۾ مخصوص ڪيميائي مرڪب الڳ ٿئي ٿو.

3.2.3 قدرتي گئس:



شڪل 3.3 قدرتي گئس جي کوٽائي

اها گئس گهٽ مائي واري Hydrocarbons جي ملاوت آهي. Methane سان گڏ Propane ۽ Butane گئسون ملي ڪري ملاوت جو 85% ٺاهن ٿيون. اها ڪوئلي ۽ پيٽروليم سان ملندڙ جلندڙ آهي. ان ڪري انهن سان گڏ ڪاڻ مان ملندي آهي. قدرتي گئس گهريلو ۽ انڊسٽري ۾ بارڻ طور استعمال ڪئي ويندي آهي. ڊيبل قدرتي گئس (CNG) گاڏين ۾ بارڻ طور استعمال ڪئي ويندي آهي. پاڻ ۽ ڪارو ڪاربان پڻ ان مان ٺاهيا ويندا آهن.

3.2.4 بوٽا

وڏا ماليڪيول جهڙوڪ ڪاربوهايڊريٽس، ليڊ، پروٽين ۽ وٽامنس ٻوٽي ۾ موجود هوندا آهن. گلوڪوز جيڪو ڪاربوهايڊريٽ جو بنيادي ايڪو آهي، ٻوٽن ۾ ضيائي تاليف (Photosynthesis) ذريعي ٺهندو آهي. نشاستو ۽ سيلولوز تڏهن ٺهندا آهن جڏهن Glucose جا سوين ماليڪيول پاڻ ۾ جڙندا (Polymerize) آهن. دالون ۽ مٽر پروٽين سان ڀريل آهن. پروٽين کي ٻوٽن جي پاڙن ۾ ويٺل Nitrogen Fixing Bacteria ٺاهن ٿا. گجي، ناريل ۽ سورج مکهي جي ٻجن ۾ تيل هوندو آهي. صوف ۽ ٻيا رس ڀريا ميوا وٽامنس سان ڀريل هوندا آهن. بوٽا نه صرف اسان کي کاڌو ڏين ٿا پر اهي علاج، ربڙ ۽ ڪنور به ڏين ٿا.



3.2.5 نامياتي مرڪبن کي ليبارٽري ۾ ٺاهڻ:

اها سوچ صرف ٻه صديون اڳ جي هئي ته رڳو ٻوٽا ۽ جانور ئي نامياتي مرڪب ٺاهي سگهن ٿا، ڇو ته انهن ۾ مرڪبن کي ٺاهڻ لاءِ گهربل Vital force هوندي آهي. جڏهن ته Wohler جو ليبارٽري ۾ Urea کي ٺاهڻ پهريون قدم / بنياد هو نامياتي مرڪبن کي ليبارٽري ۾ ٺاهڻ جو. اڄ ڏينهن تائين 10 ملين کان به وڌيڪ نامياتي مرڪب ليبارٽري ۾ ٺهي چڪا آهن. اهي سادا ۽ پيچيده مرڪب آهن. انهن ۾ دوائن، پرفيوم، پلاسٽڪ، رنگ، فائبر، ربڙ، سينگار جو سامان، صابن، صرف، جيت مار دوائن کي ٺاهڻ جا مرڪب به اچي وڃن ٿا.

3.3 نامياتي مرڪبن جا استعمال

ان ۾ ڪو شڪ ناهي سوين نامياتي مرڪب ٻوٽن ۽ جانورن ۾ ٺهندا آهن پر سائنسدانن لکين مرڪب تجربو گاهه ۾ پڻ تيار ڪن ٿا. اهي مرڪب گهڻن ئي شين ۾ موجود هوندا آهن. مثلاً انسان جي کاڌي کان ويندي روزمره جي زندگي ۾ استعمال ٿيندڙ شين ۾ جيڪي اسان جون ضرورتون پوريون ڪن ٿيون انهن ۾ نامياتي مرڪب آهن.

- کاڌي طور استعمال: کاڌو جيڪو اسان روز ڪائون ٿا جهڙوڪ ڪير، بيضا، گوشت، ڀاڄيون وغيره سڀني ۾ نامياتي مرڪب هوندا آهن، مثال طور: پروٽين، چرٻي، وٽامن وغيره.
- لباس ۾: قدرتي (ڪاٺن، ريشم، اُن وغيره) ۽ هٿرادو (پوليٽر، نائلون) فائبر کي لباس ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي ڪپڙا، بيشيٽ وغيره اهي سڀ نامياتي مرڪبن جون ٺهيل آهن.
- گهرن ۾: ڪاٺ جيڪو گهڻو قدر Cellulose جو ٺهيل هوندو آهي (نامياتي مرڪب آهي)، ان کي گهر ٺاهڻ ۽ ان جي خوبصورتي ۾ ڪم آڻيو آهي.
- ٻارڻ طور: ڪوئلو، پيٽروليم ۽ قدرتي گئس جن کي اسان پنهنجي گاڏين ۽ گهرن ۾ ٻارڻ طور استعمال ڪريون ٿا. اهي سڀ نامياتي مرڪب آهن ۽ انهن کي Fossil Fuel پڻ چيو ويندو آهي.
- طبي استعمال: نامياتي مرڪب (ٻوٽن مان قدرتي طور ملندڙ) کي اسان طبي طور علاج ۾ پڻ استعمال ڪندا آهيون. جيوڙامار (Antibiotic) (جيڪي نقصانڪار بئڪٽيريا کي مارين ٿيون) ۽ ٻيون زندگي بچائيندڙ دوائون ۽ علاج تجربو گاهه ۾ ناهيون وينديون آهن سڀ نامياتي مرڪب آهن.
- خام مال طور: نامياتي مرڪبن کي ربڙ، پيپر، مس، رنگ وغيره کي ٺاهڻ ۾ پڻ استعمال ڪيو ويندو آهي.

3.4 الڪين ۽ الڪائل ريڊيڪل

Saturated هائڊروڪاربان يا Paraffins الڪين آهن (Para معنيٰ ٿوري، Affinity معنيٰ صلاحيت). انهن جو عام فارمولو C_nH_{2n+2} آهي، جتي “n” ڪاربان جي تعداد کي ظاهر ڪري ٿو. Alkanes لاءِ “n” جي قيمت 1 کان 40 تائين ٿي سگهي ٿي. الڪين هم شڪلي سلسلي (Homologous Series) جا اهم مرڪب آهن.



همر شڪلي سلسلو (Homologous Series):

نامياتي مرڪبن کي خاصيتن جي بنياد تي مختلف درجن ۾ ورهايو ويو آهي. همر شڪلي سلسلو هڪ نالو آهي جيڪو مرڪبن جي هر درجي کي ڏنو ويو آهي. اهي نامياتي مرڪب جيڪي ساڳي سلسلي سان وابسته آهن انهن کي هيٺيون خاصيتون هونديون آهن:

1. سلسلي جي سڀني ميمبرن لاءِ ساڳيو عام فارمولو هوندو آهي. مثال طور Alkanes لاءِ C_nH_{2n+2} ، Alkenes لاءِ C_nH_{2n} ۽ Alkynes لاءِ C_nH_{2n-2} .
 2. سلسلي جو هر ڀيو ميمبر پهرين ميمبر کان 14 a.m.u مائي يا CH_2 جو فرق رکندو آهي.
 3. سلسلي جي ميمبرن جون ڪيميائي خاصيتون ساڳيون هونديون آهن، ڇو ته انهن جو عمل وارو گروپ ساڳيو هوندو آهي.
 4. انهن جي طبعي خاصيتن جو اندازو آساني سان لڳائي سگهجي ٿو. جهڙوڪ انهن جو تهڪڻ ۽ رجڻ پد جو درجو مائي جي واڌ سان وڌندو آهي.
 5. انهن کي ٺاهڻ لاءِ ساڳيو طريقيڪار هوندو آهي.
- هائڊروڪاربان مرڪبن کي ٻين نامياتي مرڪبن لاءِ بنياد سمجهيو وڃي ٿو. ٻيا سڀ نامياتي مرڪب، هائڊروڪاربان جي هڪ يا هڪ کان وڌيڪ H ائٽمن کي ٻين ردعمل ڪندڙ ائٽم سان متاستا ڪري ٺاهيا ويندا آهن.

الڪائل ريڊيڪل جو ٺهڻ:


الڪائل ريڊيڪل الڪين جا ماخذ آهن. الڪيل جي ڪنهن به هڪ H ائٽم کي هٽائي الڪائل ريڊيڪل ٺاهي سگهجي ٿو ۽ ان جي نشاني ”R“ آهي. انهن جو نالو ٺاهڻ لاءِ Alkane جي ”ane“ جي جڳهه تي ”yl“ لڳائي ٺاهيو ويندو آهي. پهريان ڏهه Alkanes ۽ انهن جا Alkyl ريڊيڪل هيٺ جدول ۾ ڄاڻايل آهن. انهن جو عام فارمولو C_nH_{2n+1} آهي.

جدول 3.2 الڪائل ريڊيڪل جو ٺهڻ

نالو	Alkyl radical	سالمي فارمولو	Alkane
Methyl	$CH_3 -$	CH_4	Methane
Ethyl	$C_2H_5 -$	C_2H_6	Ethane
Propyl	$C_3H_7 -$	C_3H_8	Propane
Butyl	$C_4H_9 -$	C_4H_{10}	Butane
Pentyl	$C_5H_{11} -$	C_5H_{12}	Pentane
Hexyl	$C_6H_{13} -$	C_6H_{14}	Hexane
Heptyl	$C_7H_{15} -$	C_7H_{16}	Heptane
Octyl	$C_8H_{17} -$	C_8H_{18}	Octane
Nonyl	$C_9H_{19} -$	C_9H_{20}	Nonane
Decyl	$C_{10}H_{21} -$	$C_{10}H_{22}$	Decane



Propane ۽ Butane جي ريڊيڪل تي بحث ڪرڻ آسان آهي. Propane جي سڌي Chain وانگر بناوت آهي. جڏهن ان مان ڇيڙي وارو H ائٽم ڪڍي ڇڏبو ته ان کي n-Propyl چئبو ۽ جڏهن ان جي وچ وارو H ائٽم ڪڍي ڇڏبو ته ان کي Isopropyl سڏبو آهي. جيئن هيٺ ڏيکاريل آهي:



Butyl ريڊيڪل جا Structure هن ريت هوندا آهن.

Saturated ۽ Unsaturated هائڊروڪاربان ۾ فرق:

Unsaturated هائڊروڪاربان	Saturated هائڊروڪاربان
- انھن ۾ ڪاربان ڪاربان وچ ۾ ٻڌو يا ٿيڻو باند هوندو آهي. ($\text{C}=\text{C}$, $\text{C}\equiv\text{C}$). - انھن ۾ سڀني ڪاربان جي Valency satisfied نه هوندي آهي. - Saturated هائڊروڪاربان جي ڀيٽ ۾ انھن وٽ H جي تعداد ڪجهه گهٽ ۽ C جي تعداد ڪجهه وڌيڪ ٿيندي آهي. - اهي وڌيڪ / تيز ردعمل ڪندڙ آهن. - اهي هوا ۾ پيلي ۽ ڪاري دونھين جي شعلن (Sooty flame) سان سڙن ٿا. - Alkenes ۽ Alkynes انھن جا مثال آهن. - Alkenes جو C_nH_{2n} ۽ Alkynes جو $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ عام فارمولو آهي. - مثال طور:	- انھن ۾ ڪاربان ڪاربان وچ ۾ هڪ يا اڪيلو باند هوندو آهي. ($\text{C}-\text{C}$). - انھن ۾ سڀني ڪاربان جي Valency satisfied ٿيندي آهي يعني هڪ ڪاربان ائٽم ٻڌو يا ٿيڻو باند ناهي ٺاهيندو. - انھن ۾ ڪاربان جي تعداد گهٽ ۽ H جي تعداد وڌيڪ هوندي آهي. - اهي گهٽ يا سست ردعمل ڪندڙ آهن. - اهي هوا ۾ تيزي ۽ بغير ڪاري دونھين جي شعلن (Non sooty flame) سان سڙن ٿا. - انھن جي مثال ۾ Alkanes ايندا آهن. - Alkanes جو عام فارمولو $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ آهي. - مثال طور:
<u>Alkenes</u> Ethene $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ Propene $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ <u>Alkynes</u> Ethyne $\text{CH} \equiv \text{CH}$ Propyne $\text{CH} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$	Ethane $\text{CH}_3\text{--CH}_3$ Propane $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_3$



3.5 نالي ڏيڻ جو طريقو (Nomenclature)

نامياتي مرڪبن جي شروع ۾ ذريعن جي بنياد تي درجہ بندي ڪئي وئي. مثال طور Methane کي دلدي (Marsh) گئس، Methyl Alcohol کي ڪاٺ جو اسپرٽ ۽ Acetic Acid کي سرڪي طور نالو ڏنو ويو. اهي عام روايتي نالا (Trivial) آهن. نامياتي مرڪبن جي تيزي سان وڌندڙ مقدار سبب انهن کي مختلف نئون نالو ڏيڻ ۾ ڏکيائي پيش ٿي انهي مسئلي جي حل لاءِ قابل سائنسدانن جو Geneva ۾ سمپوزيم منعقد ٿيو. 1882ع ۾ انهن نالي ڏيڻ جو هڪ System ٺاهيو جنهن کي Geneva system سڏيو ويو. انهي سلسلي ۾ 1930ع ۾ علم ڪيميا جي عالمي اتحاد (I.U.C) پڻ ڪوشش ڪئي. Pure ۽ Applied Chemistry جي عالمي اتحاد ان سرشتي کي اجا وڌيڪ ترقي ڏني. 1960ع ۾ نالي ڏيڻ جو IUPAC System قائم ٿيو.

Alkanes کي نالي ڏيڻ جا ضابطا:


1. مليل Alkane جي ميمبر مان وڏي کان وڏي ممڪن ڪاربان ائٽمن جي Chain چونڊيو.




2. Chain جي ڪاربان ائٽمن تي نمبر ڏيڻ ان چيڙي کان شروع ڪيو، جتان کان ريڊيڪل ويجهو پوي.



3. ريڊيڪل جو نالو نمبر سان گڏ Alkyl طور لکو. (ريڊيڪل جو نالو Branch ۾ موجود ڪاربان ائٽمن جي تعداد تي دارومدار رکي ٿو).




4. جيڪڏهن ريڊيڪل جو تعداد ٻه يا ٽي کان مٿي آهي ۽ سڀ ريڊيڪل هڪجهڙا آهن ته پوءِ ريڊيڪل جي نالي ۾ Di, Tri, Tetra وغيره Prefix طور نمبر سان گڏ لکبا.






5. جيڪڏهن ٻه مختلف ريڊيڪل آهن ته پوءِ سڀ کان پهرين نالو ان جو لکيو جنهن جو انگريزي اکر ۾ پهرين ايندو هجي. جيئن Ethyl جو نالو Methyl کان پهرين لکيو.





6. اگر Chain ۾ ٻه مختلف ريڊيڪلز جي جڳهه ڇيڙن کان ساڳي بيهي ته پوءِ نمبر جي لحاظ سان اهميت وڌي ريڊيڪل کي ڏني ويندي.





7. ريڊيڪل جو نالو سندس جڳهه سان گڏ پهرين لکيو ويندو پوءِ Chain جو نالو Alkane طور لکيو ويندو آهي.

Alkenes کي نالي ڏيڻ جا ضابطا:

1. ڪاربان ائٽمن جي وڌي کان وڌي ممڪن Chain جي چونڊ ڪيو، جنهن ۾ ٻئي باند $(C = C)$ وارا ڪاربان ائٽم لازمي شامل ٿين.
2. ريڊيڪلز جي برعڪس Chain جي Numbering ان ڇيڙي کان ڪيو جتان $C = C$ ويجهو پوي.




3. Chain جو نالو لکڻ وقت "ane" جي بدران "ene" لکيو ويندو. گڏ ٻئي باند جي جڳهه پڻ لکي ويندي.






4. جيڪڏهن ٻن باند (C = C) جي تعداد ٻن کان مٿي آهي ته پوءِ انهن جي نالي جي آخر ۾ Tetra, Tri, Di وغيره جو اضافو ڪيو ويندو.



Alkynes جي نالي ڏيڻ جا ضابطا:



1. ڪاربان ائٽمن جي وڏي کان وڏي ممڪن Chain جي چونڊ ڪيو، جنهن ۾ ٽيئي باند (C ≡ C) وارا ڪاربان ائٽم لازمي شامل هجن.

2. ريڊيڪل جي برعڪس Chain جي Numbering ان ڇيڙي کان ڪيو جتان (C ≡ C) ويجهو هجي.




3. (C ≡ C) باند ۾ ننڍو نمبر رکندڙ ڪاربان ٽيئي باند جي جڳهه ظاهر ڪندو آهي.



4. انهن جي نالي جي آخر ۾ "ane" جي بدران "yne" لکيو ويندو آهي. گڏ C ≡ C جي پوزيشن پڻ لکي ويندي آهي.





5. جيڪڏهن C ≡ C جو تعداد ٻن کان مٿي هجي ته پوءِ انهن جي نالي ۾ Tetra, Tri, Di وغيره جو اضافو ڪيو ويندو.



6. جيڪڏهن C = C ۽ C ≡ C ٻئي موجود هجن ۽ ٻنهي جي جڳهه ڇيڙن کان ساڳي هجي ته پوءِ Numbering ۾ اهميت C = C کي ڏني ويندي (جتان ويجهو هجي).



7. جيڪڏهن C = C ۽ C ≡ C ٻئي موجود آهن ۽ ٻنهي جي پوزيشن مختلف هجي ته پوءِ Numbering ان ڇيڙي کان ڪئي ويندي جتان ٻنهي مان ڪوبه ويجهو هجي.





3.6 عمل وارو گروپ

عمل واري (Functional) گروپ جي هن ريت وصف آهي ته ”اهي نامياتي مرڪب ۾ موجود ائٽم يا ائٽمن جو گروپ آهي جن جي موجودگي سان مرڪب کي مخصوص مختلف خاصيتون ملن ٿيون.“ عمل وارا گروپ نامياتي مرڪبن جي فيملي جي بناوت جي پڻ وضاحت ڪن ٿا. Alkyl Halide فيملي ۾ عمل وارا گروپ Halogen ائٽم ٿيندا آهن، جڏهن ته Alcohol فيملي جو عمل وارو گروپ ”OH“ (هائڊروآڪسي) هوندو آهي. Functional گروپ نامياتي ڪيميا جو هڪ اهم حصو ناهي ٿو. ان کي Hydrocarbons جو ماخذ سمجهيو ويندو آهي، جنهن ۾ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ H ائٽمن کي Functional گروپ سان متبادل ڪيو ويو آهي. اهو گروپ نامياتي مرڪب جي بنيادي (ڪيميائي) خاصيت جو سبب ٿئي ٿو جڏهن ته Alkyl گروپ طبعي خاصيتن تي اثر انداز هوندا آهن. جيئن Alcohol ۾ قطبي ”OH“ گروپ انهن جي حل ٿيڻ جي صلاحيت کي وڌائين ٿا ۽ غير قطبي Alkyl گروپ انهن جي پاڻي ۾ حل ٿيڻ جي صلاحيت گهٽائيندا آهن. ڪجهه عمل واري گروپ جا نالا نامياتي مرڪبن جي بناوت سان گڏ هيٺ جدول ۾ ڏجن ٿا.

جدول 3.3 عمل وارا گروپ

S.#	هم شڪلي سلسلو	عام فارمولو	فنڪشنل گروپ ۽ انهن جا نالا
i.	Alkanes	C_nH_{2n+2} or $R-H$	_____
ii.	Alkenes	C_nH_{2n}	$\begin{array}{c} \diagup \\ C \\ \diagdown \end{array} = \begin{array}{c} \diagup \\ C \\ \diagdown \end{array}$ Double bond
iii.	Alkynes	C_nH_{2n-2}	$-C \equiv C-$ Triple bond
iv.	Haloalkanes	$R-X$ (where $x=F, Cl, Br, I$) or $C_nH_{2n+1}X$	$-X$ (Halide group)
v.	Alcohols	$R-OH$ or $C_nH_{2n+1}OH$	$-OH$ (Hydroxyl group)
vi.	Phenols	 or C_6H_5OH	$-OH$ (Hydroxyl group)
vii.	Ethers	$R-O-R'$ or $C_nH_{2n+2}O$	$-OR'$ (Alkoxyl group)
viii.	Aldehydes	$\begin{array}{c} H \\ \diagdown \\ C=O \\ \diagup \\ R \end{array}$	$\begin{array}{c} H \\ \diagdown \\ C=O \\ \diagup \end{array}$ (Carbonyl group) or $-CHO$ (aldehyde group)
ix.	Ketones	$\begin{array}{c} R \\ \diagdown \\ C=O \\ \diagup \\ R' \end{array}$	$\begin{array}{c} \diagdown \\ C=O \\ \diagup \end{array}$ (Carbonyl group) (ketonic group)



x.	Carboxylic Acids	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \text{ or } \text{R}-\text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{OH} \text{ (Carbonyl group)} \\ \text{(Carboxylic group)} \end{array}$
xi.	Esters	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{OR}' \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{OR}' \text{ (Alkoxy carbonyl group)} \\ \text{or Ester group} \end{array}$

3.6.1 C, H ۽ O وارا عملي گروپ:

Alcohols, Ethers, Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids ۽ Esters سڀئي ۾ C, H ۽ O وارا Functional گروپ آهن. انهن جا مثال، نالا ۽ فارمولا جدول 3.4 ۾ ڏنل آهن.

(i) الکوحل جو گروپ:



انهن جو عمل وارو گروپ "OH" هوندو آهي. گروپ فارمولو ROH آهي، جنهن ۾ R هڪ Alkyl گروپ آهي. CH_3-OH Methyl alcohol, $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$ Ethyl alcohol, $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ n-Propyl alcohol

(ii) Ether جو گروپ:

انهن جو عمل وارو گروپ C-O-C آهي. گروپ فارمولو R-O-R' آهي، جنهن ۾ R ۽ R' الڪائل گروپ آهن (اهي هڪجهڙا ۽ مختلف به ٿي سگهن ٿا). $\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3$ Dimethyl ether, $\text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$ Diethyl ether, $\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$ Ethyl methyl ether



(iii) Aldehydes جو گروپ:

انهن جو عمل وارو گروپ CHO هوندو آهي. گروپ فارمولو $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$ RCHO آهي. هوندو آهي، جنهن ۾ "R" الڪائل گروپ آهي يا وري H ائٽم به ٿي سگهي ٿو.



(iv) Ketone جو گروپ:

اهي مرڪب جن ۾ عمل وارو گروپ $\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{C}$ هجي انهن کي Ketones چيو ويندو آهي. انهن جو گروپ فارمولو $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$ آهي. R ۽ R' الڪائل گروپ آهن. (اهي هڪجهڙا ۽ مختلف به ٿي سگهن ٿا).



(v) Carboxyl جو گروپ:



اهي مرڪب جن ۾ عمل وارو گروپ COOH - هجي انهن کي Carboxylic Acids چيو ويندو آهي. گروپ فارمولو $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$ آهي جنهن ۾ R يا ته Alkyl گروپ هوندو آهي يا وري H ائٽم به ٿي سگهي ٿو.





(vi) Esters جو گروپ:

نامياتي مرڪب جن ۾ RCOOR عمل وارو گروپ هجي انهن کي Esters چيو ويندو آهي. انهن جو گروپ فارمولو $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}'$ آهي. Alkyl گروپ ساڳيا ۽ مختلف به ٿي سگهن ٿا.




جدول 3.4: C, H ۽ O وارا فنڪشنل گروپ


مثال	عام فارمولو	فنڪشنل گروپ	فيمل نالو
Alcohols			
Primary	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$	$-\text{CH}_2-\text{OH}$	
Secondary	$\begin{array}{c} \text{R} \\ \\ \text{CH}-\text{OH} \\ \\ \text{R} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}-\text{OH} \end{array}$	
Tertiary	$\begin{array}{c} \text{R} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{R} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{C}-\text{OH} \end{array}$	
Ethers	$\text{R}-\text{O}-\text{R}$	$-\text{O}-$	
Aldehydes	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$	
Ketones	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}$	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$	
Carboxylic acids	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	
Esters	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}$	$\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}$	

3.6.2 C, H ۽ N وارا عملي گروپ:


نامياتي مرڪب جن ۾ C, H ۽ N هجي انهن کي Amines چيو ويندو آهي. انهن جو عمل وارو گروپ $-\text{NH}_2$ هوندو آهي ۽ گروپ فارمولو $\text{R}-\text{NH}_2$ آهي. مثال طور:



Methylamine



Dimethylamine



Trimethylamine



3.6.3 H, C ۽ H (X) Halogen وارا عملي گروپ:


نامياتي مرڪب جن ۾ H, C ۽ H (X) Halogen هجن انهن کي Alkyl Halide سڏيو ويندو آهي. انهن جو گروپ فارمولو R - X آهي. I يا Br, Cl, F = X.

جدول 3.5: H, C ۽ X وارا فنڪشنل گروپ

مثال	عام فارمولو	فنڪشنل گروپ	فيمني نالو
Alkyl Halides			
a. Primary	$R-CH_2-X$	$-CH_2-X$	
b. Secondary	$\begin{array}{c} R \\ \\ R-CH-X \\ \\ R \end{array}$	$\begin{array}{c} \diagup \\ CH-X \\ \diagdown \end{array}$	
c. Tertiary	$\begin{array}{c} R \\ \\ R-C-X \\ \\ R \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ -C-X \\ \end{array}$	
H_3C-CH_2-X Ethyl halide			
$\begin{array}{c} H_3C \\ \\ H_3C-CH-X \\ \\ H_3C \end{array}$ sec-Propyl halide			
$\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ H_3C-C-X \\ \\ CH_3 \end{array}$ ter-Butyl halide			

3.6.4 پٽا (C = C) ۽ ٿيٽا (C ≡ C) باند

Hydrocarbon جن ۾ پٽي باند وارا ڪاربان ائٽم (C = C) هجن انهن کي Alkene



Ethene



Propene

Hydrocarbon جن ۾ ٿيٽي باند وارا ڪاربان ائٽم (C ≡ C) هجن انهن کي Alkyne



Ethyne (Acetylene)



Propyne

آزمائشي سوال:




جيڪڏهن اسان نيري لٽمس پيپر کي ڳار ۾ وجهون ۽ ان جو رنگ ڳاڙهي رنگ ۾ تبديل ٿي وڃي، پوءِ ٻڌايو ان ڳار ۾ ڪهڙو عمل وارو گروپ هوندو؟

سماج، سائنس ۽ سوسائٽي

دواساز انڊسٽري ۾ نئين دوائن جي معيار تي ضابطو رکڻ ۽ انهن جي تجزيي ۽ ٺاهڻ ۾ دواساز ڪيميادانن جو اهم ڪردار آهي. دواساز ڪيميادان مخصوص ڪيميائي مرڪبن جي چونڊ بيمارين جي خاتمي يا علاج لاءِ ڪري ٿو. ڪيميادان دوائن کي ٺاهڻ ۾ يا علاج کي ڳولڻ ۾ انتهائي اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.



تصوراتي خاكو





خلاصو

- پهريون ځل پيرو لفظ "Organic Compound" برزيليس استعمال ڪيو انهن مرکبن لاءِ جيڪي جانور ۽ ٻوٽن مان حاصل ڪيا ويا.
- Vital force جي نظريي مطابق، نامياتي مرکب صرف جاندارن ۾ موجود هوندا آهن ۽ انهن ۾ ئي نهندا آهن.
- Urea پهريون هٿرادو تيار ٿيندڙ نامياتي مرکب آهي جنهن کي Wohler سائنسدان 1828ع ۾ تيار ڪيو.
- کاربان نامياتي مرکبن ۾ اهم عنصر آهي.
- Hydrocarbons کاربان ۽ H جا مرکب آهن.
- نامياتي ڪيميا جي جديد وصف آهي ته "اهو علم Hydrocarbons ۽ ان مان ماخذ ڪيل مرکبن جي باري ۾ آهي".
- کاربان ائٽمن جو پاڻ ۾ باند ٺاهڻ واري خاصيت کي Catenation چيو وڃي ٿو.
- هر ترکیب آهي مرکب آهن جن جو سالمی فارمولو ساڳيو هجي پر بناوٽي فارمولو مختلف هجي.
- Isomerism ۽ Catenation جي ڪري دنيا ۾ ڪروڙين مرکب وجود رکن ٿا.
- Chain جي بنياد تي نامياتي مرکبن جا ٻه قسم آهن Open Chain ۽ Close Chain.
- Saturated Hydrocarbons ۾ کاربان ائٽمن جي وچ ۾ اڪيلو باند (C - C) ٿيندو آهي (مثال طور: Alkanes) ۽ Unsaturated Hydrocarbons ۾ ٻٽو باند (C = C) ٿيندو آهي (مثال طور: Alkenes).
- نامياتي مرکب Organic solvent ۾ حل پذير آهن جيئن Benzene, Carbon disulphide, Ether وغيره.
- نامياتي مرکبن ۾ باند واري سگهه ڪمزور هوندي آهي ان ڪري انهن جو رجڻ پڌ ۽ ٽهڪڻ پڌ گهٽ ٿيندو آهي.
- نامياتي مرکبن جو ردعمل ڪرڻ سست ٿيندو آهي.
- سڀئي نامياتي مرکب سڙڻ سان هڪ ئي سالمو ٺاهيندا آهن، کاربانڊاءِ آڪسائيڊ.
- Homologous Series جي ميمبرن کي ساڳيو عمل وارو گروپ هوندو آهي.
- ڪوئلي کي ڪارو سون پڻ چيو ويندو آهي.
- پاڪستان ۾ قدرتي گئس کي Sui Gas چيو ويندو آهي.
- نامياتي مرکب جو نالو بن حصن ۾ آهي پهريون حصو (Prefix) کاربان جي تعداد ٻڌائيندو آهي ۽ ٻيو حصو (Suffix) عمل وارو گروپ.
- Alkyl Radical الڪين مان H مان ڪي متبادل ڪري ٺاهيو ويندو آهي.
- عمل وارو گروپ ائٽم يا ائٽمن جو گروپ آهي جيڪو مرکب کي خاصيتون ڏئي ٿو.
- عمل وارو گروپ جي بنياد تي نامياتي مرکبن کي Families ۾ ورهايو ويو آهي.



مشق

ڀاڱو (الف): صحيح جواب جي چونڊ ڪريو.

صحيح جواب تي دائرو ڀريو:

1. علم ڪيميا جي شاخ جيڪا Hydrocarbon ۽ ان جي ماخذ (Derivatives) سان تعلق رکي ٿي:

(الف) نامياتي ڪيميا (ب) غير نامياتي ڪيميا

(ج) حياتياتي ڪيميا (د) طبعي ڪيميا

2. Alkanes جو عام فارمولو آهي:

(الف) C_nH_{2n} (ب) C_nH_{2n+1} (ج) C_nH_{2n+2} (د) C_nH_{2n-2}

3. هيٺين مان ڪهڙو Alcohol آهي:

(الف) CH_3CHO (ب) $C_2H_5-O-CH_3$

(ج) CH_3OH (د) $CH_2=CH_2$

4. هيٺين مان ڪهڙو Unsaturated هائڊروڪاربان آهي:

(الف) $CH_3-CH=CH_2$ (ب) $CH_3-CH_2-CH_3$

(ج) $CH_3-C\equiv CH$ (د) $CH_2=CH-C\equiv CH$

5. "Hept" جو "Prefix" ڪيترن ڪاربان ائٽمن لاءِ آهي:

(الف) 2 (ب) 5 (ج) 7 (د) 9

6. $COOH$ - عمل وارو گروپ ڪنهن جو آهي:

(الف) Alkynes (ب) Alcohols (ج) Ethers (د) Carboxylic acids

7. Polyethene ڇا آهي:

(الف) تيل (ب) پيپر (ج) پلاسٽڪ (د) کاڌ

8. Acetic Acid ڪنهن ۾ آهي:

(الف) ڪيلي ۾ (ب) ڪچين ۾ (ج) ٿور ۾ (د) سِرڪي ۾

9. Alkenes :

(الف) ساڳيو عام فارمولو Alkyne جهڙو رکن ٿا.

(ب) ڪاربان ڪاربان ائٽمن ۾ ٽيڻو باند ٿيندو آهي.

(ج) ڪاربان ڪاربان ائٽمن ۾ ٻيڻو باند ٿيندو آهي.

(د) Saturated آهن.

10. CH_3-CH_2 ڪهڙو ريڊيڪل آهي:

(الف) Methyl (ب) Ethyl (ج) n-Propyl (د) Isopropyl

ڀاڱو (ب): مختصر سوال

- (i) اهم قوت واري (Vital force) نظريي کي بيان ڪريو.
- (ii) ٻڌايو ته پيٽروليم (Petroleum) نامياتي مرڪبن جو ذريعو ڪهڙي طرح آهي.
- (iii) عمل واري گروپ جي وصف لکو.
- (iv) مثال ڏئي Alkyl ريڊيڪل جي وصف لکو.
- (v) هم شڪلي سيريز ڇا آهي؟ عام هم شڪلي سلسلي جا نالا لکو.
- (vi) هيٺين مرڪبن ۾ عمل وارا گروپ سڃاڻو:

(a) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$	(b) CH_3COOH	(c) $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$
(d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	(e) CH_3CHO	
- (vii) Pentane ۽ Octane جو ڳنڍيل ۽ بناوٽي فارمولو لکو.
- (viii) ڪيٽينيشن (Catenation) ڇا آهي؟ مثال سان سمجهايو.

ڀاڱو (ج): تفصيلي سوال

- (i) نامياتي مرڪبن جون عام خاصيتون ٻڌايو؟
- (ii) سيچوريتڊ (Saturated) ۽ انسِيچوريتڊ هائڊرو ڪاربان (Unsaturated Hydrocarbon) ۾ فرق لکو؟
- (iii) نامياتي مرڪبن جا اهم ذريعا ڪهڙا آهن؟ تفصيل سان لکو.
- (iv) نامياتي مرڪبن جي استعمال کي بيان ڪريو.
- (v) هيٺين الڪين (Alkene) ۽ الڪائينس (Alkynes) جا نالا لکو.

$$\text{C}_6\text{H}_{10}, \text{C}_7\text{H}_{12}, \text{C}_8\text{H}_{16}, \text{C}_5\text{H}_8, \text{C}_6\text{H}_{12}, \text{C}_3\text{H}_6, \text{C}_3\text{H}_4, \text{C}_2\text{H}_4$$
- (vi) نومنڪليچر ڇا آهي؟ Alkynes جي IUPAC ضابطن جي باري ۾ لکو.
- (vii) نامياتي مرڪبن جي گهڻائي (Diversity) جي باري ۾ تفصيل سان لکو.



حياتياتي ڪيميا

باب 4

وقت جي ورهاست

11 = تدریسی پیریڈ
02 = تشخیصی پیریڈ
11% = سلیبس ۾ حصو

اهم تصورات:

4.1	ڪاربوھائيڊريٽس (Carbohydrates)
4.2	پروٽين (Protein)
4.3	ليپڊس (Lipids)
4.4	نيوڪليڪ ايسڊس (Nucleic Acids)
4.5	وٽامنس (Vitamins)

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (Student Learning Outcomes)

هن باب لکڻ کان پوءِ شاگرد:

- ڪاربوھائيڊريٽس جي بناوٽ جي وضاحت ڪري سگھندا.
- Di, Mono ۽ Trisaccharides ۾ فرق ڪري سگھندا.
- پروٽين جي سالمن ۾ بانڊنگ جي وضاحت ڪري سگھندا.
- ڪاربوھائيڊريٽس، پروٽين ۽ ليپڊ جي ذريعن ۽ استعمالن جي وضاحت ڪري سگھندا.
- چرٻي (Fats) ۽ تيل (Oil) ۾ فرق ڪري سگھندا.
- Nucleic Acids جي قسمن (DNA ۽ RNA) جي وضاحت ڪري سگھندا.
- وٽامنس (Vitamins) ۽ انهن جي اهميت جي وضاحت ڪري سگھندا.

تعارف

لفظ Biochemistry (ڪيميا + حياتي = Bio = Chemistry) جي معنيٰ حياتي جي ڪيميا آهي. ڪيميا جي هيءَ شاخ ڪيميائي ۽ طبعي عملن (Processes) جي مطالعي سان تعلق رکي ٿي، جنهن ۾ ڪيميائي مرڪب جهڙوڪ ڪاربوهايڊريٽ، وٽامن، پروٽين، ليپڊس ۽ نيو ڪليڪ ايسڊ شامل آهن. اها ٻڌائي ٿي ته اسان جي جيوگهرڙن (Cell) جي اندر ڇا ٿي رهيو آهي ۽ اهو پڻ ٻڌائي ٿي ته Cells هڪ ٻئي سان ڪيئن رابطو رکن ٿا. اهڙيءَ طرح بائيو ڪيمسٽري جي هن ريت تعريف ڪري سگهجي ٿي، ”ڪيميا جي اها شاخ جيڪا ڪيميائي مادن ۽ عملن جي مطالعي سان تعلق رکي جيڪي جاندارن (ٻوٽن ۽ جانورن) ۾ ٿين ٿا، ان کي بايو ڪيمسٽري چئبو آهي.“

بايو ڪيمسٽري جي تاريخ قديم يونانين مان پڻ سمجهي سگهجي ٿي. بهرحال، بايو ڪيمسٽري کي 19 صدي عيسويءَ کان ٿورو اڳ هڪ مخصوص موضوع جي طور تي قبول ڪيو ويو. پهريون ڀيرو بايو ڪيمسٽري لفظ 1903ع ۾ هڪ جرمن ڪيمسٽ ڪارل نيوبرگ استعمال ڪيو.

ڇا توهان کي خبر آهي؟



کاڌو ڌرتيءَ تي زندگي لاءِ ضروري آهي ۽ اهو ڪيميائي مادن جو هڪ پيچيده مرڪب آهي. کاڌو جسم ۾ پيچ ڍاهه (Metabolic) عمل ڪرائيندو آهي. جاندارن ۾ ڪجهه پيچيده نامياتي سالما توانائي مهيا ڪرڻ لاءِ سادن مرڪبن ۾ ٽٽي ويندا آهن (Catabolism). جڏهن ته ٻيا توانائي کي ذخيرو ڪرڻ لاءِ پيچيده نامياتي مرڪبن ۾ تبديل ٿي ويندا آهن (Anabolism)، جهڙوڪ اسٽارچ ۽ گلائڪوجن. ٻئي حياتيات ۽ ڪيمسٽري انهن مخالف عملن کي ضابطي ۾ رکن ٿا. اهڙيءَ طرح هڪ نئين سائنس جو جنم ٿيو، جنهن کي بايو ڪيمسٽري (حياتياتي ڪيميا) سڏيو ويندو آهي.

4.1 ڪاربوهايڊريٽس (Carbohydrates)

ڪاربوهايڊريٽ قدرتي طور تي موجود نامياتي مرڪبات آهن ۽ اسان جي کاڌي جو اهم حصو آهن. عام طور تي اهي مرڪب عناصر جهڙوڪ ڪاربن، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن تي مشتمل هوندا آهن. گهڻو قدر ڪاربوهايڊريٽ عام فارمولا $C_x(H_2O)_y$ جي نمائندگي ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته انهن مرڪبن ۾ هائيڊروجن ۽ آڪسيجن H_2O ماليڪيول واري تناسب ۾ هوندا آهن. جڏهن ته حقيقت ۾ انهن مرڪبن ۾ پاڻي جا ماليڪيول نه هوندا آهن. بناوت (Structure) جي تجزيي مان ظاهر ٿئي ٿو ته اهي مرڪبات Aldehyde گروپ $(-CHO)$ ، Ketone گروپ $(>C=O)$ ۽ Alcoholic hydroxyl گروپ $(-OH)$ تي مشتمل هوندا آهن. اهڙيءَ طرح ڪاربوهايڊريٽ جي هن ريت تعريف ڪئي وئي آهي، ”Polyhydroxide aldehyde يا Polyhydroxide ketone يا ٻيا وڏا سالما جيڪي Hydrolysis تي اهڙا مرڪب پيدا ڪن تن کي ڪاربوهايڊريٽ چئبو آهي.“ ڪاربوهايڊريٽ جن ۾ Aldehyde گروپ هوندو آهي انهن کي عام طور تي Aldose چئبو آهي ۽ جن ۾ Ketone گروپ هوندو آهي انهن کي Ketose چيو ويندو آهي.



ڪاربوهايڊريٽ جي اڪثريت ذاتقي ۾ مني هوندي آهي ان ڪري انهن کي Saccharides (لاطيني، Saccharum = Sugar) به سڏيو ويندو آهي. ڪاربوهايڊريٽ ۾ روشني جي قطب رخي سطح (Plane Polarized) کي گهمائڻ جي صلاحيت هوندي آهي.

ڇا توهان کي خبر آهي؟




اهي ڪاربوهايڊريٽ جيڪي روشني جي قطب رخي سطح (Plane Polarized) کي گهڙي وار (Clockwise) گهمائڻ ٿا، تن کي ساڄي ڦيري (Dextrorotatory) وارا (نشاني D يا +) چئبو آهي، جڏهن ته جيڪي مخالف گهڙي وار (Anticlockwise) گهمندا آهن، تن کي کاٻي ڦيري (Levorotatory) وارا (نشاني L يا -) چئبو آهي.

ڪاربوهايڊريٽ جي درجہ بندي


ڪاربوهايڊريٽ جا Hydrolysis جي بنياد تي ٽي قسم آهن:

4.1.1 مونو سيڪرائيڊس (Monosaccharides) (يوناني Mono = one)

انهن کي Simple sugar به چئبو آهي. اهي ڪاربوهايڊريٽ Hydrolysis تي وڌيڪ ننڍن ايڪن ۾ ٺاهن ٿيندا. Monosaccharides ۾ 3 کان 10 ڪاربان ايٽم هوندا آهن ۽ ڪاربان جي تعداد جي بنياد تي انهن کي Trioses, Tetroses, Pentoses hexoses وغيره ۾ ورهائي سگهجي ٿو. گلوڪوز (انگور جي ڪنڊ) جو تعلق Aldose سان آهي ۽ Fructose (ماڪي) Ketose سان تعلق رکي ٿو ۽ اهي مونوسڪرائڊز جا مثال آهن.



گلوڪوز قدرتي طور تي ساڄي ڦيرواري (Dextrorotatory) طور تي حاصل ڪيو ويندو آهي ۽ تمام لذيق مني کاڌي ۾ موجود هوندو آهي، جهڙوڪ انگور ۾ (20-30 سيڪڙو). اهو ماڪي ۾ پڻ ملي سگهي ٿو. اهو گڏيل حالت ۾ ڪمند، سيلولوز ۽ نشاستي ۾ ملي سگهي ٿو. Photosynthesis هڪ عمل آهي جيڪو ٻڌائي ٿو ته ٻوٽا گلوڪوز ڪيئن ٺاهيندا آهن. گلوڪوز تڏهن ٺهي ٿو جڏهن ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ سج جي روشني ۽ ڪلوروفل عمل انگيز جي موجودگيءَ ۾ پاڻيءَ سان ردعمل ڪري ٿي. ٻوٽا پڻ نشاستي ۽ سيلولوز ٺاهڻ لاءِ گلوڪوز استعمال ڪن ٿا. گلوڪوز انساني رت جو هڪ اهم جز آهي، ان کي رت جي شگر پڻ سڏيو ويندو آهي. رت ۾ گلوڪوز جي عام حد 65-110 ملي گرام (0.06%-0.1%) في 100 ml آهي. گلوڪوز کي عام طور تي مريضن لاءِ توانائي جو ترز ذريعو سمجهيو ويندو آهي. Fructose (لاطيني Fructus = fruit) پڪل ميون، ماڪي، ڪنڊ وغيره ۾ موجود هوندو آهي.




اھو Aldose Sugar آھي

اھو Ketose Sugar آھي

مونوسڪرائڊز نهرا قلمر (Crystals)، ذائقي ۾ مٺا ۽ پاڻيءَ ۾ حل ٿيڻ جهڙا آهن.

4.1.2 اوليگوسڪرائڊس (Oligosaccharides) (يوناني Oligo = few)


اھي ڪاربوهائيڊريٽ Hydrolysis تي 2 کان 10 مونوسڪرائڊس پيدا ڪن ٿا. Oligosaccharides جن ۾ ٻه مونوسڪرائڊ هوندا آهن انھن کي Disaccharides چئبو آھي ۽ جن ۾ ٽي هوندا آهن انھن کي Trisaccharides چئبو آھي.



اوليگو سيڪرائيڊس ۾ Monosaccharides هڪ ٻئي سان / glycosidic linkage bond ذريعي ڳنڍيل هوندا آهن. Sucrose, Maltose, Lactose وغيره Oligosaccharides جا اهم رڪن آهن. Monosaccharides وانگر، Oligosaccharides به نهرا قلمر، ذائقي ۾ مٺا ۽ پاڻيءَ ۾ حل ٿيندا آهن.

4.1.3 پوليسڪرائڊس (Polysaccharides) (يوناني Poly = many)

اھي ڪاربوهائيڊريٽ Hydrolysis تي ڏھ کان وڌيڪ مونو سيڪرائڊس ٺاھن ٿا. انھن کي Polymeric ڪاربوهائيڊريٽ پڻ سڏيو ويندو آھي. انھن ڪاربوهائيڊريٽ ۾ مونوسڪرائڊس Glycosidic linkage ذريعي ڳنڍيل هوندا آهن.



سيلولوز (Cellulose)، نشاستو (Starch) (ٻوٽن ۾)، گلائڪوجن (Glycogen) (جانورن ۾)، امائلوز (Amylose) وغيره عام پولي سيڪرائڊز آهن. سيلولوز ٻوٽي جي



Cell wall، ڪاٺ، ڪپڙي، ڪاغذ، ڪپھ وغيره ۾ ملندو آھي. ڪپھ ۾ 95 سيڪڙو سيلولوز هوندو آھي. نشاستو اناج ۾ ٿئي ٿو، جھڙوڪ: ڪڻڪ، چانور پٽاٽي يا آلو جي پاڙن ۾. وغيره گلائڪوجن کي جانورن جو نشاستو (Animal Starch) بہ سڏيو وڃي ٿو، جيڪو جانورن جي جگر ۾ ملي ٿو.

مونوسڪرائڊس ۽ اوليگوسڪرائڊس جي برعڪس، پولي سيڪرائڊس غير قلمي نھرا (Amorphous)، بي ذائقا ۽ پاڻي ۾ گھلڻ جھڙا ناھن ھوندا.

4.1.4 کاربوھائيڊريٽ جا ذريعا ۽ استعمال

ڪاربوھائيڊريٽ اھم غذائي عنصر آھن ۽ مختلف ذريعن جھڙوڪ: ميوا، ڀاڄيون ۽ کير جي شين مان حاصل ڪيا ويندا آھن.

جدول 4.1 کاربوھائيڊريٽ ۽ انھن جا ذريعا

ذريعا	ڪاربوھائيڊريٽس (Carbohydrates)
انگور، ماڳي، زيتون، گڙ وغيره	مونوسڪرائڊس (Monosaccharides)
	گلوڪوز (Glucose)
	فركٽوز (Fructose)
ڪمند، گجر	اوليگوسڪرائڊس (Oligosaccharides)
انناس، مڀيل وغيره	سڪروز (Sucrose)
کير	ليڪٽوز (Lactose)
ڪڻڪ، جو وغيره	مالتوز (Maltose)
ڀاڄيون	رiffinوز (Raffinose)
سڀني ٻوٽن جي Cell wall ۾، ڪپھ، اناج، پٽاٽو/آلو، ڀاڄيون	پولي سڪرائڊ (Polysaccharides)
جڙي ڀاڄيون، جيرو مشڪون	سيلولوز (Cellulose)
	نشاستو (Starch)
	گلائڪوجن (Glycogen)



شڪل 4.1 کاربوھائيڊريٽ جا ذريعا

ڇا توهان کي خبر آھي؟



انسولين (Insulin) هڪ ھارمون (Hormone) آھي جيڪو اسان جي جسم ۾ توانائي جي پيداوار لاءِ گلائڪوجن (جمع ٿيل غذا) مان حاصل ڪيل گلوڪوز کي استعمال ڪرڻ جي قابل بڻائي ٿو. جيڪڏھن جسم ۾ انسولين جي کوٽ ھجي تہ رت ۾ گلوڪوز جي مقدار وڌي ويندي آھي جيڪا شڪر/ ذیابیطس (Diabetes) جو سبب بڻجي ٿي.

ڪاربوهايڊريٽ جا استعمال

1. اهي ٻوٽن ۽ جانورن ٻنهي جي بقا لاءِ گهربل آهن.
2. اهي ٻوٽي جي جوڙجڪ کي برقرار رکندا آهن.
3. ڪاربوهايڊريٽ، ٻوٽن ۾ نشاستي (Starch) جي صورت ۾ ۽ جانورن ۾ Glycogen جي صورت ۾، توانائي جو ذخيرو آهن.
4. اهي اسان جي رت جي Sugar level کي ضابطي ۾ رکندا آهن.
5. سڪروز (Sucrose) هڪ اضافي کاڌو (Food Additive) آهي. اهو مٺين شين ۾، ڄميل کير ۾، کنڊ ۾، ميون ۾، جيم ۾، جيلي ۾ ۽ ٻين شين مان ملي ٿو.
6. ڪاربوهايڊريٽ فائبر ڪوليسترول جي گهٽتائي ۽ بلڊ پريشر جي ضابطي ۾ مدد ڪري ٿو.
7. ڪاربوهايڊريٽ مختلف قسم جي پروٽين ۽ ليپيڊس سان گڏ حياتياتي سرشتي ۾ موجود آهن.
8. سيلولوز کاڌو مهيا ڪن ٿا. اهي وڏا ۽ فائبر وانگر ٿيندا آهن. اهي آندڻ جي حرڪت (Peristalsis) کي آسان ڪن ٿا.
9. سيلولوز مختلف صنعتن ۾ خام مال بشمول ڪپڙي ۽ کاغذ جي صنعت ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.
10. نشاستي کي Coating ۽ Sizing عمل ذريعي کاغذ تي لکڻ جي خاصيتن کي بهتر ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
11. نشاستو Alcohol جي پيداوار ۽ ڪپڙن ڌوئڻ ۾ استعمال ٿئي ٿو.

آزمائشي سوال



1. ڪاربوهايڊريٽ ڇا آهي؟
2. مونوسڪرائڊ ۽ اوليگو سڪرائڊ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟


4.2 پروٽين (Protein)

لفظ پروٽين يوناني لفظ Proteios مان ورتو ويو آهي، جنهن جو مطلب آهي ”پهريون“. اهي Nitrogen رکندڙ وڏا سالما آهن جيڪي جاندارن جي سڀني جيوگهرڙن (Cells) ۾ ملندا آهن. جاندار مادي جي بناوت ۽ ڪم ۾ پروٽين کي مرڪزي حيثيت حاصل آهي. اهي ڪاربان (C)، هائيڊروجن (H)، نائٽروجن (N)، آڪسيجن (O) ۽ تمام گهٽ سلفر (S) ۽ فاسفورس (P) تي مشتمل هوندا آهن. پروٽين جي وضاحت هن ريت ڪئي وئي آهي: ”سوين امينو ايسڊ گڏجي جڏهن هڪ وڏو سالمو (Polymer) ٺاهن ٿا ان کي پروٽين چئبو آهي.“




4.2.1 امينو ايسڊ (Amino acid) مونومر (Monomer) يا پروٽين کي ٺاهيندڙ جي طور تي:

امينو ايسڊ پروٽين جا ٺاهيندڙ آهن. اهي ٻه عمل وارا گروپ رکندڙ مرڪب آهن، اهي اساسي امينو (-NH₂) ۽ تيزابي Carboxyl (-COOH) گروپن تي مشتمل آهن. 20 کان وڌيڪ امينو ايسڊ قدرت ۾ ملن ٿا. جن مان ڏهه ضروري آهن ۽ باقي ڏهه غير ضروري. اسان جو جسم صرف ڏهه غير ضروري امينو ايسڊ کي ٺاهي سگهي ٿو. امينو ايسڊ لاءِ عام فارمولا آهي:



هتي 'R' کاربان ايٽم جو سلسلو يا Chain آهي. امينو ايسڊ جي Condensation عمل دوران، هڪ امينو ايسڊ جو -OH (Carboxyl گروپ مان) ۽ ٻئي امينو ايسڊ جو H (امينو گروپ مان) پاڻ ۾ ملي (H₂O) جي طور تي خارج ٿين ٿا. اهڙيءَ طرح ٻن امينو ايسڊ ايڪن (Units) جي وچ ۾ هڪ نئون باند پيدا ٿئي ٿو، جنهن کي پيپٽائيڊ (Peptide) لنڪيج / باند چيو وڃي ٿو. ان لنڪيج / باند جي ڪري پروٽين ٺهي ٿو.



هڪ پروٽين ۾ 60 کان 6000 امينو ايسڊ سالما موجود هوندا آهن. هڪڙو پروٽين جو سالما ٻن امينو ايسڊس سان ٺهي ٿو، جنهن کي Dipeptide چئبو آهي، تن لاءِ Tripeptide وغيره. عام طور تي پروٽين جو سالما مايو 43000 کان 50,000,000 Daltons تائين هوندو آهي. (1 dalton = 1 amu)

4.2.3 پروٽين جا ذريعا ۽ استعمال


پروٽين جا اهم ذريعا بيضا، گوشت، دال، خوردني بچ، پاڇيون، مٽر، پنير وغيره آهن.

پروٽين جو استعمال:

1. جانورن جي پروٽين گوشت، ڪڪڙ، مڇي ۽ بيضن ۾ ملي سگهي ٿي. انسان انهن کي کاڌ خوراڪ طور استعمال ڪري ٿو ڇاڪاڻ ته اهي پروٽوپلازم (Protoplasm) جي پيداوار لاءِ گهربل آهن.
2. اينزائمز (Enzymes) پروٽين آهن جيڪي جاندارن ۾ ٺهندا آهن، اهي اسان جي جسم ۾ ڪيميائي عمل کي متحرڪ ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا. اهي انتهائي مخصوص



- ۽ انتهائي ڪارگر آهن. ڪيترائي اينزائمز دواسازي ۾ استعمال ٿيندا آهن. اهي رت جي ڪينسر جو علاج ڪن ٿا ۽ رت جي وهڪري کي به گهٽ ڪن ٿا.
3. اهي چمڙي ٺاهڻ جي عمل ۾ استعمال ٿيندا آهن. چمڙو ٻين شين ۾ جهڙوڪ بوت، ڪوٽ ۽ راندين جي سامان کي ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
4. هڏا پروٽين سان مالا مال آهن. جڏهن هڏا پڇايا ويندا آهن، جليٽين (Gelatin) پيدا ٿيندي آهي. بيڪري وارو سامان جليٽين سان ٺهندو آهي.
5. بوٽا کاڌي جي شين طور پروٽين ٺاهيندا آهن. جهڙوڪ دال، مٿر ۽ پاڇيون.



شڪل 4.2 پروٽين جا ذريعا

4.3 ليپڊس (Lipids)

قدرتي طور تي پيدا ٿيندڙ Heterogeneous نامياتي مرڪبات جو هڪ گروپ جنهن ۾ تيل، ميٽ وغيره شامل آهن، اهي پاڻي ۾ حل ناهن ٿيندا، مطلب هائيڊرو فوبڪ (Hydrophobic) (پاڻيءَ کان پڇڻ وارو) آهن پر اهي Ether) Bloors reagent ۽ Alcohol جي ملاوٽ 2:1 جي تناسب ۾ آسانيءَ سان حل ٿيندڙ آهن ۽ پڻ نامياتي محلل



شڪل 4.3 لپڊس جا ذريعا

(Solvent) جهڙوڪ، Ether، Carbon tetrachloride، Benzene، Acetone ۽ Chloroform وغيره ۾ حل ٿيندا آهن. عام طور تي لپڊس عنصرن جهڙوڪ ڪاربن، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن تي مشتمل هوندا آهن، پر ڪي لپڊس اهڙا به هوندا آهن جن ۾ نائٽروجن ۽ فاسفورس پڻ موجود هوندا آهن. لپڊس جيوگهرڙن جا ٺاهيندڙ پڻ آهن.

ڇا توهان کي خبر آهي؟ 

پاڇين واري تيل (Oil) کي Saturated fat (گيهه) ۾ ڪيئن تبديل ڪجي ٿو؟ هن ڪيميائي عمل کي هائيڊروجن (Hydrogenation) چئجي ٿو جنهن ۾ پاڇين واري تيل کي سالمي هائيڊروجن (H_2) سان عمل انگيز (Catalyst) نڪل (Ni) يا پيليڊيم (Pd) جي موجودگي ۾ ردعمل ڪرايو ويندو آهي. اهڙيءَ طرح چربي يعني (گيهه) تيار ٿيندو آهي.

4.3.1 فيٽي ايسڊس (Fatty Acids)

فيٽي ايسڊس لپڊس جا تعميراتي جُز آهن. اهي ڪاربو آڪسيلڪ ايسڊ آهن جن سان هڪ ڊگهي ڪاربان جي (Saturated يا Unsaturated) Chain هوندي آهي. مثال طور:



معدني ايسڊ (Mineral acids) جي موجودگي ۾ اهي ايسڊ Glycerol سان گڏجي Ester (تيل يا چربي) ٺاهن ٿا. **جدول 4.2 چربي ۽ تيل ۾ فرق**

تيل (Oil)	چربي (Fats)
1. اهي عام گرمي پد تي پٽڙو آهن.	1. اهي عام گرمي پد تي نهرا آهن.
2. اهي گهڻو قدر پوٽن مان ملن ٿا.	2. اهي گهڻو قدر جانورن مان ملن ٿا.
3. اهي Unsaturated مرڪب آهن.	3. اهي Saturated مرڪب آهن.
4. انهن جو رجڻ پد گهٽ هوندو آهي.	4. انهن جو رجڻ پد وڌيڪ هوندو آهي.
5. اهي Cholesterol جي مقدار کي برقرار رکڻ ٿا.	5. اهي جسم ۾ ڪوليسترول جي مقدار کي وڌائين ٿا.

4.3.2 لپڊس جا ذريعا ۽ استعمال

لپڊس جا ذريعا:

جانور:

سامونڊي جانور جهڙوڪ، سلمون (Salmon) ۽ وهيل (Whale) لپڊس جا ججهڙا ذريعا آهن. مڪڻ، گيهه، پٺير جانورن مان حاصل ٿيندا آهن، انهن ۾ لپڊس هوندا آهن.



ٻوٽا:

سورج مکهي، ناريل، بچ، سنگ، کپھ جو بچ، زيتون وغيره لپڊس جا اهم ذريعا آهن.
لپڊس جو استعمال:

1. اهي جسم ۾ فيٽي ايسڊز ۽ چرٻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن (وٽامن A, D, E ۽ K) جي ٽرانسپورٽر طور ڪم ڪن ٿا.
2. ڪجهه لپڊ جسم ۾ Cholesterol جي Level کي گهٽ ڪن ٿا.
3. Oil ۽ Fat کاڌي کي پڄائڻ ۽ ترڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن.
4. Oil ۽ Fat صابن، صرف، ڪاسميٽڪ، پالش ۽ رنگن ۾ استعمال ٿيندا آهن.
5. اهي انزائمز کي چست ڪندا آهن.
6. جانورن واري چرٻي (Animal fat) تاندورن جي جيو گهرڙن (Adipose tissue cells) ۾ ملن ٿا. جانور کير ڏيندا آهن جنهن مان مکڻ ۽ گيهه ٺهندو آهي. مکڻ ۽ گيهه کاڌو پڄائڻ ۽ ترڻ، بيڪري جون شيون ۽ مٺايون تيار ڪرڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا.

4.4 نيوڪليڪ ايسڊس (Nucleic Acids)

نالي نيوڪليڪ ايسڊ مان مراد آهي ته اهي عام طور تي Cells جي Nucleus ۾ ٿيندا آهن. پر ڪي نيوڪليڪ ايسڊس Cytoplasm ۾ پڻ موجود هوندا آهن. پروٽين وانگر، نيوڪليڪ ايسڊ بايوپوليمر آهن. اهي سڀني Biomolecules کان تمام اهم آهن ڇو ته اهي موروثي معلومات کي والدين کان ٻارن تائين ذخيرو ۽ منتقل ڪن ٿا. ايتري قدر جو جاندارن جو هڪ Fertilized egg cell مختلف عضون جهڙوڪ، دل، جگر، اکيون، گردو، هٿ، تنڱون، مٿو وغيره ٺاهڻ جي معلومات رکي ٿو، ان ۾ ڪاربن، هائيڊروجن، آڪسيجن، نائٽروجن ۽ گهٽ مقدار ۾ فاسفورس وغيره شامل آهن. نيوڪليڪ ايسڊ کي آسان لفظن ۾ هن ريت بيان ڪري سگهجي ٿو ته، ”وڏا سالما جيڪي نيوڪليوٽائڊس (مونومر) جي پوليمرائيزيشن سان ٺهندا آهن تن کي نيوڪليڪ ايسڊ چئبو آهي.“ هر Nucleotide هيٺين مرڪبن تي مشتمل هوندو آهي:


1. پينٽوز شوگر (Pentose Sugar)
2. فاسفيٽ گروپ (Phosphate Group)
3. نائٽروجن وارا اساس (Pyrimidines ۽ Purines)

4.4.1 نيوڪليڪ ايسڊ جا قسم

نيوڪليڪ ايسڊ جا ٻه قسم آهن. ٻنهي قسم جا نيوڪليڪ ايسڊ سڀني جانورن ۽ ٻوٽن ۾ موجود هوندا آهن.

ڊي آڪسيرايبو نيوڪليڪ ايسڊ (Deoxyribonucleic Acid – DNA)

ان ۾ Deoxyribose Sugar ملي ٿي. 1953ع ۾ F. Crick ۽ J. Watson




شکل 4.4 DNA جي بناوت

ان جي بناوت جي نشاندهي ڪئي. اهو ٻن زنجيرن وارو ٻيٽو اسٽرينڊ (Double strand) ماليڪيول آهي، جنهن جي ڊيگهه لڳ ڀڳ 2 کان 3 ميٽر آهي. ان جي هر Chain شوگر، فاسفيٽ ۽ هڪ اساس گروپ جي ٺهيل آهي. Chains جي بنياد شوگر ۽ فاسفيٽ گروپن مان ٺهيل آهي، ۽ ٻئي Chains اساس ذريعي جڙيل آهن. شکل 4.4 ڏيکاري ٿي ته ڪيئن chain هڪ ٻئي جي چوڌاري ٻيٽي هيلڪس (Helix) شڪل ۾ ويڙهيل آهن.

جيوگهڙي (Cell) جي مرڪز (Nucleus) ۾، ڊي اين اي جينيائي (Genetic) معلومات جو مستقل ذخيرو آهي. اهو Cell جي سڀني جينيائي معلومات کي ٽرانسپورٽ ۽ ذخيرو ڪري ٿو. اهو انهن هدايتن کي پهچائي ٿو ته ڪيئن ڪجهه پروٽين کي Amino acids مان هڪ نسل کان ٻي نسل تائين ٺاهيو وڃي. انهن هدايتن کي ”زندگي جو جينيائي ڪوڊ“ سڏيو ويندو آهي. اهي فيصلو ڪن ٿا ته هڪ Cell هڪ تنڻي گهڙو (Nerve cell) آهي يا هڪ Muscle cell، ۽ جيڪڏهن جاندار آهي ته پوءِ هڪ انسان، هڪ وڻ، يا ڪو جانور آهي. نون Cells ۾ پروٽين جي ٺهڻ جو اندازو ڊي اين اي ۾ نائٽروجن واري اساس جي ترتيب سان لڳايو ويندو آهي. ڊي اين اي جي ڊبل هيلڪس جي اڏاوت جو مقصد اهو آهي ته ان ڳالهه کي يقيني بڻايو وڃي ته اتي ڪابه بي ترتيبي نه آهي. ڊي اين اي ۾ جينز (Genes) شامل هوندا آهن جيڪي RNA جي پيداوار کي منظم ڪن ٿا. Gene ۾ غلطيون غلط آر اين اي پيدا ٿيڻ جو سبب بڻجن ٿيون. جنهن سان اهو ناقص پروٽين ٺاهڻ ٿا جيڪي صحيح ڪم نه ڪندا آهن جينيائي خرابيون هن بيماري جو سبب آهن.

رائبونيڪيڪ ايسڊ (Ribonucleic Acid – RNA)



شکل 4.5 RNA جي بناوت

اهو Ribose sugar مان ٺهيل آهي. اهو هڪ ماليڪيول آهي جنهن ۾ صرف هڪ تار (Strand) آهي. اهو جينيائي معلومات کي Cell ۾ استعمال ڪرائي پروٽين ٺاهڻ واري عمل جو نگران هوندو آهي. ان جو ڪم به پيغام پهچائيندڙ وانگر هوندو آهي. DNA جينيائي معلومات پهچائڻ لاءِ RNA ٺاهي ٿو. آر اين اي ڏانهن موڪليل معلومات حاصل ڪئي ويندي آهي، پوءِ اها معلومات پڙهي ۽ ڊيڪوڊ ڪري نوان پروٽين ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي. نتيجي طور، آر اين اي نئين پروٽين جي پيداوار جي رهنمائي ڪرڻ جو نگران سڏيو ويندو آهي.



4.4.2 نیوکلیک ایسڊ جي اهميت

1. نیوکلیک ایسڊ سڀ کان وڌيڪ ضروري آهي، اهو Cell کي ڪم ڪرائي ٿو.
2. نیوکلیک ایسڊ جينياتي معلومات جو ذخيرو آهن.
3. نیوکلیک ایسڊ ميوٽيشن (Mutation) لاءِ ڪم ڪري ٿو ته جيئن Cells ۽ جسم کي خطرناڪ بيمارين کان بچايو وڃي.
4. نیوکلیک ایسڊس موروثي خاصيتن کي هڪ نسل کان ٻي نسل ڏانهن منتقل ڪن ٿا.
5. نیوکلیک ایسڊز ATP جي صورت ۾ توانائي جو ذريعو آهن.

4.5 وٽامن (Vitamins)


هاپڪنز 1912ع ۾ دریافت ڪيو ته ڪاربوهايڊريٽ، پروٽين ۽ ليپڊس کان علاوه بهتر واڌ لاءِ ٻيا غذائي مواد پڻ گهربل آهن. ان حقيقت جي باوجود ته اهي مرڪبات صرف معمولي مقدار ۾ گهربل آهن پوءِ به انهن کي واڌ ويجهه لاءِ ضروري عنصر سمجهيو وڃي ٿو. انهن مرڪبن کي بعد ۾ وٽامن جو نالو Funk طرفان ڏنو ويو. هن وٽامن (Thiamin) B₁ دریافت ڪيو.

4.5.1 وٽامن جا قسم

گهڙ جي صلاحيت جي بنياد تي وٽامن جا ٻه قسم آهن.

1. پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن (Water soluble vitamins)

اهي وٽامن جيڪي پاڻيءَ ۾ حل ٿين ٿا انهن کي پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن چئبو آهي. اهي وٽامن اناج ۽ ميون مان حاصل ٿين ٿا. عام طور تي وٽامن B-complex ۽ وٽامن C پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن آهن. اهي وٽامن جسم ۾ جمع ناهن ٿيندا. جيڪڏهن اسان انهن وٽامن کي وڌ کان وڌ کائون، اهي اسان کي نقصان پهچائي نٿا سگهن. ان کان سواءِ، اهي اسان جي جسم مان آسانيءَ سان خارج ٿي ويندا آهن.



شڪل 4.7 وٽامن D جي گهٽتائي
سبب Rickets بيماري جو متاثر ٻار



شڪل 4.6 وٽامن B جي گهٽتائي
سبب Beriberi بيماري جو متاثر ٻار

2. چرٻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن (Fat soluble vitamins)

اهي وٽامن جيڪي چرٻيءَ ۾ يا نامياتي محلل ۾ حل ٿين ٿا انهن کي



(Fat soluble vitamins) چئجي ٿو. وٽامن E, D, A ۽ K چرپي ۾ حل ٿيندڙ وٽامنس آهن ۽ جسم ۾ گهڻي وقت تائين جمع ٿيل هوندا آهن. اهي وٽامن لڊس مان حاصل ٿين ٿا. جيڪڏهن اسان انهن وٽامن جي مقدار وڌيڪ کائون ته پوءِ اهي اسان کي نقصان پهچائي سگهن ٿا ۽ بيمارين جو سبب بڻجن ٿا. مثال طور وٽامن A جي زيادتي سبب جلن ۽ مٿي جو سور، وٽامن D جي ڪري Calcification ۽ هڏن ۾ سور، وٽامن E ٽڪاوت ۽ مٿي جو سور ۽ وٽامن K جگر ۽ گردن جي بيمارين جو سبب بڻجي ٿو.

جدول 4.3: وٽامن انهن جا ذريعا، اهميت ۽ گهٽتائي سبب بيماريون

نمبر	وٽامن	ذريعا	اهميت	گهٽتائي سبب بيماريون
1.	A	مڪڻ، مڇي، بيضا، کير، گجر وغيره. اهو پاڇين جي سائي ۽ پيلي رنگ واري حصي مان پڻ ملي ٿو.	اڪين جي نظر لاءِ، چمڙي لاءِ.	اونداهه ۾ ڏسڻ جي صلاحيت گهٽجي ٿي (Night Blindness)، اڪين مان ڳوڙها نڪرڻ بند ٿيو (Xerophthalmia) وڃن
2.	B-Complex	ڪڻڪ، چانور، بيضا، کير، گوشت، جيترو وغيره.	چمڙي ۽ ٽنٽي سرشتي لاءِ.	دل جي بيماري ۽ نسن جو سڃڻ (Beriberi)، چمڙي تي ڳاڙها داڳ (Dermatitis)، وار چڻي پوڻ، زبان ۾ سوڄ، چپن ۾ سوڄ، اڪين ۾ جلن وغيره.
3.	C (Ascorbic Acid)	نارنگي، ليمو، ٿمٽو، ساوا مڙج وغيره.	زخمن کي پري ٿو.	مسوڙن جي سوڄ ۽ زخمن کي کولي ٿو (Scurvy)
4.	D (Anthracite)	مڇي، کير، مڪڻ، ڪنڀيون ۽ سج جي روشني وغيره.	ڏندن، هڏن لاءِ.	ٻارن جي هڏن جو نرم ۽ ڪمزور ٿيڻ (Rickets)
5.	E	ٻوٽن جي تيل جهڙوڪ، ڪپهه جي بيج جو تيل، مڪئي جو تيل، سويابين جو تيل، ڪاڄن جو تيل وغيره.	جيوگهرڙي جي Membrane Maintain رکي ٿو.	سنڍپڻو (Sterility)، RNA ۾ خرابي (Hemolysis)
6.	K	سايڻ پاڇين ۾ جهڙوڪ، پالڪ وغيره ۾.	رت جي وهڪري کي روڪي ٿو (Blood clotting)	ڌڪ لڳڻ کان پوءِ رت جي وهڪري کي بند ٿيڻ ۾ گهڻو وقت لڳندو.

سماج، ٽيڪنالاجي ۽ سائنس

اينزائمز جو تجارتي استعمال

تجارتي بنيادن تي Enzymes مختلف قسم جي اطلاق لاءِ استعمال ڪيا ويا آهن. هيٺ ڏنل اينزائمز جا ڪجهه مثال آهن ۽ صنعت ۾ انهن جو استعمال بيان ٿيل آهي:

تجارتي طور تي ڳڙ ۽ نشاستي مان شراب (ايٿانول) ٺاهڻ لاءِ Yeast Enzymes استعمال ڪيا ويندا آهن. Diastase, Invertase ۽ Zymase پڻ ان ۾ استعمال ٿيندا آهن.

بٽرجنٽ ۾ پڻ مائڪروبيال اينزائمس شامل آهن. Lipases انزائمس Fat کي پاڻي ۾ حل ٿيندڙ سالمن ۾ ٽوڙيندا آهن. Amylase هڪ نشاستي جا داغ هٽائيندڙ آهي. Cellulase سيلولوز کي گلوڪوز ۾ ٽوڙي ٿو، جيڪو پاڻي ۾ حل ٿيندڙ مادو آهي. ڪپڙن تي پروٽين جا داغ Bacterial Protease ذريعي مٽايا ويندا آهن. نتيجي طور Enzymes تي ٻڌل بٽرجنٽ تمام داغ ۽ گندگي کي صاف ۽ ختم ڪن ٿا.

ميون جي رس کي Enzymes جي مدد سان صاف (Pure) ڪيو ويندو آهي. Enzymes ڪٽيل ميون ۾ استعمال ٿيندا آهن جهڙوڪ انگور وغيره. اهي ميون جي ذرات کي ختم ڪري رس جي مقدار وڌائين ٿا. اهي پڻ ميوي جي ڪل جي رنگ کي چٽو ڪن ٿا.


امايليز (Amylase) انزائيم روٽي (Bread) جي پيداوار ۾ استعمال ڪيا ويا آهن، اهي اتي ۾ نشاستي جو مقدار وڌائي Bread جي پيداوار وڌائين ٿا. جيتوڻيڪ اهي نشاستي کي کنڊ (گلوڪوز شربت) ۾ تبديل ڪرڻ جي قابل آهن انهن کي مٺي جي طور تي Cuisine ۽ Bakery ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.

اٽس ڪريم کي مٺو بڻائڻ لاءِ Lactase اينزائم استعمال ڪيو ويندو آهي. Lactose ڪير ۾ Galactose ۽ Glucose ۾ ٽٽي پوي ٿو، اهي ٻئي ليڪٽوز کان وڌيڪ مٺا آهن.

اينزائمس کي ڊيري جي شعبي ۾ پٺير، ڏهي ۽ ٻيون ڪير جون شيون ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. پيداوار جي بناوٽ يا ذائقي کي بهتر ڪرڻ لاءِ پڻ Enzymes استعمال ڪيا ويندا آهن.



تصوراتي خاڪو





خلاصو

- جاندار شين جو مطالعو يوناني دور کان شروع ٿيو. حياتياتي ڪيميا (Biochemistry) جو تعلق جاندارن ۾ ٿيندڙ ڪيميائي ردعمل جي مطالعي سان آهي.
- 1903ع ۾ ڪارل نيوبرگ پهريون ڀيرو بايوڪيمسٽري جو لفظ استعمال ڪيو. ڪاربوهائيڊريٽ ڪيترن ئي هائيڊروآڪزل گروپن (OH-) سان گڏ Aldehyde گروپ (-CHO) يا Ketone گروپ ($C=O$) تي مشتمل آهن.
- ڪاربوهائيڊريٽ لاءِ عام فارمولو $C_x(H_2O)_y$ آهي.
- الڊوزز (Aldoses)، ڪاربوهائيڊريٽ جو ميمبر، Aldehyde گروپ ۽ ڪيترن ئي OH- گروپن تي مشتمل آهي.
- Ketoses، ڪاربوهائيڊريٽ جو ميمبر، جنهن ۾ Ketone گروپ ۽ ڪيترائي OH- گروپ هوندا آهن.
- Hydrolysis جي بنياد تي ڪاربوهائيڊريٽ کي ٽن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي، Mono، Di ۽ Trisaccharides.
- ڪاربوهائيڊريٽ جيڪي Hydrolysis تي 1 کان 10 Monosaccharides ٺاهن تن کي Oligosaccharides سڏيو ويندو آهي.
- ڪاربوهائيڊريٽ جيڪي Hydrolysis تي 10 کان وڌيڪ Monosaccharides ٺاهن تن کي Polysaccharides سڏيو ويندو آهي.
- سيلولوز ۽ نشاستو عام ٻوٽي جا اصل Polysaccharides آهن.
- پروٽين امينو ايسڊ جا پوليمر آهن.
- پيپٽائڊ بانڊز ذريعي امينو ايسڊس هڪ ٻئي سان ملي پروٽين ٺاهيندا آهن.
- اينزائمز پروٽين آهن جيڪي حياتياتي ردعمل کي تيز ڪن ٿا. Enzymes کي Biocatalyst به سڏيو ويندو آهي.
- هيموگلوبن هڪ پروٽين آهي جيڪو آڪسيجن کي جسم جي مختلف حصن ڏانهن منتقل ڪري ٿو.
- چرٻي عام گرمي پد تي Solid ٿئي ٿي ۽ جسم ۾ ڪوليسٽرول جي Level کي وڌائي ٿي.
- نيوڪليڪ ايسڊز بايو موليڪيولز آهن جيڪي موروثي معلومات کي والدين کان ٻارن تائين محفوظ ۽ منتقل ڪن ٿا.
- نيوڪليوٽائڊس نيو ڪليڪ ايسڊ جا مونومر آهن.
- ڊي اين اي معلومات جو ذخيرو آهي. اهو جينياتي معلومات کي انڪوڊ ڪري ٿو ۽ ان کي نسل کان نسل تائين منتقل ڪري ٿو.
- آر اين اي، ڊي اين اي مان حاصل ڪيل معلومات کي ڊيڪوڊ ڪري ٿو، پڙهي ٿو ۽ استعمال ڪري ٿو.
- وٽامن بي ڪمپليڪس ۽ وٽامن سي پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن آهن. انهن وٽامن جي جسم ۾ اضافي نقصانڪار نه ٿي سگهي.
- چرٻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن A، D، E ۽ K جسم ۾ جمع ٿيندا آهن. جيڪڏهن انهن وٽامن جي مقدار وڌي وڃي ته جسم مختلف بيمارين کان متاثر ٿيندو آهي. جهڙوڪ، وٽامن اي ۾ جلن ۽ مٿي جو سور، وٽامن ڊي جي ڪري هڏن ۾ سور، وٽامن اي ٽڪ ۽ مٿي ۾ سور، وٽامن ڪي جگر ۽ بڪين جي بيماريون ڪن ٿا.



مشق

ڀاڱو (الف): گهڻا چونڊ سوال

1. گلوڪوز آهي:
(الف) وٽامن (ب) ڪاربوهايڊريٽ (ج) پروٽين (د) ليپڊ
2. وٽامن ڊي جي گهٽتائي سبب ٿئي ٿي:
(الف) بيري (ب) ريڪٽس (ج) خارش (د) رت جي وهڪري جي بيماري
3. هڪ جينيائي معلومات کي انڪوڊ ڪري ٿو:
(الف) R.N.A (ب) ڪوليسترول (ج) D.N.A (د) ڪوڊ نه
4. ڪاربوهايڊريٽ جن ۾ الڊي هائيڊ گروپ هوندو آهي انهن کي چئبو آهي:
(الف) سيڪرائڊس (ب) ڪيٽوزز (ج) پيٿوزز (د) الڊوزز
5. امينو ايسڊ جا ٺاهيندڙ آهن:
(الف) نيوڪليڪ ايسڊ (ب) پروٽين (ج) وٽامن (د) ليپڊ
6. هيٺين مان ڪهڙو هڪڙو ڀولي سيڪرائڊ آهي:
(الف) فرڪٽوز (ب) مالتوز (ج) نشاستو (د) ڪوڊ نه
7. ليڪٽوز (Lactose) آهي:
(الف) انگور جي ڪنڊ (ب) ماڪي جي ڪنڊ (ج) ڪير جي ڪنڊ (د) عام ڪنڊ
8. هڪ Peptide جي باري ۾ ڇا سچ آهي؟
(الف) اهو هڪ پروٽين آهي
(ب) اهو ڪاربو آگزيلڪ ايسڊ جو Anhydride آهي
(ج) اهو Amine جو هڪ Anhydride آهي
(د) اهو Polyamide آهي.
9. چرٻي نهري آهي:
(الف) عام ڪمري جي گرمي پد تي (ب) اعليٰ گرمي پد تي
(ج) 100°C کان وڌيڪ گرمي پد تي (د) 50°C کان وڌيڪ گرمي پد تي
10. ڪپهه ۾ سيلولوز آهي:
(الف) 30 سيڪڙو (ب) 65 سيڪڙو (ج) 85 سيڪڙو (د) 95 سيڪڙو

ڀاڱو (ب): مختصر سوال

1. پروٽين ڇا آهن؟
2. ڊي اين اي (Deoxyribose Nucleic Acid – DNA) جي اهميت کي بيان ڪريو.
3. چرٻي (Fat) ۽ تيل (Oil) جي وچ ۾ فرق کي بيان ڪريو.
4. ڀولي سيڪرائڊ ڇا آهي؟ ڀولي سيڪرائڊس مان مونوسايڪرائڊ ڪيئن تيار ٿين ٿا؟
5. ڀيٽائيد بانڊ ڇا آهي؟ اهو ڪيئن ٺهندو آهي؟ ۽ ڀٽ Dipeptides ۽ Tripeptides جي وضاحت ڪريو.
6. لڀڊس جي اهم استعمالن کي لکو؟
7. امينو ايسڊ ڇا آهن؟ ۽ انهن جي عام بناوٽ جي وضاحت بيان ڪريو؟
8. وٽامن D ڇا آهي؟ ان جا ذريعا ۽ اهميت لکو.
9. چرٻي ۾ حل پذير ۽ پاڻي ۾ حل پذير وٽامن ۾ فرق ڪريو؟

ڀاڱو (ج): تفصيلي سوال

1. ڪاربوهائيڊريٽ ڇا آهن؟ ڪاربوهائيڊريٽ جا ذريعا ۽ استعمال بيان ڪريو.
2. لڀڊس ڇا آهن؟ لڀڊس جا ذريعا ۽ استعمال لکو.
3. وٽامن ۽ ان جا قسم بيان ڪريو.
4. تفصيل سان RNA، Nucleic Acids ۽ DNA بيان ڪريو.
5. توهان اهو ڪيئن ثابت ڪري سگهو ٿا ته مختلف قسم جي وٽامن جي گهٽتائي انسانن ۾ بيماريون پيدا ڪري ٿي؟



ماحولياتي ڪيميا - I

وايو منڊل (Atmosphere)

باب 5

وقت جي ورهاست

تدريسي پيريد = 10
تشخيصي پيريد = 02
سليبس ۾ حصو = 10%

اهم تصورات:

- 5.1 وايو منڊل جي جوڙجڪ (Composition of Atmosphere)
- 5.2 وايو منڊل جي پرت يا تهه (Layers of Atmosphere)
- 5.3 آلودگي ڪندڙ مادا (Pollutants)
- 5.4 تيزابي مينهن ۽ ان جا اثر (Acid Rain and its effects)
- 5.5 اوزون جي گهٽتائي ۽ ان جا اثر (Ozone depletion and its effects)
- 5.6 Green House اثر

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (Student Learning Outcomes)

هن باب سکڻ کان پوءِ شاگرد:

- وايو منڊل جي وصف ڄاڻي سگهندا.
- وايو منڊل جي جوڙجڪ جي وضاحت ڪري سگهندا.
- اسٽريٽوسفيئر ۽ ٿروپوسفيئر ۾ فرق ڪري سگهندا.
- اسٽريٽوسفيئر ۽ ٿروپوسفيئر جي حصن (Component) کي ڄاڻي سگهندا.
- مکيه هوائي آلودگي ڪندڙ مادن جي وضاحت ڪري.
- اوزون جي تهڙ جي وضاحت ڪري سگهندا.
- تيزابي مينهن ۽ ان جي اثر جي وضاحت ڪري سگهندا.
- اوزون جي گهٽتائي ۽ ان جي اثر جي وضاحت ڪري سگهندا.
- گلوبل وارمنگ جي وضاحت ڪري سگهندا.

تعارف

قدرتي ماحول ۾ ٿيندڙ ڪيميائي ۽ حياتياتي واقعن جي سائنسي مطالعي کي ماحولياتي ڪيميا سڏيو ويندو آهي. ان ۾ ڪيميائي شين (Species) جو ٺهڻ، انهن جو ماحول ۾ گهٽڻ، ماحوليات سان تعامل، ۽ ان تي اثر (جهڙوڪ، هوا، مٽي ۽ پاڻي جي ماحول تي) انهي سان گڏ ماحول تي انساني ۽ حياتياتي سرگرمين جي اثر جو پڻ مطالعو ڪيو ويندو آهي. ماحولياتي ڪيمسٽري هڪ بين الاقوامي مضمون آهي، جنهن ۾ وايومنڊل (Atmosphere)، پاڻي ۽ مٽي شامل آهن. ماحولياتي ڪيميا تجزياتي (Analytical) ڪيميا تي منحصر آهي ۽ مطالعي جي ٻين شعبن سان پڻ ڳنڍيل آهي.


اهڙو مادو يا توانائي جيڪا قدرتي مقدار (Concentration) کان وڌيڪ هجي ۽ ماحول تي منفي اثر پيدا ڪري ان مادي کي آلودگي ڪندڙ (Pollutant) چئبو آهي ۽ ان رجحان کي آلودگي (Pollution) چئبو آهي. Pollutants ماحول تي نقصانڪار اثر پيدا ڪن ٿا، جنهن تي اسين هن باب ۾ تفصيل سان بحث ڪنداسين.

وايومنڊل (Atmosphere) ڇا آهي؟

زمين جي چوڌاري گئسن جي هڪ پرت / تھ آهي، جنهن کي وايومنڊل سڏيو ويندو آهي. اهو ڌرتيءَ کي وڏي چادر وانگر محفوظ رکندو آهي. اهو سج جي گرمي کي جذب ڪري ٿو ۽ گرمي کي وايومنڊل جي اندر رکي ٿو. جنهنڪري ڌرتيءَ گرم رهي ٿي. هي گئسن جو وڏو ڪمبل مختلف موسمن ۽ آب هوا ٺاهڻ ۾ پڻ مدد ڪري ٿو. اهي سڀ شيون زندگيءَ ۽ ڌرتيءَ جي ماحوليات لاءِ اهم آهن. وايومنڊل ڪنهن خاص جاءِ تي ختم نٿو ٿئي. ڌرتيءَ کان مٿان ڪا شيءِ جيتري مٿانهين هوندي، اوتري ئي سنهڙي ان جي چوڌاري وايومنڊل جي تھ ٿيندي، وايومنڊل ۽ خلا جي وچ ۾ ڪابه واضح سرحد ناهي هوندي.

5.1 وايومنڊل جي جوڙجڪ

وايومنڊل هوا آهي جنهن ۾ ٻوٽا ۽ جانور زندهه رهڻ لاءِ ساھ ڪڍن ٿا. اهو نائٽروجن (78%) ۽ آڪسيجن (21%) تي مشتمل آهي، جنهن ۾ ٿوري مقدار ۾ آرگن (0.93%)،




تصوير 5.1 وايومنڊل جي جوڙجڪ

ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ (0.03%)، پاڻيءَ جا بخارات ۽ ٻيون گئسون پڻ شامل آهن. نيون، هيليم، هائيڊروجن جهڙيون ڪيتريون ئي ٻيون گئسون آهن، جيڪي وايومنڊل جو حصو آهن (پر تمام گهٽ مقدار ۾). مٽي جا سنهڙا ڌڙا، بشمول مٽي، آتش فشاڻي خاڪو وغيره، وايومنڊل جا ننڍا حصا آهن. اهي ڪڪر ٺاهڻ ۾ اهم آهن.



5.2 وایومندل جي پرت / ته

ڌرتيءَ جو وایومندل پنج وڏين تنهن ۾ ورهايل آهي. انهن تنهن جي گرمي پد ۽ كثافت (Density) جي بنياد تي درجہ بندي ڪئي وئي آهي، زمين کان شروع ٿيندڙ وایومندل جون هيٺيون پرت آهن:



هتي اسان صرف ماحول جي ٻن تنهن تي بحث ڪنداسين.



تصوير 5.2 زمين جو وایو مندل

ٿروپوسفيئر (Troposphere): ٿروپوسفيئر ڌرتيءَ جي ماحول جي هيٺئين پرت آهي. اها ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان اٽڪل 12 ڪلوميٽرن جي سراسري اوچائي تائين پکڙيل آهي، جيتوڻيڪ ان جي اوچائي 9 کان 17 ڪلوميٽر (قطبن تي 9 ڪلوميٽر، خط استوا (Equator) تي 17 ڪلوميٽر) زمين جي مٿاڇري کان مختلف ٿيندي آهي. هي اها تهه آهي جتي اسان رهون ٿا ۽ ان جي اونچائي ايستائين آهي جتي جهاز گهڻو ڪري اڏامندا آهن. هن پرت ۾ موسم اسان جي روزاني زندگي کي متاثر ڪري ٿو. تقريباً 80 سيڪڙو وایومندل جو ماس ٿروپوسفيئر ۾ آهي.

اسٽريٽوسفيئر (Stratosphere): اها پرت ڌرتيءَ جي وایومندل جي ٻي هيٺئين پرت آهي. اها ٿروپوسفيئر جي مٿان آهي ۽ اها Tropopause جي ذريعي جدا ڪئي وئي آهي. هيءَ پرت 50 کان 55 ڪلوميٽرن جي اوچائي تي ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان تقريباً 12 ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي ٿروپوسفيئر جي چوٽيءَ کان پکڙيل آهي. هن پرت ۾ جيتري اوچائي هوندي آهي وایومندل اوترو گرم ٿيندو آهي.

ٿروپوسفيئر جي برعڪس اسٽريٽوسفيئر سڄي شعاعن کي جذب ڪندي اوزون (Ozone) پرت ذريعي گرمي حاصل ڪري ٿي. نتيجي طور، اها پرت گرم رهندي آهي، هن پرت ۾ ٿورا پاڻيءَ جا بخارات ۽ ٻيون شيون موجود هونديون آهن. موسمي ڦوڪڻا (Weather Balloons) اسٽريٽوسفيئر جي ويجهو تائين اڏامن ٿا.



ڇا توهان کي خبر آهي؟

توهان تروپوسفيئر ۾ جيترو مٿي ويندا، اهو ٿٽو ٿيندو ويندو. ڇاڪاڻ ته اونچائي تي هوا جو دٻاءُ سمنڊ جي سطح جي پيٽ ۾ گهٽ ٿيندو آهي. اهو ئي آهي اونچائي تي اهو گهٽ دٻاءُ جنهن جي ڪري جبل جي چوٽي تي گرمي پد سمنڊ جي سطح کان وڌيڪ ٿٽو ٿئي ٿو.

جدول: تروپوسفيئر ۽ اسٽريٽوسفيئر جي وچ ۾ فرق

اسٽريٽوسفيئر	تروپوسفيئر
1. اها تروپوسفيئر کان پوءِ وايومنڊل جي مٿئين تهه آهي.	1. اها زمين جي مٿاڇري تي سڀ کان هيٺئين تهه آهي.
2. اها سمنڊ جي سطح کان 50 ڪلوميٽرن جي اونچائي تائين آهي.	2. اها سمنڊ جي سطح کان تقريباً 11 ڪلوميٽر جي اونچائي تائين آهي.
3. تروپوسفيئر جي پيٽ ۾ ان جو وايومنڊل ۾ مايو 75% کان گهٽ آهي.	3. اها وايومنڊل جو لڳ ڀڳ 75% مايو ٺاهي ٿي.
4. گرمي پد اونچائي سان گڏ وڌي ٿو.	4. جيئن توهان هن تهه ۾ مٿي چڙهندا آهيو، گرمي پد مسلسل گهٽجي ويندو آهي. ان جو گرمي پد 15°C کان -56°C تائين آهي.
5. هتي اوزون جي موجودگي ڌرتيءَ کي الٽرا وائيلٽ شعاعن (UV rays) کان بچائي ٿي.	5. اوزون، جيڪا هن ڀرت ۾ ملي ٿي، هڪ آلودگي ڪندڙ گئس آهي.
6. اتي هوا جي حرڪت جو فقدان آهي.	6. هتي هوا ۾ تمام گهڻي حرڪت آهي ۽ ان ۾ فعال موسمي نظام آهي.
7. هن ۾ هوائي جهاز اڏائڻ جي اجازت ناهي هوندي.	7. لڳ ڀڳ سڀئي جهاز هن تهه مان گذرن ٿا.
8. انهن گئسن جو دٻاءُ اسٽريٽوسفيئر ۾ ڪافي گهٽ هوندو آهي.	8. گئسون جهڙوڪ CO_2 ، O_2 ۽ N_2 ۽ پاڻي جا بخارات هن تهه ۾ سڀ کان وڌيڪ اهم گئسون آهن.

آزمائشي سوال

1. وايومنڊل ڇا آهي؟
2. اسان جو وايومنڊل ڪهڙين گئسن مان ٺهيل آهي؟

5.3 آلودگي ڪندڙ مادا (Pollutants)

هڪ فضول ياردي مادو جيڪو هوا، پاڻي يا زمين کي آلوده ڪري ٿو ان کي آلودگي ڪندڙ مادن طور حوالو ڏنو ويو آهي. آلودگي جي شدت ٽن عنصرن جي ذريعي طئي ڪئي ويندي آهي: ان جو ڪيميائي قسم، مقدار ۽ تيون ان جو تسلسل. انساني سرگرميون آلودگي کي پيدا ڪن



ٿيون ۽ ان کي ماحول ۾ ڇڏين ٿيون. اها آلودگي ماحول (هوا، پاڻي ۽ مٽي) کي آلوده ڪري انساني زندگي کي خطري ۾ وجهي رهي آهي. آلودگي ڪندڙ (Pollutants) ڪيميائي مادا آهن جيڪي ماحول کي آلودو ڪن ٿا. فضائي آلودگي ڪندڙ (Air Pollutants) ماحول ۾ موجود خطرناڪ مرڪبات آهن. هوا ۾ موجود آلودگي موسم کي تبديل ڪري ٿي، جنهن سان انساني صحت تي هائيڪار اثر پون ٿا، ٻوٽن کي نقصان پهچائي ٿي ۽ اڏاوتن جي تباهي جو سبب پڻ بڻجي ٿي.

آلودگي ڪندڙ مادن جا قسم


آلودگي ڪندڙ مادن جا ست قسم آهن:

- فضائي / هوائي آلودگي ڪندڙ
- پاڻي جي آلودگي ڪندڙ
- مٽي آلودو ڪندڙ
- گرمي پد جي آلودگي ڪندڙ
- تابڪاري آلودگي ڪندڙ
- گوڙ ڪندڙ آلودگي
- روشني جي آلودگي ڪندڙ

پر هن باب ۾ اسان صرف هوائي آلودگي ڪندڙ (Air Pollutants) ۽ هوائي آلودگي تي بحث ڪنداسين.

5.3.1 هوائي آلودگي ڪندڙ مکيا مادا

هوائي آلودگي ڪندڙ ٻن قسمن جا آهن: پرائمري ۽ ثانوي (Secondary). فوسل فيول ۽ نامياتي مواد کي ساڙڻ سان پيدا ٿيندڙ نقصانڪار مادن کي پرائمري آلودگي جو حوالو ڏنو ويندو آهي. سلفر آڪسائيڊ (SO_2)، ڪاربن آڪسائيڊ (CO ۽ CO_2)، نائٽروجن آڪسائيڊس (خاص ڪري نائٽرڪ آڪسائيڊ NO)، هائيڊرو ڪاربن (CH_4)، امونيا (NH_3) ۽ فلورين جا مرڪبات پرائمري آهن. پرائمري آلودگي ڪندڙ مختلف عملن ذريعي



سيڪنڊري آلودگي ڪندڙ پيدا ڪن ٿا. سلفيورڪ ايسڊ (H_2SO_4)، ڪاربنڪ ايسڊ (H_2CO_3)، نائٽرڪ ايسڊ (HNO_3)، هائيڊروفلورڪ ايسڊ (HF)، اوزون O_3 ۽ پروڪسي ايسٽائل نائٽريٽ (PAN) سيڪنڊري جا مثال آهن.

تصوير 5.3 هوائي آلودگي ڪندڙ مکيه مادا




آلودگي ڪندڙ	ذريعا	ماحولياتي خطرا	انساني صحت جا خطرا
ڪاربن مونو آڪسائيڊ (CO)	گاڏين مان نڪرندڙ دونهون ۽ پڻ صنعتي دونهون.	ڌند ٿيڻ (Smog) 	صحتمند ماڻهو ۾ دل جي بيماري ڪري سگهي ٿي جهڙوڪ سيني ۾ سور، نظري اثر ڪري ٿي، ذهني ۽ جسماني صلاحيتن کي ڪمزور ڪري ٿي.
نائٽروجن آڪسائيڊ (NO ۽ NO ₂)	گاڏين ۽ صنعتن مان نڪرندڙ دونهون.	اهي ٻوٽن کي نقصان پهچائين ٿا ۽ آلودگي پيدا ڪن ٿا. 	نظامِ تنفس ۾ جلن ۽ سوچ ڪن ٿا.
سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ (SO ₂)	بجلي گهرن، گاڏين ۽ صنعتن مان نڪرندڙ دونهون.	تيزابي مينهن جو سبب ٿئي ٿي، جيڪو نباتات، عمارتون ۽ يادگارن کي نقصان پهچائي ٿو. 	ساهه کڻڻ ۾ ڏکيائي ڪري ٿي خاص طور ڊمر جي مريض ۾.
اوزون (O ₃)	صنعتن ۽ گاڏين مان نڪرندڙ دونهون جنهن ۾ NO _x ۽ VOCs هجن اهي سڀ O ₃ جا ذريعا آهن.	ٻوٽن کي O ₂ /CO ₂ کڻڻ کان روڪي ٿي جنهن ڪري اهي ماحولياتي دٻاءُ جهڙوڪ خراب موسم برداشت ناهن ڪري سگهندا. 	ڦڦڙ صحيح ڪم ناهن ڪري سگهندا، انهن ۾ سوچ ٿئي ٿي.



ساه ڪٽڻ ۾ تڪليف ڪن ٿا، دم جي بيماري ڪن ٿا، دل جي ڌڙڪن ۾ بي ترتيب ڪن ٿا.	تيزابي مينهن جو سبب ٿين ٿا جيڪا ٻوٽن کي ساڙي ٿي. 	باهه، تعمير ٿيندڙ عمارتون، رستا وغيره انهن جا شروعاتي ذريعا آهن صنعتي دونهين ۽ گاڏين مان نڪرندڙ دونهين جو تعامل ٿيڻ انهن جو سيڪنڊري ذريعو آهي.	مادي جا ذرات
ٻارن جي تنهن سرشتي ۾ خرابي ڪري ٿو جنهن سان انهن جي سڪيا واري صلاحيت تي اثر ٿئي ٿو. بالغن ۾ دل جون بيماريون ڪري ٿو.	جيوڀياتي نقصان ٿئي ٿو، ڪرنگهي وارن ۾ اعصابي مشڪلاتون پيدا ڪن ٿا. 	ڏاتو تي ڪم ڪرڻ دوران گندڪچري کي ساڙڻ دوران، فوسل فيول کي ساڙڻ دوران نڪري ٿو. اهي سڀ صنعتي ڪم آهن.	ليڊ (Pb)

5.4 تيزابي مينهن ۽ ان جا اثر

جيئن توهان ڄاڻو ٿا، فوسل فيول کي ساڙڻ سان سلفر ۽ نائٽروجن آڪسائيڊ فضا ۾ شامل ٿي ويندا آهن. SO_2 مينهن جي پاڻيءَ سان ملي H_2SO_4 ۾ تبديل ٿئي ٿو، جڏهن ته NO_x وري HNO_2 ۽ HNO_3 ۾ تبديل ٿين ٿا. مينهن جو پاڻي ڪجهه تيزابي هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ فضا ۾ مليل CO_2 هوندي آهي. جنهنڪري ان جي pH 5.6 کان 6 تائين



تصوير 5.4 تيزابي مينهن ۽ ان جا اثر

هوندي آهي. ٻئي طرف مينهن جو پاڻي اڃان وڌيڪ تيزابي بڻجي ويندو آهي، جڏهن هوائي آلودگي ڪندڙ (ايسڊز) ان ۾ شامل ٿي ويندا آهن، جنهنڪري ان جي pH 4 تائين گهٽجي ويندي آهي. تيزابي مينهن تڏهن ٿيندو آهي جڏهن مينهن جي پاڻي ۾ تيزابي هوائي آلودگي ڪندڙ جهڙوڪ سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ نائٽروجن ڊاءِ آڪسائيڊ شامل ٿي وڃن ٿا. سلفر ۽ نائٽروجن آڪسائيڊ جو تيزاب ۾ تبديل ٿيڻ تصوير ۾ ڏيکاريو ويو آهي. تيزابي مينهن مٽي، جانور، ٻوٽا ۽ آبي زندگي کي پڻ نقصان پهچائي ٿو.



- ## 5.5 اوزون جي گهٽائيءَ ان جا اثر


اوزون جو ٺهڻ:

فضائي آلودگي جي ٻن پرائمري گروپن (غير مستحڪم نامياتي مرڪبات VOC ۽ نائٽروجن آڪسائيڊ) وچ ۾ فوٽو ڪيميڪل تعامل سان ٽروپوسفيئر يعني زميني سطح تي اوزون ٺهندي آهي، ان تهن ۾ انسان ساھ ڪٽندا آھن.



اوزون جي گهٽتائي (Ozone depletion):

آڪسيجن جا ٽي ايترا ايزون ٺاهيندا آهن، جيڪا آڪسيجن جو هڪ بهروپ (Allotrope) آهي. اها وايومنڊل ۾ تڏهن پيدا ٿئي ٿي جڏهن اسٽريٽوسفيئر ۾ هڪ آڪسيجن جو ائٽم آڪسيجن جي ماليڪيول سان ملندو آهي.



تصوير 5.5 اوزون جي گهٽتائي

اوزون وايومنڊل جي سڀني حصن ۾ موجود آهي. بهرحال، ان جي سڀ کان وڌيڪ مقدار، جيڪا اوزون پرت (Ozone layer) جي نالي سان سڃاتي وڃي ٿي، ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان تقريباً 25 کان 30 ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي، اسٽريٽوسفيئر ۾ موجود آهي. هي پرت ڌرتيءَ جي چوڌاري گهمي ٿي ۽ نقصانڪار التروائٽ (UV) شعاعن جي خلاف رڪاوٽ طور ڪم ڪري ٿي. جيڪڏهن اها پرت نه هجي ها، التروائٽ شعاعون چمڙي جي ڪينسر جو سبب ٿين ها. انهيءَ ڪري اوزون پرت اسٽريٽوسفيئر ۾ ڌرتيءَ تي زندگي لاءِ فائديمند آهي.

مسلسل پيچيدن ردعملن جي ڪري اوزون جي اسٽريٽوسفيئر ۾ مقدار بنيادي طور تي عام حالتن ۾ مستقل هوندي آهي. تنهن هوندي به، مختلف ڪيميائي عمل اوزون پرت کي ختم ڪري رهيا آهن. بهرحال، ڪلورو فلورو ڪاربن (CFCs)، جيڪي ايئر ڪنڊيشنر ۽ ريڊريجريٽرن ۾ ٿڌ ڪرائيندڙ طور استعمال ڪيا ويندا آهن، اهي اوزون جي گهٽتائي ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. اهي مادا ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان نڪري وڃن ٿا ۽ اسٽريٽوسفيئر ۾ شامل ٿي پڪڙجي ويندا آهن. CFC ۽ C-Cl جا بانڊ، التروائٽ روشنيءَ سان ٽٽي ويندا آهن، جنهن جي نتيجي ۾ Cl فري ريڊيڪلز پيدا ٿيندا آهن.

انهن فري ريڊيڪلز ۾ ردعمل ڪرڻ جي گهڻي صلاحيت هوندي آهي. اهي اوزون سان ردعمل ڪري هيٺين طريقي سان آڪسيجن ماليڪيول ٺاهن ٿا:



ڪلورو فلورو ڪاربانس CFCs جي ٽٽڻ سان پيدا ٿيندڙ هڪ Cl فري ريڊيڪل اوزون جي لکن سالن کي نقصان پهچائڻ جي صلاحيت رکي ٿو. اوزون سوراخ (Ozone hole) ان جڳهه کي چيو ويندو آهي جتي اوزون پرت سنهڙي ٿي ويندي آهي.

اوزون جي گهٽتائي جون پهريون نشانين 1980ع جي ڏهاڪي ۾ انٽارڪٽيڪا مٿان ڏٺيون ويون. 1990ع جي ڏهاڪي دوران آرڪٽڪ مٿان Ozone depletion پڻ ڏٺي وئي.

اوزون جي گهٽتائي جو اثر

1. اوزون جي معمولي گهٽتائي سان هائيڪار نتيجا نڪري سگهن ٿا.
2. اوزون جي گهٽتائي سان سج جا الٽرا وائلٽ (UV) ڪرڻا ڌرتيء تي سڌا پهچندا، جيڪي انسانن ۽ ٻين جانورن ۾ چمڙي جي ڪينسر جو سبب ٿي سگهن ٿا.
3. جيئن ئي اوزون جي ڀرت سنهي ٿيندي آهي، تيئن مليريا جهڙيون وبائي بيماريون وڌيڪ پکڙجي وينديون آهن.
4. ان ۾ ٻوٽن جي حياتي واري ڦيري (Life cycle) کي تبديل ڪري خوراڪ جي ڪڙي / سلسلي (Food chain) کي ٽوڙڻ جي صلاحيت آهي.
5. ان ۾ هوا جي رُخن کي تبديل ڪرڻ جي صلاحيت آهي، جنهن جي نتيجي ۾ عالمي موسمياتي تبديليون ٿي سگهن ٿيون. موسمياتي تبديلي جي ڪري انساني لڏپلاڻ واري مسئلي جي نتيجي ۾ ايشيا ۽ پئسفڪ، خاص طور تي سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيل علائقا ٿيندا.

5.6 گرین هائوس اثر (Green House Effect)


ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2) ڌرتيء جي چوڌاري هڪ لفافي جهڙي ڀرت پيدا ڪري ٿي. اها ڀرت سج جي شعاعن کي ڌرتيء جي مٿاڇري تائين پهچڻ جي اجازت ڏئي ٿي. اهي شعاعون ڌرتيء جي مٿاڇري کان ٽڪرائجي واپس مٿئين ماحول ڏانهن موٽن ٿيون. CO_2 ڀرت جي گهٽتائي ڌرتي ۽ ان جي وايومنڊل کي گرم رکڻ ۽ گرمي پد کي برقرار / مستقل رکڻ لاءِ ڪافي مددگار آهي. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي ڀرت جي گهٽتائي کي برقرار رکڻ ضروري نه آهي ته فائديمند پڻ. نه ته ٻي صورت ۾ ڌرتي غير آباد هجي ها ۽ موجوده سراسري گرمي پد 15°C جي بدران، ڌرتيء جو سراسري گرمي پد لڳ ڀڳ 20°C - هجي ها. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ماحول جي آلودگي نه آهي، بلڪه اها ٻوٽن لاءِ هڪ ضروري گئس آهي، جيئن سڀني جانورن لاءِ آڪسيجن ضروري هوندي آهي. فوٽو سنٿيسس ۾ ٻوٽا ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ استعمال ڪري آڪسيجن پيدا ڪندا آهن.

جانور ساڻه ڪٽڻ دوران آڪسيجن وٺن ٿا ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ڪن ٿا. نتيجي طور، انهن اهم گئسن جي وچ ۾ هڪ قدرتي توازن موجود هوندو آهي. بهرحال، مختلف انساني سرگرمين جي نتيجي ۾ هوا ۾ وڌ کان وڌ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ شامل ٿيندي آهي ۽ ان سان توازن بگڙجندو آهي.





ان حقيقت جي باوجود ته ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ هڪ نقصانڪار گئس ناهي پر فوسل فيول جي جلڻ ۽ ٻين انساني سرگرمين جي نتيجي طور ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ جي وڌندڙ مقدار توجھ طلب آهي. ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ، وايومنڊل ۾ گرڻ هائوس جي شيشي جي پٽ جي حيثيت طور ڪم ڪري ٿي. اها الٽرا وائلٽ (UV) ۽ انفراريڊ IR شعاعن کي ڌرتي جي وايومنڊل ۾ داخل ٿيڻ جي ته اجازت ڏئي ٿي پر واپس نڪرڻ ناهي ڏيندي.



ڌرتيءَ مان نڪرندڙ انفراريڊ شعاع ان پرت کان ٻاهر ناهن نڪري سگهندا. نتيجي طور ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ جي گهڻي مقدار ڌرتيءَ جي مٿاڇري مان نڪرندڙ انفراريڊ شعاعن کي جذب ڪري ٿي جنهن ڪارڻ وايومنڊل ۾ گرمائش رهندي آهي. اهو ئي سبب آهي جو رات جو ڌرتي جي سطح گهڻي ٿڌي ٿيڻ کان محفوظ رهندي آهي. وايومنڊل ۾ ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ جي مقدار جيترو وڌي ٿي، ڌرتيءَ جي مٿاڇري مان نڪرندڙ گرمائش اوترو وڌيڪ دير تائين وايومنڊل ۾ رهي ٿي. نتيجي طور، مٿاڇري جو سراسري


گرمي پڌ تيزي سان وڌندو آهي. اهو گرڻ هائوس اثر (Green House Effect) طور سڃاتو وڃي ٿو. هوا ۾ ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ جي مقدار جو هن اثر سان سڌو تعلق آهي. ان جو مطلب ته ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ جي جيتري گهڻي مقدار، اوتري وڌيڪ گرمي پڌ يا گرمائش. وڌندڙ گرمي پڌ جي ڪري هن رجحان کي گلوبل وارمنگ پڻ سڏيو ويندو آهي. CH_4 , CO_2 , N_2O , O_3 وغيره گرڻ هائوس گئسن جا مثال آهن.

گلوبل وارمنگ جو اثر

1. وايومنڊل ۾ ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ جي مقدار وڌڻ سبب هوا جي گرمي پڌ ۾ 0.05 درجا سينٽي گريڊ سالياني واڌ ٿئي ٿي.
2. اها موسمن جي ڦيرگهير ۾ اهم تبديليون پيدا ڪري رهي آهي. شديد قسم جي موسمي حادثا ماضي جي پيٽ ۾ بار بار ۽ وڌيڪ شدت سان ٿي رهيا آهن.
3. اها برفاني وڏي چپ (Glacier) ۽ جابلو برفاني سطح کي ڳاري ٻوڏ جي خطري کي وڌائي ٿو ۽ طوفاني واڇوڙي ۾ شدت پڻ آڻيندو آهي.
4. جيئن جيئن سمنڊ جي سطح وڌي ٿي، تيئن هيٺاهين وارا علائقن جي ٻڏي وڃڻ جا وڌيڪ امڪان آهن، جنهن ڪري اڳي آبادي وارا هنڌ ويران ٿي وڃن ٿا.



تصوراتي خاڪو





خلاصو

- زمين جي چوڌاري گئسن جي هڪڙي پرت آهي، جنهن کي وايومنڊل سڏيو ويندو آهي.
- ڌرتيءَ جو وايومنڊل نائٽروجن (78.09%) ۽ آڪسيجن (20.95%) تي مشتمل آهي، جنهن ۾ ٿوري مقدار ۾ آرگن (0.93%)، کاربن ڊاءِ آڪسائيڊ (0.03%)، پاڻي جا بخارات ۽ ٻيون گئسون پڻ هونديون آهن.
- ڌرتيءَ جو وايومنڊل 5 وڏن تهن ۾ ورهايل آهي، يعني: اسٽريٽوسفير، ٿروپوسفير، ٿرموسفير، ميزوسفير ۽ ايگزوسفير.
- هوائي آلودگي تڏهن ٿيندي آهي جڏهن نقصانڪار يا تمام گهڻي مقدار ۾ مادو بشمول گئس، ذرات ۽ نامياتي ماليڪيول ڌرتيءَ جي وايومنڊل ۾ داخل ٿين ٿا.
- مکيه هوائي آلودگي ڪندڙ کاربن مونو آڪسائيڊ، نائٽروجن ڊاءِ آڪسائيڊ، سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ، ليڊ، مادي جا ذرڙا ۽ گرین هائوس گئسون آهن.
- تيزابي مينهن تيزابي جزن جو گهمجڻ آهي، جهڙوڪ سلفيورڪ يا نائٽرڪ تيزاب، مينهن جي پاڻي سان ملي زمين تي ڪرڻ ٿا.
- اوزون هڪ گئس آهي جيڪا وڏي پئماني تي Stratosphere ۾ ملي ٿي جيڪا تن آڪسيجن جي ائٽمن (O_3) تي مشتمل آهي.
- اوزون جي گهٽتائي جو وڏو سبب ڪلورو فلورو ڪاربانس (CFCs) آهن.
- گرین هائوس اثر ڌرتيءَ جي مٿاڇري ۽ ان جي مٿان هوا جو گرم ٿيڻ آهي.



مشق

ڀاڱو (الف): گهڻا چونڊ سوال

1. ڌرتيءَ جي وايومنڊل جي ٻي بلند ترين ڀرت آهي
 - (الف) اسٽريٽوسفيئر
 - (ب) ميزوسفيئر
 - (ج) ٿروپوسفيئر
 - (د) ٿرموسفيئر
2. هوائي جهاز اڏامن ٿا
 - (الف) اسٽريٽوسفيئر ۾
 - (ب) ٿروپوسفيئر ۾
 - (ج) ميزوسفيئر ۾
 - (د) ٿرموسفيئر ۾
3. هوا جو دٻاءُ گهٽجي ٿو
 - (الف) اونچائي ۾ واڌاري سان
 - (ب) اوچائي ۾ گهٽتائي سان
 - (ج) ٻئي الف ۽ ب
 - (د) ڪوبه نه
4. ماحول جي ڀرت جيڪا اسٽريٽوسفيئر ۽ ٿرموسفيئر کي جدا ڪري ٿي، ان کي چئبو آهي
 - (الف) ٿروپوپاز
 - (ب) ميزوپاز
 - (ج) ٿرموپاز
 - (د) اسٽريٽوپاز
5. اوزون ڪهڙي ڀرت جو حصو آهي
 - (الف) ميزوسفيئر
 - (ب) اسٽريٽوسفيئر
 - (ج) ٿرموسفيئر
 - (د) ٿروپوسفيئر
6. ڪهڙي گئس گرین هائوس گئس نه آهي
 - (الف) کاربن ڊاءِ آڪسائيڊ
 - (ب) ميٿين
 - (ج) نائٽرس آڪسائيڊ
 - (د) آڪسيجن
7. نائٽروجن کان پوءِ مقدار جي لحاظ کان خشڪ هوا جو ٻيو وڏو حصو آهي
 - (الف) هائڊروجن جو
 - (ب) آڪسيجن جو
 - (ج) کاربن ڊاءِ آڪسائيڊ جو
 - (د) هيليم جو
8. هيٺين مان ڪهڙو گلوبل وارمنگ جو سبب آهي
 - (الف) سلفائيٽ جي موجودگي
 - (ب) CO_2 جي مقدار ۾ وڌاءُ
 - (ج) نائٽروجن جا آڪسائيڊ
 - (د) اوزون جو ٺهڻ



9. پرت استريٽوسفيئر جي اوچائي آهي

- (الف) 40 کان 45 ڪلوميٽر
(ب) 50 کان 55 ڪلوميٽر
(ج) 60 کان 65 ڪلوميٽر
(د) 70 کان 75 ڪلوميٽر

10. اوزون گئس آهي جيڪا _____ تهه / پرت ۾ ملي ٿي

- (الف) ٿروپوسفيئر
(ب) ميزوسفيئر
(ج) استريٽوسفيئر
(د) ايگزوسفيئر

ڀاڱو (ب): مختصر سوال

1. مڪيا هوائي آلودگي ڪندڙ مادا ۽ انهن جي ذريعن جا نالا لکيو.
2. انساني صحت تي هوائي آلودگي جا ڪجهه اثر بيان ڪريو؟
3. تيزابي مينهن جو ڪارڻ ڪهڙو آهي؟
4. جواز ڏيو ته گرین هائوس اثر جي ڪري گلوبل وارمنگ ٿئي ٿي.
5. وايومنڊل جي پرت/تهن جا نالا لکيو.
6. تيزابي مينهن جا اثر لکيو.
7. جواز ڏيو ته اونچائي ۾ تبديلي، وايومنڊل جي گرمي پد کي تبديل ڪري ٿي.
8. پرائمري ۽ سيڪنڊري هوائي آلودگي ڪندڙ مادا ڪهڙا آهن؟

ڀاڱو (ج): تفصيلي سوال

1. وايومنڊل ۽ ان جي ترڪيب جي وضاحت ڪريو.
2. پرت استريٽوسفيئر ۽ ٿروپوسفيئر جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.
3. مختلف هوائي آلودگي ۽ ان جو انساني صحت ۽ ماحول تي اثر جي وضاحت ڪريو.
4. گلوبل وارمنگ کي بيان ڪريو.



ماحولياتي ڪيميا II: پاڻي

وقت جي ورهاست

تدريسي پيريد = 10
تشخيصي پيريد = 02
سليبس ۾ حصو = 10%

اهم تصورات:

- 6.1 پاڻي
- 6.2 نرم پاڻي ۽ سخت پاڻي
- 6.3 پاڻي کي آلودو ڪندڙ مادا
- 6.4 پاڻي مان ٿيندڙ بيماريون

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (Student Learning Outcomes)

هن باب سکڻ کان پوءِ شاگرد:

- پاڻي جي موجودگي ۽ ان جي ماحولياتي ۽ صنعتي اهميت جي وضاحت ڪري سگهندا.
- پاڻي جي بڻاوت ۽ خاصيتن جي وضاحت ڪري سگهندا.
- نرم، عارضي سخت ۽ مستقل سخت پاڻي جي وچ ۾ فرق ڪري سگهندا.
- پاڻي جي عارضي ۽ مستقل سختي کي ختم ڪرڻ جي طريقن بابت وضاحت ڪري سگهندا.
- پاڻي کي آلودو ڪندڙن مادن کي سڃاڻي سگهندا.
- صنعتي ۽ گهريلو گندگي کي ”پاڻي کي آلودو ڪندڙ“ طور وضاحت ڪري سگهندا.
- پاڻي کي آلودو ڪندڙن جو زندگي تي اثر جي وضاحت ڪري سگهندا.
- پاڻي مان ٿيندڙ بيمارين جي قسمن جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا.



تعارف

پاڻي زمين تي سڀ کان وڌيڪ ملندڙ مرڪب آهي. ان جو نه رنگ آهي ۽ نه ئي بوءِ. پاڻي جو ڪيميائي فارمولو H_2O آهي. پاڻي کان سواءِ ماڻهو 4 کان 5 ڏينهن کان وڌيڪ جيئرو رهي نه ٿو سگهي. اسان جي اُڃ، کاڌو پچائڻ، وهنجڻ، ڪپڙا ڌوئڻ، فصل پوکڻ، صنعت ۽ معدنيات سان گڏوگڏ بجلي پيدا ڪرڻ، سڀ ڪم پاڻي تي انحصار ڪن ٿا.

6.1 پاڻي

پاڻيءَ جي موجودگي

پاڻي زمين جي مٿاڇري تي ٽن حصن تي مشتمل آهي. سمنڊ، نديون، گليشيئرس، ڍنڍون ۽ ڪوهه پاڻي جا بنيادي ذريعا آهن. پاڻي ڌرتيءَ جي مٿاڇري جو 70 سيڪڙو حصو ڏيکي ٿو، جڏهن ته باقي 30 سيڪڙو زمين خشڪ آهي. ڌرتيءَ تي موجود پاڻي جو گهڻو حصو (اٽڪل 97 سيڪڙو) لوڻيانو آهي، جيڪو گهڻو قدر سمنڊن ۾ ملي ٿو، رڳو 3 سيڪڙو منو پاڻي آهي. انساني ضرورتن لاءِ دستياب مني پاڻي جي ضرورت ڪل موجود مقدار جي 1 سيڪڙو کان به گهٽ آهي. مسئلو صرف اهو آهي ته منو پاڻي سڄي دنيا ۾ برابريءَ سان ورهايو نه پيو وڃي.

زمين تي پاڻي جي موجودگي



شڪل 6.1 پاڻي جي موجودگي

پاڻي جي اهميت

1. اسان جي عضون کي صحيح ڪم ڪرڻ ۽ جسم مان زهريلا مادا پيشاب جي ذريعي نڪال ڪرڻ لاءِ پاڻي جو اهم ڪردار آهي.
2. اسان جي جسم ۾ نايديگي (Dehydration) جي ڪري ٽڪاوت (Fatigue) ٿئي ٿي، ان ڪري پاڻي ان ٽڪاوت کي روڪي ٿو.
3. اهو ڏوٽ ۽ صفائي سترائي جي ڪم اچي ٿو.
4. اهو رڌ پچاءُ ۾ ڪم ايندو آهي.
5. اهو ذراعت ۾ کاڌو پيدا ڪرڻ ۾ ڪم اچي ٿو.
6. توانائي وارا ٿرمل پلانٽ توانائي جي اُپت لاءِ پاڻي کي استعمال ڪن ٿا.
7. ڪيترن ئي دوا ساز جي طريقن ۾ پاڻي هڪ اهم جز جي اهميت رکي ٿو. مثال طور ڊائلاسس ۾ رت مان گندگي کي خارج ڪرڻ لاءِ پاڻي استعمال ٿيندو آهي.
8. صاف پاڻي خطرناڪ بيمارين کان بچائي ٿو، جهڙوڪ ڪالرا، ٽائيفائيڊ (مدي جو بخار) وغيره.



شڪل 6.2 پاڻي جي اهميت

6.1.1 پاڻي جون خاصيتون

- صاف پاڻي شفاف، بي رنگ ۽ بي بو ۽ پٽرو آهي، جنهن ۾ هيٺ ڏنل خاصيتون آهن:
1. اهو لٽمس پيپر تي بي عمل اثر ڏيکاريندو آهي.
 2. سمنڊ جي سطح تي، ان جو چمڻ پد 0°C ۽ 100°C تھڪڻ پد آهي.
 3. 4°C تي ان جي ڪثافت وڌ ۾ وڌ 1gm/cm^3 آهي.
 4. اهو قطبي سالمن لاءِ بهترين گارينڊر آهي.
 5. ان ۾ گرمي جي گنجائش (Heat capacity) $4.2\text{ Jg}^{-1}\text{K}^{-1}$ آهي، جيڪا پٿر جي پيٽ ۾ لڳ ڀڳ ڇهه ڀيرا وڌيڪ آهي.




6. پاڻيءَ جي اها خاصيت ڌرتيءَ جي گرمي پد کي مناسب حدن اندر برقرار رکڻ جي ذميوار آهي. ٻي صورت ۾ ڏينهن جو گرمي پد تمام گهڻو هجي ها، ۽ رات جو گرمي پد هر شيءِ کي ڄمائڻ لاءِ تمام ٿڌو هجي ها.
7. ان جي سطحي چڪ (Surface tension) تمام گهڻي آهي. پاڻي جو قابل ذڪر Capillary action جو عمل ان سطحي چڪ جي ڪري آهي. ان Capillary action جي ذريعي ٻوٽن جي پاڙن کان پٺن تائين پاڻي پهچي ٿو. زميني ٻوٽن جي بقا جو دارومدار Capillary action تي هوندو آهي.

پاڻيءَ جي جوڙجڪ

پاڻي جي هڪ سالملي ۾ ٻه H ائٽم ڪوويلنٽ (هم گرفت) باند ذريعي آڪسيجن (O) جي هڪڙي ائٽم سان جڙيل هوندا آهن. هائيڊروجن ۽ آڪسيجن ۾ electronegativity جو فرق هئڻ سبب پاڻي جو ماليڪيول قطبي (Polar) آهي. مينهن جو پاڻي سڀ کان صاف (Purest form) پاڻي جي مثال آهي. عام پيئڻ واري پاڻي ۾ اسان جي جسم لاءِ ضروري آئنز هوندا آهن جهڙوڪ Na^+ , Cl^- وغيره.

پاڻي جي بناوت



شڪل 6.3 پاڻي جي
ماليڪيولي بناوت

پاڻي هڪ سادو سالمو آهي جنهن ۾ هڪ آڪسيجن ائٽم ٻن هائيڊروجن ائٽمن سان جڙيل هوندو آهي. آڪسيجن ائٽم جي وڌيڪ electronegativity ڪري (O - H) باند قطبي هم گرفت ٿيندو آهي. آڪسيجن جو ائٽم هم گرفت باند جي shared اليڪٽرانن کي هائيڊروجن ائٽم جي پيٽ ۾ پاڻ ڏانهن وڌيڪ ڪشش ڪندو آهي. نتيجي طور آڪسيجن ائٽم کي جزوي ڪاٺو بار (δ^-) ٿيندي آهي، جڏهن ته هائيڊروجن ائٽم تي جزوي واڌو بار (δ^+) ٿيندي آهي.

6.1.2 پاڻي هڪ محل (Solvent) جي طور تي


پاڻي عملي طور تقريبن معدنيات کي ڳاري سگهي ٿو، پاڻي کي عالمگير محل (Universal solvent) طور سڃاتو وڃي ٿو. ڪنهن مرڪب کي ڳارڻ جي صلاحيت پاڻي جي ٻن مختلف خاصيتن جي ڪري آهي:

1. پاڻيءَ جي قطبي فطرت
2. وسيع هائيڊروجن بانڊنگ جي صلاحيت

پاڻي جي قطبي فطرت

آڪسيجن ۽ هائيڊروجن جي ائٽم جي وچ ۾ electronegativity جي فرق جي ڪري


پاڻيءَ جي ماليڪيول جي قطبي بناوت آهي، جنهن جو مطلب آهي ته ماليڪيول جو هڪ پاسو جزوي طور تي مثبت ۽ ٻيو پاسو جزوي طور تي منفي آهي. پاڻي ٻين سڀني قطبي مرڪبات کي ڳاري ٿو ڇو ته مرڪب جي مثبت پڇاڙي پاڻيءَ جي منفي آخر ($O^{-\delta}$) ڏانهن ڇڪجي ٿو ۽ منفي پڇاڙي پاڻيءَ جي مثبت پڇاڙي ($H^{+\delta}$) ڏانهن ڪشش ڪندي آهي. آئنز ۽ پاڻي جي ماليڪيولز جي وچ ۾ ڪششي آئن-ٻه قطبي (Ion-dipole) قوتون آئنز جي درميان موجود برق سکوني (Electrostatic) قوتن کان وڌيڪ طاقتور ٿين ٿيون نتيجي طور مرڪبات جا واڌو ۽ ڪاٽو آئن هڪ ٻئي کان الڳ ٿي ويندا آهن ۽ آخرڪار پاڻي جي سالمون سان ڍڪجي ويندا آهن، جنهن سبب اهي پاڻي ۾ حل ٿيندي نظر ايندا آهن. لوڻ، جهڙوڪ $NaCl$ ، KCl ، Na_2SO_4 وغيره پاڻي ۾ آساني سان حل ٿي ويندا آهن، ٻئي طرف پاڻيءَ جا ماليڪيول ڪيترن ئي ڪوويلنٽ مرڪبن جن ۾ قطبي حصا ناهن ٿيندا، کي ناهن ڳاريندا، جهڙوڪ پئٿرول، ايٿر، بينزين وغيره. نتيجي طور غير قطبي مرڪب پاڻي ۾ حل نه ٿي سگهندا آهن.



شڪل 6.4 پاڻي جي قطبي بناوت

وسيع هائيڊروجن بانڊنگ جي صلاحيت

آڪسيجن ۽ هائيڊروجن جا ائٽم پاڻي جو ماليڪيول ٺاهيندا آهن. هڪڙو H_2O ماليڪيول وڌ کان وڌ چار هائيڊروجن بانڊ ٺاهي سگهي ٿو ٻين چئن H_2O ماليڪيولن سان جيڪي چوڌاري چوسطحي (Tetrahedral) طور تي موجود هوندا آهن، چار هائيڊروجن بانڊ ٻن $O-H$ بانڊن ۽ ٻن $Lone\ pair$ اليڪٽرانن جي جوڙن جي ڪري ٿيندا آهن. هائيڊروجن بانڊ جي ڪري مختلف غير آئني قطبي ماليڪيول جن ۾ هائيڊروآڪزل گروپ ($-OH$) هوندو آهي، جهڙوڪ الڪوحل، نامياتي تيزاب، گلوڪوز، ڪنڊ وغيره اهي سڀ پاڻي ۾ آساني سان حل ٿيو وڃن.



شڪل 6.5 هائڊروجن بانڊنگ



6.2 نرم ۽ سخت پاڻي

نرم پاڻي

نرم پاڻي اهو پاڻي آهي جيڪو صابن سان استعمال ڪرڻ وقت هڪ بهترين گج ناهي ٿو. ان ۾ ملاوٽي شين (Impurities) جي مقدار گهٽ ٿيندي آهي.

سخت پاڻي

سخت پاڻي کي ان پاڻي جي طور تي بيان ڪيو ويو آهي جيڪو صابن سان گج نٿو ٺاهي. پاڻي ۾ سختي مختلف سببن جي ڪري آهي. برسات جو پاڻي هوا مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گڏ ڪري ٿو ۽ جڏهن ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ سان ملايل پاڻي مٽيءَ جي تهن مان وهندو آهي، ته نه گهٽندڙ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم ڪاربونيٽس گهٽندڙ بائيڪاربونيٽس ۾ بدلائي ويندا آهن. ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم ڪلورائيڊس ۽ سلفيٽس پڻ ان ۾ گهلي سگهن ٿا. پاڻي جي سختي انهن معدنيات جي ڪري آهي.



6.2.1 پاڻيءَ جي سختيءَ جا قسم

اهو پاڻي جيڪو صابن سان گج نٿو ٺاهي سگهي ان کي سخت پاڻي چئبو آهي. سخت پاڻيءَ ۾ وڏي مقدار ۾ لوڻ جهڙوڪ ڪيلشيم، ميگنيشيم ۽ ٻين ڳرن ڌاتن جا لوڻ موجود هوندا آهن، اهو سخت پاڻي پائپ ۽ ٻين گهريلو سامانن کي نقصان پهچائي ٿو. سمنڊ سخت پاڻي جو وڏو ذريعو آهي. سخت پاڻي جا ٻه مکيه قسم آهن:

1. پاڻي جي عارضي سختي

2. پاڻي جي مستقل سختي

پاڻي جي عارضي سختي

عارضي سختي ڪيلشيم بائڪاربونيت $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ۽ ميگنيشيم بائي ڪاربونيت $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ جي گهڻي مقدار جي ڪري ٿئي ٿي. پاڻيءَ کي اُٻارڻ سان عارضي سختي ختم ٿي سگهي ٿي.

پاڻي جي مستقل سختي

پاڻي جي مستقل سختي ميگنيشيم، ڪيلشيم ۽ ايلومينيم ڪلورائيڊس ۽ سلفيٽس جي مقدار جي ڪري ٿئي ٿي، جهڙوڪ CaCl_2 ، CaSO_4 ، MgSO_4 ، FeSO_4 ، MgCl_2 ، $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. پاڻي جي مستقل سختي کي اُٻارڻ سان ختم نٿو ڪري سگهجي. عارضي ۽ مستقل سختي کي عام طور تي پاڻي جي سختي طور حوالو ڏنو ويو آهي.

پاڻي جي سختي Ca جي mg/l جي حساب سان	
0 – 16.1 mg/liter	نرم پاڻي
16.1 - 60 mg/liter	هڪو سخت پاڻي
61 - 120 mg/liter	درميانو سخت پاڻي
121 - 180 mg/liter	سخت پاڻي
180 mg/liter کان وڌيڪ	تمام گهڻو سخت پاڻي

جيتوڻيڪ پاڻيءَ جي سختي ڪڏهن به CaCO_3 جي صورت ۾ نه هوندي آهي، ڇاڪاڻ ته اهو پاڻي ۾ حل نه ٿيندڙ هوندو آهي، پر پاڻيءَ جي سختيءَ کي آساني سان CaCO_3 جي برابريءَ جي لحاظ کان ظاهر ڪيو ويندو آهي.

6.2.2 سختي کي ختم ڪرڻ جا طريقا

پاڻي مان آئنز جهڙوڪ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم (جيڪي سختي جو سبب بڻجن ٿا) ختم ڪرڻ جي عمل کي پاڻي جي نرمي وارو عمل چئبو آهي.

1. عارضي سختي کي ختم ڪرڻ

(الف) پاڻي کي ٽهڪائڻ


عارضي سختي کي پاڻي جي ٽهڪائڻ سان آساني سان ختم ڪري سگهجي ٿو. جڏهن ڪيلشيم بائڪاربونيت $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ کي گرم ڪيو ويندو آهي ته اهو حل نه ٿيندڙ ڪيلشيم ڪاربونيت ۾ مٽجي ويندو آهي ۽ ڳار مان ڇاڻ (Precipitates) جي صورت ۾ نڪرندو آهي.



(ب) ڪلارڪ (Clark) وارو طريقو: عارضي سختي کي ڪيميائي طريقي جي استعمال سان ختم ڪري سگهجي ٿو. عارضي سخت پاڻي کي لائم پاڻي $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (Lime water) سان



سان Treat ڪيو ويندو آهي جنهن جي نتيجي ۾ Ca ۽ Mg آئنز ڇاڻ جي صورت ۾ ظاهر ٿي پوندا آهن ۽ پاڻي نرم ٿي ويندو آهي.




2. مستقل سختي کي ختم ڪرڻ

ڪيميائي طريقو مستقل سختي کي ختم ڪرڻ جو واحد ذريعو آهي. واشنگ سوڊا (Na_2CO_3) يا سوڊيم زيولاٽ شامل ڪرڻ سان ڪيلشيم (Ca^{2+}) ۽ ميگنيشيم (Mg^{2+}) آئنز کي حل نه ٿيندڙ لوڻ جي طور تي ختم ڪري ٿو.

ڌوئڻ واري کار (Washing soda) استعمال ڪرڻ:

ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم آئنز ۾ ڌوئڻ واري کار شامل ڪرڻ جي نتيجي ۾ حل نه ٿيندڙ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم ڪاربونيٽس ٺهن ٿا.



6.2.3 پاڻي جي سختي جا نقصان

گج جو نه ٺهڻ: جڏهن توهان پنهنجا ڪپڙا سخت پاڻي ۾ ڌوئو ٿا، صابن گج جي بدران هڪ اڇي ٿلهي ڇاڻ پيدا ڪري ٿو. گج کان سواءِ ڪپڙا صاف نه ٿيندا آهن.

داغ: سخت پاڻي توهان جي ڪپڙن تي داغ ڇڏي ٿو. صابن گج جي بجاءِ ٿلهي گجي (Scum) پيدا ڪندو آهي. هي ٿلهي ڇاڻ وري توهان جي ڪپڙن کي داغدار ڪري ٿي ۽ انهن جو رنگ ڦٽائي ٿي. ڪيلشيم جي گجي پڻ توهان جي ڪپڙن کي خراب ٿيڻ جو سبب بڻائيندي آهي. غسل خاني جا ٽائلس، شيشو ۽ ٻيا سامان پڻ سخت پاڻي سان داغدار ٿي ويندا آهن. ڪيلشيم جي گجي کي فٽنگس (Fittings) ۾ جمع ٿيڻ کان پوءِ ان کي مٽائڻ ڏکيو ٿي پوندو آهي (جيڪڏهن ان کي بار بار صاف نه ڪيو وڃي)، رڌڻي جي ٿانون تي پاڻي جا اڇا نشان صرف سخت پاڻي جي ڪري ٿيندا آهن.

وارن (Hair) تي اثر: جيڪڏهن توهان پنهنجي وارن کي سخت پاڻيءَ سان ڌوئيندا رهو ته توهان جا وار ڏينهن ڏينهن خراب ٿيندا ويندا. توهان جا وار سڪي ۽ سخت ٿي ويندا. اها سختي پاڻي ۾ موجود اضافي معدنيات جي ڪري آهي، جيڪا هڪ ڏهي جهڙي مواد ۾ تبديل ٿي ويندي آهي ۽ توهان جي وارن کي چنڊڙي پوندي آهي. نتيجي طور توهان کي وارن کي ڌوئڻ جي ضرورت محسوس ٿيندي آهي پر ان سان اهي وڌيڪ خراب ٿيندا آهن.

چمڙي تي اثر: سخت پاڻي سان وهنجڻ سان چمڙي خشڪ ٿي ويندي آهي ۽ خارش پڻ ٿيندي آهي. ان جو اهو ئي سبب آهي ته صابن چمڙي تي چنڊڙي پوندو آهي. ايگزيما جهڙيون علامتون ان سبب ٿين ٿيون. ٻارن کي اهڙي پريشاني جو وڌيڪ امڪان آهي.



گهريلو سامان (Appliance) جي زندگي گهٽائي ٿو: جيڪڏهن توهان پنهنجي گهريلو سامان کي لڳاتار سخت پاڻي سان استعمال ڪندا ته انهن جي عمر گهٽجي ويندي. سخت پاڻي جي ڪري سامان مسلسل خراب ٿي ويندا آهن ۽ آخرڪار ناڪارا ٿي ويندا آهن. ان کان سواءِ سخت پاڻي ۾ معدنيات جي ڪري مشينن جي ڪارڪردگي پڻ متاثر ٿئي ٿي. هڪ ڊش واشر کي ڏهن سالن تائين استعمال ڪرڻ جي اميد آهي جيڪڏهن توهان ان کي گرم پاڻي سان استعمال ڪندا رهو پر اهو ست سال به نه هلي سگهندو جيڪڏهن ان کي لڳاتار سخت پاڻي سان استعمال ڪيو وڃي. هڪ نل پڻ نون سالن تائين هلي سگهندو پر سخت پاڻي سان اهو صرف پنجن سالن تائين هلندو. ان طرح اهو سخت پاڻي توهان جي گهريلو سامانن کي خراب ڪري ٿو.

پائپ جو زنجڳڻ: سخت پاڻي جي ڪري پائپ خراب ٿي سگهن ٿا ۽ پاڻي جي وهڪري ۾ رڪاوٽ جو سبب پڻ اٿي سگهن ٿا. نتيجي طور پاڻي جي مقدار جيڪا پائپ ذريعي وهندي آهي گهٽجي ۽ سست ٿي ويندي آهي. پائپ جي زنجڳڻ سان ڌاتو پاڻي ۾ شامل ٿي ويندا آهن ۽ ان کي پيئڻ لاءِ غير محفوظ بڻائيندا آهن.

6.3 پاڻي جي آلودگي

آبي ذخيرن جي آلودگي کي پاڻي جي آلودگي طور سڃاتو وڃي ٿو (مثال طور ڍنڍون، نديون، سمنڊ ۽ زميني پاڻي). خطرناڪ مادن کي ختم ڪرڻ لاءِ آلودگي سڌي يا اڻ سڌي طرح پاڻي جي ذخيرن ۾ اڇلائي ويندي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ پاڻي جي آلودگي ٿيندي آهي.

6.3.1 صنعتي نيڪالي مادو

صنعتن کي گهربل شين لاءِ (ڪيميا، ڪپڙي، چمڙي جون شيون، کاغذ، پلاسٽڪ جون شيون، پيٽرو ڪيميڪل ۽ ربڙ جون شيون) تجارتي پيماني تي تعمير ڪيو ويندو آهي. بهرحال سڀ صنعتي يونٽ نيڪالي مادي (ڪيميائي) کي يا ته کليل زمين ۾ يا پاڻي جي وهڪري ۾ ڇڏيندا آهن. اصطلاحن ان کي صنعتي گندو پاڻي سڏيو ويندو آهي. نامياتي مرڪبات، غير نامياتي لوڻ، ڳرا ڌاتو، معدني تيزاب، تيل ۽ گريز ۽ ٻيا تمام زهريلا مادا صنعتي پاڻي ۾ موجود ٿي سگهن ٿا. صنعتن ۾ صفائي طور استعمال ٿيندڙ پاڻي کي فوري طور نيڪال ڪيو ويندو آهي. هي پاڻي مختلف قسم جي نقصانڪار ڪيميائي مادن ۽ ڊٽرجنٽ سان آلودو هوندو آهي.

اهو آلودو پاڻي جڏهن ڍنڍن، ندين، دريائن يا سمنڊن ۾ پهچي ٿو ته ان جي آلودگي پاڻيءَ ۾ ترندي به نظر ايندي آهي، نتيجي طور پاڻي جي آلودگي ٿئي ٿي. مثال طور:

1. اهي پاڻي جي معيار کي خراب ڪن ٿا.
2. اهي پاڻي ۾ موجود آڪسيجن جي مقدار کي گهٽ ڪن ٿا، جنهن جو آبي زندگي ۽ ماحولياتي نظام تي اثر پوي ٿو.



3. اهو زميني پاڻي ۾ شامل ٿي سگهن ٿا ۽ پاڻي جي ذخيرن کي آلودو ڪن ٿا. جڏهن اهو پاڻي انسان استعمال ڪري ٿو ته اهو پاڻي ڪينسر، گيسٽرو اينٽرائٽس جهڙين وڏين بيمارين جو سبب بڻجي ٿو. مٽي، فصل، ٻوٽا ۽ جانور سڀني کي هن گندي پاڻي جي ڪري نقصان پهچي ٿو.
4. ڳرا ڌاتو جهڙوڪ ڪيڊميم، ليڊ ۽ مرڪيوري انسانن لاءِ نقصانڪار آهن ۽ صحت لاءِ خطرو بڻجن ٿا. ڪيڊميم جي وڌيڪ مقدار جي نتيجي ۾ بلند بلڊپريشر، رينل نقصان ۽ ڳاڙهي رت جي جيوگهرڙن ۾ خرابي ٿئي ٿي. گردو، جگر، دماغ، مرڪزي تنڻي سرشتو ۽ توليد نظام جي خرابي، اهي سڀئي ليڊ مقدار جي واڌ جون علامتون آهن. مرڪيوري جي تيزابيت تنڻي نظام کي خراب ڪري ٿي.

شڪل 6.6
صنعتي گدلاڻ



6.3.2 گهريلو گندڪچرو

گهرن ۽ ڪاروبار ۾ صفائي جي مقصدن لاءِ صافي (Detergent) جو استعمال ڏينهن وڌي رهيو آهي. ان جو ڪارڻ اهو ئي آهي ته صافي جي سخت پاڻي ۾، صابن کان وڌيڪ بهتر صفائي واري سرگرمي آهي. اهي تيزابي ميڊيم ۾ به ڪم ڪري سگهن ٿا. تنهن هوندي به انهن جو صابن جي ڀيٽ ۾ هڪ اهم نقصان اهو آهي ته ڪجهه ڊٽرجنٽ غير بايو ڊيگريڊبل (Non-biodegradable) هوندا آهن. (خورديني جاندار جهڙوڪ بئڪٽيريا انهن کي ختم نه ڪري سگهندا آهن). پاڻي جي آلودگي تڏهن ٿيندي آهي جڏهن گهريلو پاڻي جنهن ۾ اهي ڊٽرجنٽ شامل هوندا آهن، تلائن، ڍنڍن ۽ دريائن ۾ اڇلايا ويندا آهن. ڊٽرجنٽ پاڻيءَ ۾ ڊگهي عرصي تائين رهي ٿو، ان ڪري ان کي آبي زندگي لاءِ نامناسب بڻائي ٿو. ڊٽرجنٽ ۾ فاسفيٽ لوڻ هوندا آهن، جيڪي ڪائي (Algae) جي تعداد کي پاڻي ۾ جلدي وڌائڻ ٿا ۽ پوءِ اها Algae پاڻي جي سڄي سطح تي ترندي نظر ايندي آهي. جڏهن اها Algae مري ختم ٿي ويندي آهي ته ان جي ختم ٿيڻ (Decomposition) واري عمل ۾ پاڻي ۾ موجود آڪسيجن کيس جو وڌ کان وڌ استعمال ٿيندو آهي. نتيجي طور آبي زندگي آڪسيجن جي کوٽ سبب مري وڃي ٿي.

پاڻي ۾ ڳريل ۽ اڻ ڳريل آلودگي گهريلو گندي پاڻي ۾ موجود ٿي سگهي ٿي. مثال طور کاڌ خوراڪ ۽ گندڪچرو، بوتلون، ڪيميائي ڊٽرجنٽ، واشنگ پاڻوڊر وغيره. ان ۾ بيماريون پيدا ڪندڙ بيڪٽيريا پڻ شامل هوندا آهن. اهي سڀ شيون پاڻي کي آلودو ڪن ٿيون.



شکل 6.7
گھریلو گدلاڻ



ڇا توهان کي خبر آهي؟



- زمين جي ڪل پاڻي جي فراهمي جو 1 سيڪڙو کان به گهٽ پيئڻ لائق آهي.
- خراب پاڻي جي ڪري روزانو 5000 ٻار ۽ عالمي سطح تي هر سال 3 ملين ٻار مرن ٿا. (يو. اين رپورٽ، 2006)

6.3.3 زرعي گندڪچرو

ماڪڙڪش (Pesticides) دوائن ۽ پاڻ جي استعمال سان زرعي گندڪچرو پيدا ٿئي ٿو ۽ پاڻي کي آلودو ڪندو آهي. پاڻ مٽيءَ ۾ نائٽروجن، فاسفورس ۽ ٻين غذائي جزن جي گهٽتائي کي پورو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ٻئي طرف ماڪڙڪش، جيتن/جراثيمن (Pests) کي مارڻ يا انهن جي واڌ کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ پڻ استعمال ڪيا ويندا آهن. Pests جي مثال ۾ پن ڪائيندڙ جيت، فنگس وغيره اچي وڃن ٿا. اهي سڀ فصلن کي نقصان پهچائين ٿا ۽ انسانن ۽ جانورن ٻنهي ۾ بيماريون پکيڙين ٿا. زرعي آلودگي جي ڪري ٻه قسم جا اثر ٿين ٿا:

1. پاڻن ۽ ماڪڙڪش دوائن مان نڪرندڙ ڪيميائي مادا زمين جي پاڻيءَ ۾ وهي شامل ٿي وڃن ٿا، ان عمل کي سيمون (Leaching) چئجي ٿو. اهو زرعي زمينن مان نڪرندڙ آبپاشي زميني پاڻي ۾ نائٽريٽ جي اضافي سطح جو بنيادي سبب آهي.
2. زرعي زمين مان وهندڙ وهڪري (جنهن ۾ پاڻ ۽ جراثيم ڪش شامل هوندا آهن) تلائن، ندين ۽ دريائن تائين پهچندو آهي. هن پاڻي ۾ نائٽريٽ (NO_3) ۽ فاسفيٽ (PO_4) لوڻ پڻ موجود هوندا آهن. اهي مرڪبات Algae کي جلدي وڌڻ ۾ مدد ڪن ٿا جيڪا پاڻيءَ جي مٿاڇري تي ترندي نظر ايندي آهي، ان کي Eutrophication سڏيو ويندو آهي. Algae ابي زندگي ڏانهن سڄ جي روشني ۽ آڪسيجن جي گذر کي روڪيندي آهي. جڏهن Algae مري وڃي ٿي ته پوءِ Microorganisms پاڻي مان آڪسيجن استعمال ڪندا آهن ته جيئن Algae کي ختم ڪري سگهن. نتيجي طور پاڻي مان آڪسيجن جي مقدار گهٽجي ويندي آهي. آڪسيجن جي کوٽ جي ڪري، ابي جاندار دم ڏئي جو شڪار ٿين ٿا ۽ آخرڪار فنا ٿي وڃن ٿا.

شکل 6.8 زرعي گدلاڻ





آلودگي پاڻي جا زندگي تي اثر


پاڻي جي آلودگي جا هيٺيان اثر آهن:

1. اهو ماڻهن جي صحت لاءِ نقصانڪار آهي. آلودو پاڻي واپرائڻ سان ڪولرا، تائيفائيڊ ۽ اسهال جهڙيون بيماريون ٿي سگهن ٿيون.
2. آلودو پاڻي جو استعمال نه رڳو انسانن پر جانورن ۽ پکين لاءِ به نقصانڪار آهي.
3. اهو Algae جي تعداد کي تيزي سان وڌائي ٿو. Algae جي مرڻ سان پاڻي ۾ آڪسيجن جي کوٽ ٿئي ٿي، جيڪا آبي جاندارن کي متاثر ڪري ٿي.
4. اهو آبي زندگيءَ کي نقصان پهچائي ٿو، جنهن ڪري کاڌي جو ڳنڍڻو يا سلسلو (Food Chain) ٽٽي پوي ٿو.
5. اهو ڍنڍن ۽ دريائن جي ڏيک کي خراب ڪري ٿو.
6. اهو صفائي يا ڌوئڻ لاءِ غير مناسب آهي.

6.4 پاڻي مان پيدا ٿيندڙ بيماريون

پاڻيءَ مان پيدا ٿيندڙ وبائي بيماريون اهي بيماريون آهن جيڪي گندو پاڻي پيئڻ يا گندي پاڻي سان تيار ڪيل کاڌو کائڻ سان پکڙجن ٿيون. زهريلا مادا يا بيڪٽيريا پاڻي جي آلودگي جا ڪارڻ ٿي سگهن ٿا. آرسينڪ، پارو، ڪيلشيم، ليڊ ۽ مختلف نامياتي مادا زهريلي مادن جا مثال آهن. وائرس، بيڪٽيريا، پروٽوزوا ۽ ڪيڙا خوردبيني جاندارن (Microorganisms) جا مثال آهن. پاڻيءَ مان پيدا ٿيندڙ بيمارين جي تيزيءَ سان پکڙجڻ جو وڏو سبب صفائيءَ جو فقدان آهي ڪجهه عام بيماريون هي آهن:

1. اسهال (Diarrhea): آندڻ جون بيماريون جيڪي سنگين پاڻي جي کوٽ (Dehydration) جي سبب ٿي سگهن ٿيون، جهڙوڪ ڪولرا، وائرس، بيڪٽيريا ۽ مفت خور (Parasites) سڀ اسهال جو سبب بڻجي سگهن ٿا.
2. پيچش (Dysentery): پيچش هڪ قسم جو معدي جو وچڙندڙ مرض آهي جيڪو بيڪٽيريا يا مفت خورن جي ڪري ٿئي ٿو. ان ۾ خاص طور تي شديد اسهال ٿئي ٿو جنهن ۾ رت شامل ٿي سگهي ٿو.
3. ڪالرا: بيڪٽيريا Cholerae Vibrios، جيڪو شايد انساني نڪال (Faeces) ۾ ملي سگهي ٿو اهو ڪالرا بيماري جو ڪارڻ ٿئي ٿو. ڪالرا هڪ بيماري آهي جيڪا سخت اسهال ڪري ٿي ۽ موتمار ٿي سگهي ٿي.
4. ڪريپٽوسپوريڊيم (Cryptosporidium): اها معدي جي بيماري آهي جيڪا پاڻيءَ ۾ پيدا ٿيندڙ مائڪروب (Protozoa) جي ڪري ٿئي ٿي جيڪو اسهال ۽ الٽي جو سبب بڻجي ٿو. پاڻيءَ جا ذريعا جهڙوڪ ذخيره ٿيل پاڻي، ڍنڍون ۽ نديون سڀني ۾ خوردبيني جراثيم هوندا آهن.
5. فلوروسيس (Fluorosis): فلوروسيس هڪ حالت آهي جيڪا جسم ۾ تمام گهڻو فلورائيڊ جي ڪري ٿئي ٿي. فلوروسيس توهان جي هڏن ۽ ڏندن کي نقصان پهچائي سگهي ٿي.

[illegible]



خلاصو

- پاڻي زمين جي مٿاڇري تي سڀ کان وڌيڪ گهڻائي وارو مرڪب آهي. ان جو مکيه ذريعو مينهن، درياھ، ڍنڍون ۽ سمنڊ آهي.
- 97.5 سيڪڙو پاڻي لوڻيانو آهي، باقي پاڻي پيئڻ جو ڳو ۽ استعمال ڪرڻ جي قابل آهي.
- پاڻي ٻن هائيڊروجن ائٽم ۽ هڪ آڪسيجن ائٽم جو ٺهيل آهي.
- پاڻي کي هڪ عالمگير محلول سمجهيو ويندو آهي.
- پاڻي جي وڌ ۾ وڌ گهٽائي 4°C تي هوندي آهي، جڏهن ته ان جو ڄمڻ پد 0°C آهي ۽ تهڪڻ پد 100°C آهي.
- پاڻي جو 4°C تي غير معمولي رويو هائيڊروجن بانڊنگ جي ڪري ٿئي ٿو.
- پيئڻ جو پاڻي ڪيترن ئي مرحلن ۾ اڳتي وڌي ٿو جهڙوڪ Creeks، ڊيم، ڪينال، ٽريٽمينٽ پلانٽ، پائپ ۽ پوءِ گهر ۾.
- جنهن پاڻي ۾ لوڻ جي مقدار گهٽ هجي، ان کي نرم پاڻي چئبو آهي.
- جيڪڏهن لوڻ وڌيڪ مقدار ۾ حل ٿيل هجي ته سخت پاڻي ٺهي ٿو. پاڻيءَ ۾ سختي جا ٻه قسم آهن عارضي ۽ مستقل سختي.
- عارضي سختي ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جي بائيڪاربونيٽس سان ٺهي ٿي ۽ پاڻيءَ کي ٽهڪائڻ سان ختم ڪري سگهجي ٿي.
- مستقل سختي سلفيٽ ۽ ڪلورائيڊ جي لوڻ جي ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم سان ملي ٺهي ٿي.
- آبي آلودگي جا مکيه ذريعا گهرن مان نڪرندڙ گندگي جو پاڻي ۽ صنعتون جيڪي پاڻي ۾ مکيه آلودگي تي اثر انداز ڪن ٿيون.
- پاڻي جي آلودگي ڪيميائي ۽ مائڪروجرائيم ٿي سگهن ٿا.
- اهي بيماريون جيڪي آلودگيءَ سبب پيدا ٿين ٿيون، تن کي پاڻيءَ مان پيدا ٿيندڙ بيماريون چئجي ٿو.
- پاڻيءَ مان پيدا ٿيندڙ بيماريون وائرس، بيڪٽيريا ۽ پروٽوزوا سبب ٿين ٿيون. اسهال ۽ ڪولرا پاڻي مان پيدا ٿيندڙ مکيه بيماريون آهن.



مشق

ڀاڱو (الف): گهڻا چونڊ سوال

1. هيٺين مان ڪهڙي پاڻيءَ مان پيدا ٿيندڙ بيماري وائرل آهي.
(الف) ٽائيفائيڊ بخار (ب) پوليو (ج) پيچش (د) اسهال
2. ڌرتيءَ جي مٿاڇري جو ڪيترو سيڪڙو (%) پاڻي سان ڍڪيل آهي؟
(الف) 70% (ب) 60% (ج) 90% (د) 75%
3. پاڻي جي ماليڪيولز ۾ ڪهڙي قسم جو بانڊ هوندو آهي.
(الف) هائيڊروجن بانڊ (ب) آيونڪ بانڊ (ج) ڪوويلنٽ بانڊ (د) سيني
4. پاڻيءَ جي مستقل سختيءَ جو سبب آهي:
(الف) $MgSO_4$ (ب) $Mg(HCO_3)_2$ (ج) $Ca(HCO_3)_2$ (د) سيني
5. دريائن ۽ ڍنڍن ۾ ڪيترو تازو پاڻي آهي:
(الف) 0.3 سيڪڙو (ب) 3 سيڪڙو (ج) 0.2 سيڪڙو (د) 2 سيڪڙو
6. ڪهڙا لوڻ پاڻي ۾ تمام گهڻي مقدار ۾ ڳري عارضي سخت ڪن ٿا.
(الف) $CaSO_4$ ۽ $CaCl_2$ (ب) KNO_3 ۽ KCl (ج) $CaCO_3$ ۽ $FeSO_4$ (د) $Ca(HCO_3)_2$ ۽ $Mg(HCO_3)_2$
7. پاڻي هڪ _____ آهي.
(الف) قطبي محلل (ب) غير قطبي محلل (ج) ٻئي الف/ب (د) ڪو به نه
8. پاڻي جو ذائقو آهي:
(الف) کٽو (ب) ڪوڙو (ج) منو (د) بي ذائقو
9. هيٺين مان ڪهڙو مددگار آهي پاڻي جي عارضي سختي کي ختم ڪرڻ لاءِ:
(الف) Na_2CO_3 (ب) $(CaOH)_2$ (ج) $CaCO_3$ (د) Na_2SO_4

ڀاڱو (ب): مختصر سوال

1. پاڻي جي بگاڙ بيان ڪريو.
2. سخت ۽ نرم پاڻي جي وضاحت ڪريو.
3. پاڻي جي الودگي بيان ڪريو.
4. اسان ڪيئن عارضي سختي کي ختم ڪري سگهون ٿا؟
5. آلودو پاڻي پيئڻ سبب ٿيندڙ بيمارين جا نالا ٻڌايو.
6. سخت ۽ نرم پاڻي جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.

ڀاڱو (ج): تفصيلي سوال

1. پاڻي جي مستقل سختي کي ختم ڪرڻ جا طريقا لکو.
2. صنعتن جي ڪارڻ پاڻي جي آلودگي بيان ڪريو.
3. سخت پاڻي جا نقصان بيان ڪريو؟
4. پاڻي مان پيدا ٿيندڙ بيمارين جي تفصيل سان وضاحت ڪريو.



تجزیاتی کیمیا

باب 7

وقت جي ورهاست

تدریسی پیریڈ = 12
تشخیصی پیریڈ = 03
سلیبس ۾ حصو = 12%

اهم تصورات:

- 7.1 خاصیتی ۽ مقداری تجزیو
- 7.2 اہم مقداری پیمہ / پیرامیتر
- 7.3 کلاسیکل / پراٹا طریقہ
- 7.4 جدید آلاتی طریقہ

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (Student Learning Outcomes)

هن باب سکڻ کان پوءِ شاگرد:

- تجزیاتی کیمیا جا بنیادی تصورات بیان کری سگھندا.
- خاصیتی ۽ مقداری تجزیہ کی بیان کری سگھندا.
- اہم پیرامیتر، نقص، درستگی ۽ باقاعدگی کی جاڻی سگھندا.
- کلاسیکل ۽ جدید آلاتی طریقن ۾ فرق کری سگھندا.
- طیف بینی جھڙوڪ UV-visible ۽ Infrared طیف بینی کی بیان کری سگھندا.
- کرومیٹوگرافی جھڙوڪ:
- اعليٰ کارکردگی ڈیکارینڈر پٽڙو کرومیٹوگرافی (HPLC) ۽ گیس کرومیٹو گرافی جي باري ۾ جاڻی سگھندا.
- برقي کیمیائی طریقہ جھڙوڪ Potentiometric ۽ Conductometry جي باري ۾ جاڻی سگھندا.
- نون طریقن ۽ سائنسی پرک جي باري ۾ جاڻی سگھندا.
- پنهنجي دریافتن کی جدید ٹیکنالوجی جي مدد سان تجزیاتی کیمیا جي میدان (شعبی) ۾ جاڻی سگھندا.

تعارف

جيئن ته اسان ڄاڻون ٿا ته علم ڪيميا عام طور تي قدرتي سائنس طور سڃاتي وڃي ٿي. ڇاڪاڻ ته اها قدرت جي ڄاڻ سان لاڳاپيل آهي. علم ڪيميا ۾ انسانن لاءِ علم، نظرين ۽ انهن جي اطلاق جو هڪ سلسلو آهي، جهڙوڪ پلاسٽڪ، مصنوعي فائبر، ربڙ، صابن، دوائون، رنگ، جيت مار دوائون، جراثيم کش ۽ پيٽروڪيميڪل جون شيون وغيره. اڄ جي ڪيميا وسيع سطح تي زندگي جي سڀني شعبن ۽ انسانيت جي خدمت ۾ اڳ پري آهي. ڪيميادان مادي جي تحقيق ڪرڻ لاءِ سخت محنت ڪري رهيا آهن ۽ مادن کي پاڻ ۾ ملائي مختلف ڪيميائي مواد ٺاهي رهيا آهن. دنيا ۾ ڪيترائي درپيش مسئلا آهن جهڙوڪ کاڌي جو مسئلو، ماحولياتي تحفظ، حياتياتي ڪيميائي عمل ۽ توانائي جا نوان وسيلا جن کي ڪيمسٽري ذريعي حل ڪيو پيو وڃي. اهي سڀ مسئلا ۽ عمل مختلف مادن جي تجزيي تي ٻڌل آهن. مختلف طريقن ۽ آلاتن جي مدد سان نموني جي جزن کي ڳولڻ، انهن کي الڳ ڪرڻ ۽ انهن جي مقدار معلوم ڪرڻ جي تجزيي کي تجزياتي ڪيميا سڏيو ويندو آهي.

A 7.1 تجزياتي ڪيميا ڇا آهي؟

تجزياتي ڪيمسٽري اسان جي مادي دنيا کي ڏسڻ لاءِ گهربل طريقا ۽ آلات مهيا ڪري ٿي ۽ مادي بابت بنيادي سوالن جا جواب ڏئي ٿي. جهڙوڪ:

ڇا اوهان ڄاڻو ٿا؟




- ڇا؟
- ڪٿي؟
- گهڻا؟

- ڪهڙي جوڙجڪ/ ترتيب/ فارم؟

تجزياتي ڪيمسٽري مادي جي جزن کي الڳ ڪرڻ، سڃاڻڻ ۽ مقدار کي معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ آلاتن ۽ طريقن سان تعلق رکي ٿي. تجزياتي ڪيميا جو بنيادي مقصد تجزياتي طريقن سان مسئلن جي حل لاءِ عنصرن ۽ مرکبن جي تجزيي جي سمجهه پيدا ڪرڻ آهي.


تجزياتي ڪيمسٽري ڪيميا جي سڀني شعبن ۾ لاڳو ٿئي ٿي. جهڙوڪ: ميڊيسنل ڪيمسٽري، ڪلنيڪل ليبارٽريز، صنعتون، زراعت، کاڌي جي آلودگي ۽ ماحولياتي تحفظ.





B 7.1 تجزياتي ڪيميا جا قسم:

تجزياتي ڪيميا جي درجہ بندي



تجزياتي ڪيميا ٻن مکيه قسمن جي تجزين تي مشتمل آهي، جيڪي هن ريت آهن.

(1) خاصيتي تجزيو (Qualitative Analysis):

ڪنهن سيمپل ۾ موجود عنصر، آئن يا مرڪبن جي سڃاڻپ کي خاصيتي تجزيو سڏيو ويندو آهي. مادو هڪ نهرو، پٽڙو، گئس يا ملاوٽ ٿي سگهي ٿو. خاصيتي تجزيو مادي جي مقدار کي نٿو ماني پر ان مواد جي معيار / ڪوالٽي کي ماني ٿو. ڪيميائي ردعمل جي ذريعي يا آلاتن جي استعمال سان ڪنهن سيمپل جو خاصيتي تجزيو ڪيو ويندو آهي. مثال طور: ڪيميائي ٽيسٽ، شعلن واري / فليم ٽيسٽ وغيره جن ۾ رنگ تبديلي جو مشاهدو ڪري سگهجي ٿو.

ڪيميائي ٽيسٽ جي بنياد تي خاصيتي تجزيو وڌيڪ هن ريت ورهايل آهي:

(i) نامياتي خاصيتي تجزيو

(Organic Qualitative Analysis)



شڪل 7.1 نامياتي

خاصيتي تجزيو

اهو نامياتي مرڪبن جي مختلف فيميليز يا فنڪشنل گروپن جي سڃاڻپ سان تعلق رکي ٿو. اهو تجزيو ڪيميائي ردعمل ۾ رنگ جي تبديلي ذريعي ڪري سگهجي ٿو. مثال طور سلور نائٽريٽ (AgNO_3) کي ڇڏي نائٽريڪ ايسڊ (HNO_3) ۾ ملائڻ سان ڇاڻ جو نهڻ، هيلائيڊ ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) جي موجودگي کي ظاهر ڪري ٿو. جيئن شڪل 7.1 ۾ ڏيکاريل آهي.



(ii) غير نامياتي خاصيتي تجزيو (Inorganic Qualitative Analysis)

اهو تجزيو ردعمل ۾ عنصر ۽ آيونڪ تركيب جي سڃاڻپ سان تعلق رکي ٿو. مثال طور: ڪاپر هيلائيڊ جي فليم ٽيسٽ جيڪا ڪاپر جي موجودگيءَ سبب نيرڙو سائو رنگ ڏيکاريندي آهي. ٻين هيلائيڊ جي فليم ٽيسٽ هيٺ شڪل 7.2 ۾ ڏنل آهي.




شڪل 7.2 شعلن واري ٽيسٽ

(2) مقداري تجزيو (Quantitative Analysis)

ڪنهن سيمپل ۾ موجود هڪ يا هڪ کان وڌيڪ مادن جي مقدار جو تعين ڪرڻ کي مقداري تجزيو چئبو آهي. اهو وڏي تعداد جي طريقن سان ڪري سگهجي ٿو جن جي طبعياتي ۽ ڪيميائي طور تي درجہ بندي ڪئي وئي آهي. طبعياتي طريقا طبعي خاصيتن جي ماپ ڪن ٿا. جهڙوڪ ڪثافت، گرمي پد، روشني جي جذب، مقناطيسي اثرات، رنگ ۽ بناوت وغيره. طبعياتي طريقا جيڪي انهن خاصيتن کي ماپڻ لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن اهي هي آهن: فورٽر ٽرانسفارم انفراريڊ اسپيڪٽرو اسڪوپي (FTIR)، ايٽمي ايميشن اسپيڪٽرو اسڪوپي (AES)، گهٽ ليجنڊر عنصرن جو تجزيو ۽ توانائيءَ ۾ خلل پيدا ڪندڙ ايڪسري اسپيڪٽرو اسڪوپي (EDS).



تجزیاتی آلات ہیٹ تصویر ۾ ڈیکارین ٿا.



شکل 7.4 ایتمی ایمیشن
اسپیكترو اسکوپي


شکل 7.3 فورئر ٽرانسفارم
اسپیكترو اسکوپي



شکل 7.6 ایکسري اسپيكترو اسکوپي



شکل 7.5 ٽریس ایلیمینٹ
اینالائیزنگ انسٹرومینٹ



هميشه ياد رکو ته جڏهن به ڪوبه ڪيميادان ڪنهن به سيمپل ۾ موجود مرڪب جي مقدار معلوم ڪرڻ لاءِ ڪم ڪرڻ شروع ڪري ٿو ته سڀ کان پهريان انهيءَ سيمپل جو خاصيتي تجزيو ڪري سيمپل ۾ موجود مختلف مرڪبن جي سڃاڻپ ڪري ٿو ان کان پوءِ مقداري تجزيي جي طريقن ڪار جو اطلاق ڪري سيمپل ۾ مرڪبن جي مقدار جو تعين ڪري ٿو.

آزمائشی سوال



- ◆ تجزياتي ڪيميا جي وصف لکو؟
- ◆ ثابت ڪريو ته تجزياتي ڪيميا، ڪيميا جي سڀني شاخن جو حصو آهي؟
- ◆ ثابت ڪريو ته ڪنهن به سيمپل جي مرڪبن جي مقدار کي معلوم ڪرڻ لاءِ پهريون قدم خاصيتي تجزيو آهي؟
- ◆ بحث ڪريو ته ڪهڙو طريقو مادي جي طبعياتي خاصيتن سان تعلق رکي ٿو؟
- ◆ مقداري ۽ خاصيتي تجزيي جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو؟



7.2 اهم مقداري پيما (Important Parameters)


مقداري پيما هڪ ماپ جوڳي حد آهي جيڪا تجزياتي طريقن جي ڪارڪردگي ۽ معيار کي بيان ڪري ٿي. ڪنهن به تجزياتي طريقي جي تصديق (Validation) جو مشاهدو پيراميٽرز ذريعي ڪيو ويندو آهي ۽ تصديق جا مختلف مقداري پيما هي آهن: چونڊ (Selectivity)، خطي (Linearity)، حد (Range)، درستگي (Accuracy)، باقاعدي (Precision) ۽ نقص / غلطي (Error).

هن باب ۾ اسين ٽن اهم پيراميٽرن تي بحث ڪنداسين.

- نقص / غلطي (Error)
- درستگي (Accuracy)
- باقاعدي (Precision)

7.2.1 نقص / غلطي (Error)

اسان ڄاڻون ٿا ته هر قسم جي تجزياتي طريقن يا تجربن ۾ اسان کي ڪيتريون ئي غلطيون ۽ انحراف نظر اچن ٿا. اهي غلطيون 13 سيڪڙو آلاتن جي خرابي جي ڪري، 13 سيڪڙو انساني غلطين جي ڪارڻ، 16 سيڪڙو سيمپل تيار ڪرڻ ۽ 10 سيڪڙو غلط پيمانن بندي (Calibration) جي ڪري ٿين ٿيون، تنهن ڪري اسان چئي سگهون ٿا ته نقص پيدا ڪرڻ وارا اهم عنصر آلاتن ۾ خرابي، تجزياتي آلاتن جي سنڀال ۾ گهٽتائي يا مشين جو صحيح ڪم نه ڪرڻ آهن.



شڪل 7.10 غلطين کي ماپڻ


نقص کي ”اصل قيمت (True value) ۽ مشاهدي واري قيمت (Observed value) جي وچ ۾ فرق طور تي“ بيان ڪري سگهجي ٿو. تجزياتي ڪيميا ۾ غلطيون منظم (Systematic) ۽ بي ترتيب وار (Random) غلطين جي طور تي درجه بندي ٿيل آهن.

منظم غلطي (Systematic Error): منظم غلطي کي ڊٽرمينيت (Determinate) غلطي پڻ چئبو آهي ۽ اها غلطي تجزياتي طريقي ۾ غلطي يا تجزياتي آلاتن جي خرابي سبب ٿيندي آهي. منظم غلطي آلاتن واري، مشاهدي واري، ماحولياتي ۽ نظرياتي پڻ ٿي سگهي ٿي. مثال طور اها غلطي هڪ ٿرماميٽر، پيٽ بيوريٽ، تجزياتي ميزان / بيلنس ۽ واليوميٽرڪ ماپ واري تجزياتي سامانن ۾ ٿيندي آهي. منظم غلطي جي ڪابه خاص وصف نه آهي ڇو ته اها مختلف تجربن لاءِ مختلف هوندي آهي.

مثال طور: تيزاب اساس معائنه (Titration) ۾ جيڪڏهن pH انڊيڪيٽر صحيح طرح تيار نه ڪيو ويو ته رنگ جي تبديلي مساوي گرفت (Equivalence point) کان اڳ ظاهر ٿيندي يا جيڪڏهن بيوريٽ کي صحيح طرح صاف نه ڪيو ويو ته اها منظم غلطي جو سبب بڻجندي.



ڪنهن به منظم غلطي جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ۽ ان کي ختم به ڪري سگهجي ٿو پر هر طبعياتي ماپ (Physical measure) ۾ هميشه ڪجهه غير يقيني صورتحال موجود هوندي آهي ۽ ان کي نظر انداز ڪيو ويندو آهي.



شڪل 7.11 معاثره (Titration)

بي ترتيب غلطيون (Random Error): بي ترتيب غلطيون غير ڊٽرمينيت آهن ۽ اهي طريقيڪار ۾ تبديلين، ماحولياتي عنصر ۽ تجزياتي آلات جي خامين جي ڪري ٿينديون آهن. بي ترتيب غلطين کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي ۽ اهي مثبت ۽ منفي ٿي سگهن ٿيون. تجزياتي ميزان / بيلنس تي سيمپل جي ماپي کي ماپڻ وقت بيلنس يا سيمپل تي هوا يا پاڻي جي اثر جي ڪري بيلنس مختلف انگ اکر ڏيکاري سگهي ٿو.

مثال طور: تيزاب اساس جي معاثره دوران اسان 500 cm^3 واري بيوريٽ استعمال ڪريون ٿا جنهن جي صحيح ريڊنگ وڌ ۾ وڌ صرف 0.1 cm^3 تائين ماپي سگهون ٿا. جيئن ته اسان پڙهي چڪا آهيون بي ترتيب واري غلطي مثبت ۽ منفي ٿي سگهي ٿي ۽ ان غلطي کي ختم نٿو ڪري سگهجي ان لاءِ اسان تجربي دوران ڪيترائي ڀيرا ريڊنگ نوٽ ڪري آخر ۾ انهن جي اوسط ڪڍندا آهيون.

7.2.2 درستگي (Accuracy)

هڪ سيمپل جي حاصل ڪيل قيمت (Obtained value) جو ان جي حقيقي قيمت (Actual value) جي ويجهو هجڻ تجزياتي طريقي جي درستگي سڏائي ٿي. مثال طور جيڪڏهن توهان ڪنهن سيمپل جو وزن 2.5 mg حاصل ڪيو پر ان سيمپل جو حقيقي يا ڄاڻايل وزن 10 mg آهي ته پوءِ توهان جي ماپ درست ناهي. سڀ کان وڌيڪ ڏکيو پيراميٽر درستگي کي حاصل ڪرڻ آهي. درستگي حاصل ڪيل قيمت ۽ اصل قيمت جي مشابهت جو درجو آهي. هڪ مطلق اصل قيمت کي حاصل ڪرڻ تمام ڏکيو آهي ان ڪري درستگي صحيح وصف هن ريت ٿيندي ته ”حاصل ڪيل قيمت ۽ اصل قيمت جي وچ ۾ مشابهت کي درستگي چئبو آهي.“ هميشه ياد رکڻو ته درستگي جو دارومدار باقاعديگي (Precision) تي نه هوندو آهي، مثال طور جڏهن ڪاپر جي ڪثافت کي ماپيو وڃي جنهن جي اصل قيمت 8.99 g/ml آهي ۽ ماپ جا حاصل نتيجا 10.0 , 8.0 ۽ 9.3 g/ml اچن ۽ انهن جي اوسط 9.1 g/ml نڪري ته پوءِ اها قيمت قابل قبول اصل قيمت جي ويجهي آهي ۽ ان قيمت کي صحيح / درست قيمت سمجهيو ويندو.

7.2.3 باقاعديگي (Precision)

ان جي وصف هن ريت آهي ته ”هڪ ئي مقدار جي حاصل ڪيل ساڳين يا هڪ ٻئي جي ويجهو قيمتن جي مشابهت کي باقاعديگي چئبو آهي.“ ان ۾ حاصل نتيجا بار بار ورجائيا آهن ان ڪري ان کي صحيح جو درجو (Degree of Exactness) پڻ سمجهيو ويندو آهي. باقاعديگي اهو ماپي ٿي ته ڪنهن سيمپل جي ڪيتري تفصيلي ڄاڻ ڏني وئي آهي ۽ ڪيتري قدر ماپ درست آهي.



ڪنهن ماپ ۾ باقاعدي ۽ درستگي ٻنهي مان ڪا هڪ ٿي سگهي ٿي يا ٻئي ٿي سگهن ٿيون يا وري ٻئي نه به ٿي سگهن ٿيون. هڪ ماپ صحيح تڏهن هوندي آهي جڏهن ان ۾ باقاعدي ۽ درستگي ٻئي هجن.

مثال طور چار شاگرد ايلومينيم جي ڪثافت (2.7 g/ml) کي ماپڻ لاءِ هڪ تجربو ڪري رهيا آهن ۽ هيٺ ڏنل جدول ۾ ڏيٽا نوٽ ڪئي اٿن جيڪا باقاعدي ۽ درستگي جا مختلف پهلو ڏيکاري ٿي، جيئن ته شاگرد نمبر 1 جي ماپ ۾ باقاعدي آهي، ڇاڪاڻ ته 2.9 ريڊنگ مجموعي طور تي ورجائي رهيو آهي پر ان ۾ درستگي نه آهي ڇو ته اها اصل قيمت جي ويجهو ناهي. شاگرد نمبر 2 جي ماپ ۾ نه درستگي آهي نه ئي باقاعدي ڇو ته نوٽ ڪيل قيمت نه ورجائجي ٻئي نه وري اصل قيمت جي ويجهو آهي ۽ ساڳي طرح شاگرد نمبر 3 جي ماپ ۾ باقاعدي ناهي پر درستگي آهي ڇو ته ان جي ماپ اصل قيمت جي ويجهو آهي جڏهن ته شاگرد نمبر 4 جي ماپ ۾ درستگي ۽ باقاعدي ٻئي آهن ان ماپ کي صحيح سمجهيو ويندو.

نمبر شمار	شاگرد نمبر 1	شاگرد نمبر 2	شاگرد نمبر 3	شاگرد نمبر 4
1.	2.924 g/ml	2.316 g/ml	2.649 g/ml	2.701 g/ml
2.	2.923 g/ml	2.527 g/ml	2.731 g/ml	2.699 g/ml
3.	2.925 g/ml	2.941 g/ml	2.695 g/ml	2.702 g/ml
4.	2.926 g/ml	2.136 g/ml	2.742 g/ml	2.698 g/ml
5.	باقاعدي	غير باقاعدي	غير باقاعدي	باقاعدي
	غير درستگي	غير درستگي	درستگي	درستگي

مٿي ڏنل مثال ڏيکاري ٿو ته سٺي باقاعدي سٺي درستگي کي يقيني نٿي بڻائي پر هڪ صحيح ماپ لاءِ سٺي عمدگي سان گڏوگڏ درستگي جي به ضرورت هوندي آهي.

پاڻ کي آزمايو

- ثابت ڪريو ته تيزاب اساس جي معائنه ۾ منظم غلطي هوندي آهي؟
- درستگي ۽ باقاعدي جي وچ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

7.3 ڪلاسيڪل طريقو (Classical Method)

ڪلاسيڪل طريقو بنيادي طور تي ليبارٽري مشق جو هڪ فن آهي اهو ڪيميائي تجزيي جو هڪڙو روايتي طريقو آهي ۽ ان کي آلي ڪيميائي طريقو (Wet chemical method) سان پڻ سڃاتو وڃي ٿو. ڪلاسيڪل طريقا آهي تجزياتي فن آهن جن ۾ تجزياتي بيٺنس کان علاوه ٻئي ڪنهن به مشيني يا اليڪٽرانڪ اوزار کي استعمال ناهي ڪيو ويندو. اهو طريقو بنيادي طور تي Analyte ۽ Reagents جي وچ ۾ ڪيميائي ردعمل سان لاڳاپيل آهي. ڪلاسيڪل طريقن ۾ خاصيتي ۽ مقداري تجزيا پڻ شامل آهن جيئن ڪواليتيٽو تجزيي ۾ فليم / شعلن واري ٽيسٽ اچي ٿي ۽ معائري ۽ گريويميٽرڪ تجزيا وري مقداري تجزيي جا قسم هوندا آهن.

7.3.1 معائري تجزيو (Titrimetric Analysis)

معلوم مقدار جي مدد سان ڪنهن حل / ڳار جي حجم (Volume) جو تعين ڪرڻ لاءِ



معائري تجزيي کي استعمال ڪيو ويندو آهي. معائري تجزيي کي حجم وارو تجزيو (Volumetric Analysis) پڻ چيو ويندو آهي. ان ۾ جنهن متعمل (Reagent) جو حجم وارو تجزيو ڪيو ويندو آهي ان کي Titrant پڻ سڏبو آهي.

معائري تجزيي لاءِ عام ڪيميائي ردعمل هن ريت آهي.

$$aA + tT \longrightarrow \text{حاصلات}$$

هتي ”a“ هڪ Analyte جي مولز جو تعداد آهي جيڪو تائرنٽ T جي t مولز سان ڳار ۾ ردعمل ڪري ٿو، ان عمل کي معائره (Titration) چيو وڃي ٿو. اهو ردعمل هڪ فلاسڪ ۾ ڪيو ويندو آهي جنهن ۾ ڳاريل Analyte موجود هوندو آهي جڏهن ته بيوريت ۾ تائرنٽ جو حل هوندو آهي جيڪو حجم طور تي ردعمل لاءِ فلاسڪ ۾ ملايو ويندو آهي. جڏهن ڪيميائي ردعمل لاءِ تائرنٽ جي ڪافي مقدار Analyte جي ڳار ۾ ملائڻ کان پوءِ مساوي گرفت (Equivalence point) تي پهچندي آهي تڏهن معائره جو عمل پورو ٿيندو آهي. تائرنٽ جي وصف هن ريت بيان ڪري سگهجي ”اهو هڪ عمل آهي جنهن ۾ ڪنهن مادي جي ڄاڻيل مقدار جي مدد سان ٻئي مادي جي مقدار معلوم ڪئي ويندي آهي.“

ڇا توهان کي خبر آهي؟



تائرنٽ ڇا آهي؟


اهو هڪ مادي جو ڳار آهي جنهن جي مقدار معلوم هوندي آهي ۽ ان جي مدد سان ٻئي مادي جي مقدار کي معلوم ڪيو ويندو آهي. مثال طور HCl, NaOH

اينلائيٽ ڇا آهي؟

اهو هڪ ڪيميائي مادو آهي جيڪو ڪيميائي تجزيي جو اهم جز آهي ۽ تائرنٽ جي ان جي مقدار کي معلوم ڪيو ويندو آهي.

پڌرو ڪندڙ (Indicator) ڇا آهي؟

اهو هڪ مادو آهي جيڪو تيزابي ۽ اساسي حل ۾ رنگ تبديل ڪري ٿو. مثال طور لٽمس پيپر، فئالفٽلين، ميٿائل اورنج وغيره.



شڪل 7.12 معائره عمل (Titration)

7.3.2 گريويميٽرڪ تجزيو (Gravimetric Analysis)

ڪيميائي تجزيي ۾ مقدار جو اندازو معلوم ڪرڻ لاءِ گريويميٽرڪ تجزيو سڀ کان پراڻي ۽ اهم ٿيڪنڪ آهي. هن ٽيڪنڪ ۾ ماس جي حساب سان سيمپل ۾ موجود جزن جو تعين ڪيو ويندو آهي ۽ اهو طريقو مقدار جي اندازي لاءِ سڀ کان وڌيڪ صحيح تجزياتي طريقو آهي. هن تجزيي ۾ اينلائيٽ جي مقدار جو اندازو لڳائڻ لاءِ اينلائيٽ کي ڪنهن پيداوار (Product) ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي ۽ پوءِ ان جو وزن معلوم ڪيو آهي. مثال طور توهان AgCl جي حل ۾ موجود ڪلورين (Cl) جي مقدار کي معلوم ڪرڻ چاهيو ٿا ته پوءِ توهان کي گريويميٽرڪ تجزيي لاءِ هيٺين چار مرحلن مان گذرڻو پوندو.

(1) سيمپل (AgCl) جي معلوم ماس / وزن جو ڳار ٺاهيو.



- (2) گهربل جز کلورين (Cl) کي ڌار ڪريو.
 - (3) ڌار ٿيل وزن جو وزن معلوم ڪريو.
 - (4) سيمپل جي جدا ٿيل وزن جي مقدار جو حساب ڪريو.
- گريويميٽرڪ گڻپ ۾ مرڪب جي گرامن کي واحد عنصر جي گرام ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي. گريويميٽرڪ تجزيي جا چار قسم آهن: Thermo, Precompetitive, Electro Gravimetric ۽ Physical تجزيو.

آزمائشي سوال



- معائنه عمل جي وضاحت ڪريو ۽ ان ۾ ڪهڙو سامان (Apparatus) استعمال ڪيو ويندو آهي؟
- اسان معائنه عمل ۾ پڌرو ڪندڙ ڇو استعمال ڪندا آهيون؟
- گريويميٽرڪ تجزيي جا مرحلا بيان ڪريو؟

7.4 جديد آلاتي طريقا (Advanced Instrumental Methods)

تجزياتي ڪيمسٽري ڪيترن ئي جديد طريقن تي مشتمل آهي، جنهن ۾ ملاوت ۽ مرڪبن جو تجزيو ڪرڻ ۽ انهن کي الڳ ڪرڻ لاءِ آلاتن جو استعمال ڪيو ويندو آهي. اهي طريقا مقداري ۽ خاصيتي تجزيي طور تي استعمال ٿيندا آهن. تجزيي جي انهن جديد طريقن ۾ اسپيڪٽرو اسڪوپي، ڪروميٽوگرافي، اليڪٽرو ڪيميڪل طريقا، ٽرا وائلٽ ۽ ويزيبل اسپيڪٽرو اسڪوپي، انفرا ريڊ اسپيڪٽرو اسڪوپي، گيس ڪروميٽوگرافي، پوٽينشيوميٽرڪ ۽ ڪنڊڪٽوميٽرڪ شامل آهن. اسان هن باب ۾ انهن جديد انسٽرومينٽل طريقن تي تفصيل سان بحث ڪنداسين.

7.4.1 طيف بيني جا طريقا (Spectroscopic Methods)

طيف بيني (Spectroscopy) ۾ روشنيءَ جو مادي سان تعامل ڪرڻ کي پڙهيو ويندو آهي. روشني برقياتي مقناطيس موج (Wave) مان ٺهيل آهي، ان ڪري تابڪاري توانائي جو مادي سان تعامل ڪرڻ کي طيف بيني سڏيو ويندو آهي. طبعياتي ۽ تجزياتي ڪيميا ۾ مادي جي اميشن ۽ ايزاريشن طيف (Spectrum) ذريعي سڃاڻپ ڪرڻ لاءِ طيف بيني استعمال ڪئي ويندي آهي. روشني جو مادي سان تعامل هيٺي شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.



اسپيڪٽرواسڪوپي ۾ مادي جي مقدار جو پڻ اندازو لڳايو ويندو آهي ۽ ان ۾ جيڪي آلات استعمال ٿيندا آهن انهن کي طيف پيما اسپيڪٽرو فوٽوميٽر يا طيف نگار چئبو آهي. ايٽمي


۽ ماليڪيولي اسپيڪٽرو اسڪوپي جا ڪيترائي قسم آهن، پر هتي اسين ٽرا وائلٽ (UV) ۽ انفرا ريڊ (IR) طيف بيني تي تفصيل سان بحث ڪنداسين.

شڪل 7.13 طيف بيني طريقو



7.4.1.1 التراوائلت ۽ وزيل (Uv-Visible) طيف بيني

التراوائلت ۽ وزيل اسپيڪٽرو اسڪوپي کي اليڪٽرانڪ اسپيڪٽرو اسڪوپي پڻ چيو ويندو آهي. اها هڪ مقداري (Quantitative) ٽيڪنڪ آهي جيڪا ٻڌائي ٿي ته هڪ ڪيميائي مرڪب روشني کي ڪيترو جذب ڪري ٿو. ان ٽيڪنڪ ۽ سيمپل منجهان گذرندڙ روشني جي شدت (Intensity) کي ماپيو ويندو آهي. هن اسپيڪٽرو اسڪوپي جو بنيادي اصول روشني ۽ مادي جي وچ ۾ تعامل آهي. هن ٽيڪنڪ ۾ الترا وائلت روشني استعمال ٿيندي آهي ۽ جڏهن ڪيميائي سيمپل الترا وائلت روشني جذب ڪندو آهي ته اسپيڪٽرم ٺهندو آهي. التراوائلت ۽ وزيل اسپيڪٽرو اسڪوپي جي موجي جهول (Wavelength) جي حد 192 کان 900 نينو ميٽر (nm) آهي.




شڪل 7.14 UV-visible اسپيڪٽرو اسڪوپي

7.4.1.2 انفراريڊ طيف بيني (Infrared Spectroscopy)

انفراريڊ اسپيڪٽرو اسڪوپي سن 1950ع ۾ متعارف ڪرايل هڪ تجزياتي ٽيڪنڪ آهي، جيڪا گهٽ وقت ۾ گهٽ خرچ ۾ سيمپل جي خاصيتي ۽ مقداري معلومات جو اندازو لڳائي ٿي. اها ٽيڪنڪ هائيڪار ناهي ڇو ته هن ٽيڪنڪ ۾ تجزيي لاءِ ڪنهن به قسم جي آلودگي ڪندڙ ڪيميائي مادي جي ضرورت ناهي هوندي. اها ٽيڪنڪ بنيادي طور تي ليبارٽري يا صنعت ۾ خوراڪ جي شين، پوليمر وغيره ۾ موجود فنڪشنل گروپ جي سڃاڻپ لاءِ استعمال ٿيندي آهي. اها مختلف صنعتن ۾ معيار جي ڪنٽرول لاءِ هڪ مؤثر ٽيڪنڪ آهي. اهي برقياتي مقناطيسي (Electromagnetic) شعاعون جنجي توانائي وزيل شعاعن جي پيٽ ۾ گهٽ هجي تن کي انفراريڊ شعاعون چئبو آهي. انفراريڊ روشني جي موجي جهول $2.5 \mu\text{m}$ کان 15 ٽائين يا 4000 کان 625 cm^{-3} ٽائين آهي. جڏهن انفراريڊ شعاع هڪ نامياتي ماليڪيول مان گذرن ٿا ته جذب ڪيل توانائي ماليڪيولز ۾ ارتعاش (Vibration) پيدا ڪرڻ لاءِ ڪافي هوندي آهي ۽ جيڪا توانائي جذب نه ٿيندي آهي اها سيمپل منجهان گذري ويندي آهي. ان ٽيڪنڪ کي ارتعاشي طيف بيني (Vibrational Spectroscopy) طور پڻ سڃاتو وڃي ٿو.



شڪل 7.16 اسپيڪٽروفوٽوميٽر



شڪل 7.15 طيف



7.4.2 کرومیتوگرافڪ طريقا (Chromatographic Methods)

کرومیتوگرافي جديد تجزياتي ٽيڪنالوجي آهي جيڪا مرکبات کي الڳ ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿي. اها ٽيڪنڪ ملاوت جي جزن کي ڌار ڪرڻ سان گڏوگڏ انهن کي خالص بنائڻ جي پڻ سهولت فراهم ڪري ٿي. ان ۾ وولٽائيل، غير وولٽائيل، قطبي، غير قطبي، نامياتي ۽ غير نامياتي مرکبن جي ملاوت استعمال ڪري سگهجي ٿي.



ڇا توهان کي خبر آهي؟


- **موبائل فيز (Mobile Phase) ڇا آهي؟**
اهو پٽڙو يا محلول جيڪو اسٽيشنري فيز منجهان مرکبن جي ملاوت کڻي گذري ان کي موبائل فيز چئبو آهي.
- **اسٽيشنري فيز (Stationary Phase) ڇا آهي؟**
اهو فيز هڪ هنڌ بيٺل هوندو آهي ۽ اهو قطبي ٿي سگهي ٿو.
- **ريٽينشن ٽائيم (Retention Time) ڇا آهي؟**
ملاوت جي ڪنهن جز جو ڌار ٿيڻ کان وٺي ڪالم مان نڪرڻ تائين جي وقت کي ريٽينشن ٽائيم چئجي ٿو. ان جي مدد سان جزن جي سڃاڻپ ٿيندي آهي.

کرومیتوگرافي جو عمل موبائل فيز سان شروع ٿيندو آهي جنهن ۾ مرڪب حل ٿيل هوندا آهن. موبائل فيز مرکبن جي ملاوت کڻي اسٽيشنري فيز منجهان گذرندو آهي. موبائل فيز ۾ موجود مرکبن جي ملاوت جا جز اسٽيشنري فيز ۾ مختلف رفتار سان اڳيان وڌندا آهن ۽ انهن جو ريٽينشن (Retention) ٽائيم به هڪ ٻئي کان مختلف ٿيندو آهي.

کرومیتوگرافيءَ جا اهم قسم گئس (Gas) کرومیتوگرافي ۽ پٽڙو (Liquid) کرومیتوگرافي آهن، جن تي هن باب ۾ تفصيل سان بحث ڪيو ويو آهي.

7.4.2.1 اعليٰ کارڪردگي ڏيکاريندڙ پٽڙو کرومیتوگرافي (HPLC) HPLC ڇا آهي؟

HPLC کي High Performance Liquid Chromatography مان ورتو ويو آهي ۽ ان کي ڪڏهن ڪڏهن High Pressure Liquid Chromatography پڻ چيو وڃي ٿو. ان ٽيڪنڪ ۾ ملاوت جي جزن کي گهڻي دٻ تي الڳ ڪيو ويندو آهي. HPLC جي مشين موبائل فيز جي ذخيри، هڪ پمپ، هڪ انجڪٽر، هڪ علحدگي ڪرائيندڙ ڪالم، هڪ ڊيٽيڪٽر ۽ ڊيٽا ڏيکاريندڙ ڪمپيوٽر تي مشتمل هوندي آهي. موبائل فيز کي گهڻي دٻ سان ڪالم مان گذاريو ويندو آهي جيڪو جاذب (absorbent) مادي سان ڀريل هوندو آهي. تنهنڪري جزن جي علحدگي وڌيڪ تيزي سان ٿيندي آهي. پريشر ميڪيڪل پمپ موبائل فيز جي تيز وهڪري کي يقيني بڻائي ٿو. موبائل فيز جي وهڪري جي رفتار ملاوت جي جزن جي علحدگي کي متاثر ڪري ٿي. ملاوت جو ڪو جز ڪالم مان جيئن ئي گذري ٿو، ڊيٽيڪٽر ان جي نڪرڻ (Elution) کي نوٽ ڪري ٿو ۽ رڪارڊر ڏانهن سگنل موڪلي ٿو.



شکل 7.17 HPLC

اها ٽيڪنڪ دوائن جي دريافت، ڪلينيڪل تجزيي، ڪاسميٽڪ تجزيي، دوا سازي، ماحولياتي ڪيميا ۽ بايو ڪيميڪل جينياتيات ۾ استعمال ٿيندي آهي.

7.4.2.2 گئس ڪروميٽوگرافي (Gas Chromatography)

گئس ڪروميٽوگرافي ڇا آهي؟

ڇا توهان کي خبر آهي؟




• وولٽائل مرڪبات ڇا آهن؟

وولٽائل مرڪب اهي نامياتي مرڪبات آهن جن ۾ بخار داب (Vapour Pressure) وڌيڪ هوندو آهي ۽ انهن جي پاڻيءَ ۾ حل ٿيڻ جي صلاحيت گهٽ هوندي آهي جهڙوڪ Petrol, Benzene, Toluene وغيره.

گئس ڪروميٽوگرافي هڪ ٽيڪنڪ آهي جيڪا تجزياتي ڪيميا ۾ وولٽائل مرڪبات کي الڳ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي. لفظ گئس ڪروميٽوگرافي مان واضح ٿئي ٿو ته اها ٽيڪنڪ گئس جي حالت ۾ موجود مرڪب ۽ وولٽائل پٽڙو مرڪبن کي الڳ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي.

ملاوت جي جزن جي عليحدگي موبائل فيز (گئس) ۽ اسٽيشنري فيز (پٽڙو يا نهرو) جي وچ ۾ تعامل سان ٿيندي آهي. پهرين گئس ڪروميٽوگرافي 1950ع ۾ نوبل انعام ماڻينڊڙ جان پورٽر مارٽن متعارف ڪرائي ۽ ان کي جديد گئس ڪروميٽوگرافيءَ جو باني قرار ڏنو ويو آهي.

گئس ڪروميٽوگرافي جي مشين گئس سلنڊر، سيمپل، انجڪٽر، گئس ڪروميٽوگراف، ڊيٽيڪٽر ۽ ڊيٽا گڏ ڪرڻ واري ڪمپيوٽر تي مشتمل هوندي آهي. گئس سلنڊر ۾ موبائل فيز هوندو آهي ۽ اهو سلنڊر گئس جي وهڪري کي سيمپل انجڪٽر تائين پڻ ڪنٽرول ڪري ٿو. موبائل فيز اڳتي وڌي ڪالم ۾ داخل ٿيندو آهي جنهن ۾ اسٽيشنري فيز هوندو آهي ۽ ان جو گرمي پد مستقل هوندو آهي. جڏهن ملاوت جو جز ڌار ٿي ڪالم مان جيئن ئي نڪرندو آهي، ڊيٽيڪٽر Elution کي نوٽ ڪندو آهي ۽ ڊيٽا گڏ ڪرڻ واري ڊوائيس (ڪمپيوٽر) ڏانهن سگنل موڪليندو آهي.




شکل 7.18 گئس کرومیتوگرافي

گئس کرومیتوگرافي غير نامياتي مرکب، کاربوہائیڈریٹ، پروٽين، لپڊس، وٽامن، آلودگي ڪندڙ جهڙوڪ پلاسٽڪ مواد ۽ کير جي پيداوار شين جي تجزيي ۾ استعمال ڪئي وئي آهي.

7.4.3 برقي ڪيميائي طريقا (Electrochemical Methods)

اليڪٽرو ڪيميڪل يا برقي ڪيميائي طريقو هڪ تجزياتي ٽيڪنڪ آهي جيڪا ڪنهن ڳار جي برقي صلاحيت، برقي چارج ۽ برقي خاصيتن کي ماپي ٿي. ان ٽيڪنڪ ۾ ماپ لاءِ مخصوص انسٽرومينٽ استعمال ٿيندا آهن تنهنڪري ان کي جديد تجزياتي ٽيڪنڪ پڻ چيو ويندو آهي. اها ٽيڪنڪ کارگر آهي ڇو ته اها وقت بچائي ٿي ۽ ان ۾ ڪنهن به قسم جو ڪو انڊيڪيٽر استعمال ناهي ٿيندو.



شکل 7.19 اليڪٽروڪيميڪل سيل

اليڪٽرو ڪيميڪل تجزياتي طريقو ڪيميڪل سيل جي مدد سان ڪيو ويندو آهي جنهن جي شڪل هيٺ ڏنل تصوير ۾ ڏيکاري وئي آهي، عام طور تي اهو برقيرن تي مشتمل هوندو آهي جن کي واڌو برقي چيٽو (Anode) ۽ ڪاٽو برقي چيٽو (Cathode) سڏيو ويندو آهي. آڪسجڻ (Oxidation) جي ردعمل دوران اليڪٽرانن جي خارج ٿيڻ جي ڪري اينوڊ ڪاٽو بار وارو هجي ٿو ۽ ڪيٿوڊ عمل تخفيف (Reduction) جي نتيجي ۾ اليڪٽران جي گهٽتائي سبب واڌو بار وارو هوندو آهي. اليڪٽرو ڪيميڪل سيلز ٻن اڌ سيلن تي مشتمل آهي ۽ ٻنهي برقيرن (اينوڊ ۽ ڪيٿوڊ) سان ڳنڍيل هوندا آهن. هر برقيرو برق پاش (Electrolytic) ۾ ٻڌل هوندو آهي. اڌ سيلز پاڻ ۾ لوڻيائي برج (NaCl) جي ذريعي ڳنڍيل هوندا آهن، جيڪو آئنس جو تعامل ٿيڻ نه ڏيندو آهي ۽ ائٽڪ رابطي لاءِ پليٽ فارم مهيا ڪري ٿو، جيئن اسان بحث ڪيو ته اڌ سيلز مان هڪ آڪسائيڊيشن جي ڪري اليڪٽران کي خارج ڪري ٿو ۽ ٻيو اڌ حصو ريڊڪشن جي عمل جي ڪري اليڪٽران حاصل ڪري ٿو. هميشه ياد رکو ته جڏهن ٻنهي اڌ سيلز ۾ توازن جو مرحلو اچي ٿو ته مجموعي وولٽيج ٻڙي ٿي وڃي ٿو ۽ سيل ذريعي بجلي جي پيداوار بند ٿي ويندي آهي.



شکل 7.20 وولٹاميٽر

7.4.3.1 قوت پيما (Potentiometry)

اهو هڪ طريقو آهي جيڪو برقي تجزياتي ڪيميا ۾ پوٽينشوميٽري ماپ دوران حل ۾ محلول جي مقدار کي معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ٻن اليڪٽروڊز جي وچ ۾ برقي قوت (Potential) کي وولٽميٽر ذريعي ماپيو ويندو آهي. هن ۾ بجلي جو وهڪرو نه ٿيندو آهي. پوٽينشوميٽرڪ تجزيو پاڻي، دوا سازي ۽ آلودگي ڪنڌڙن جي تجزيي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ڪلينيڪل ڪيمسٽري ۽ کاڌي جي صنعتن ۾ معياري ڪنٽرول لاءِ پڻ ان کي استعمال ڪيو ويندو آهي.

7.4.3.2 ڪنڊڪٽوميٽري (Conductometry)



شکل 7.21 ڪنڊڪٽوميٽري

اها هڪ اهم تجزياتي ٽيڪنڪ آهي جيڪا طبعياتي ڪيميائي تجزيي ۾ استعمال ٿئي ٿي. ان کي هن ريت بيان ڪري سگهجي ٿو ته ”اها هڪ تجزيي جي ٽيڪنڪ آهي جيڪا بجلي جي پسرائڻ (Electrical conductance) تي دارومدار رکي ٿي ۽ اهو عمل ڪنڊوميٽر جي مدد سان ڪيو ويندو آهي. ڪنڊڪٽوميٽري جا استعمال:

- تقسيم جي مستقل (Dissociation constant) درجي جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.
- گهٽ حل ٿيندڙ لوڻ جي حل جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.
- هڪ ردعمل جي ريٽ واري مستقل جو اڀياس ڪري سگهجي ٿو.
- معاثره ردعمل جي آخري حد (Endpoint) جو تعين ڪري سگهجي ٿو.

ڪلاسيڪل ۽ انسٽرومينٽل طريقن ۾ فرق

آلاتي طريقو	ڪلاسيڪل طريقو
1. اهو حساس ۽ ٽيڪنيڪل آهي.	1. اهو طريقو سادو ۽ صحيح آهي.
2. ان ۾ استعمال ٿيندڙ گهربل سامان سستو آهي.	2. ان ۾ استعمال ٿيندڙ گهربل سامان سستو آهي.
3. طريقا قابل اعتماد ماپ تي ٻڌل آهي.	3. اهو طريقو مطلق ماپ تي ٻڌل آهي.
4. ان جي لاءِ خاص تربيت جي ضرورت آهي.	4. ان جي لاءِ خاص تربيت جي ضرورت ناهي پوندي.
5. درستگي جو دارومدار انسٽرومنٽ تي آهي.	5. ان ۾ مقدار جي گهٽتائي سان درستگي به گهٽجي ٿي.
6. عمل تيزي سان ٿيندو آهي.	6. عمل سست رفتار سان ٿيندو آهي.
7. ان ۾ سيمپل جي گهٽ مقدار استعمال ٿيندي آهي.	7. سيمپل جي وڏي مقدار ۾ ضرورت هوندي آهي.



خلاصو

- مختلف طريقن ۽ آلاتن ذريعي سيمپل جي وزن کي الڳ ڪري انهن جي خاصيت ۽ مقدار جي تجزيي ڪرڻ کي تجزياتي ڪيميا سڏيو ويندو آهي.
- تجزياتي ڪيميا مادي بابت بنيادي سوالن جا جواب ڏئي ٿي ڇا، ڪٿي، ڪهڙو، ڪيترو؟
- تجزياتي ڪيميا، ڪيميا جي سڀني شعبن ۾ لاڳو ٿئي ٿي جهڙوڪ دوا سازي، ڪلينيڪل ليبارٽري، صنعت، زراعت، کاڌي جي آلودگي ۽ ماحولياتي تحفظ.
- تجزياتي ڪيميا ٻن قسمن تي مشتمل آهي خاصيتي تجزيو ۽ مقداري تجزيو. خاصيتي تجزيي جو تعلق سيمپل ۾ موجود عنصر، اٽن يا مرکبات جي سڃاڻپ سان آهي ۽ ان جو تعلق صرف خاصيت کي ماپڻ سان آهي. خاصيتي تجزيي کي ٻن غير نامياتي خاصيتي تجزيي ۽ نامياتي خاصيتي تجزيي ۾ ورهايو ويو آهي.
- مقداري تجزيي جو تعلق هڪ ڪيميائي مادي جي مقدار جي اندازي سان آهي جيڪو يا ته اڪيلو ٿي سگهي ٿو يا ٻين مادن سان گڏ ملاوٽ طور ٿي سگهي ٿو. مقداري تجزيي کي طبعياتي مقداري تجزيي ۽ ڪيميائي مقداري تجزيي ۾ تقسيم ڪيو ويو آهي.
- نقص / غلطي حاصل ڪيل قيمت ۽ اصل قيمت جي وچ ۾ هڪ عددي فرق آهي. غلطيون منظم ۽ بي ترتيب وار ٿي سگهن ٿيون.
- تجزياتي طريقي جي درستگي جو دارومدار ان ڳالهه تي آهي ته سيمپل جي حاصل ڪيل قيمت اصل قيمت جي ڪيترو ويجهو آهي.
- باقاعدي کي هن ريت بيان ڪري سگهجي ٿو ته ”هڪ ئي مقدار جي حاصل ڪيل ساڳين يا هڪ ٻئي جي ويجهو قيمتن جي مشابهت کي باقاعدي چئبو آهي.“
- ڪلاسيڪي طريقن ۾ خاصيتي ۽ مقداري تجزيا هوندا آهن جيئن شعلا ٽيسٽ ڪوآليٽو هوندي آهي ۽ ٽائيٽريميٽرڪ ۽ گريوميٽرڪ تجزيا مقداري تجزيا هوندا آهن.
- آڻي طريقن ۾ طيف بيني، ڪروميٽوگرافي، اليڪٽرو ڪيميڪل طريقا، الٽرا وائلٽ ۽ وزيبل اسپيڪٽرو اسڪوپي، انفرا ريڊ اسپيڪٽرو اسڪوپي، ايچ پي ايل سي، گئس ڪروميٽوگرافي، پوٽينشوميٽرڪ ۽ ڪنڊڪٽوميٽري شامل آهن.



مشق

ڀاڱو (الف): گهڻا چونڊ سوال

درست جواب تي گول دائرو لڳايو.

1. تجزياتي ڪيميا تعلق رکي ٿي انهن آلاتن ۽ طريقن سان جن سان ملاوت مان مادن کي _____ ڪري، انهن کي سڃاڻي انهن جي مقدار جو اندازو لڳايو ويندو آهي.
(الف) ملائي (ب) الڳ ڪري (ج) فرق (د) ٺاهي
2. خاصيتي تجزيي ۾ نمونو ٿي سگهي ٿو نهرو، پٽڙو، گئس يا هڪ _____
(الف) ملاوت (ب) مرڪب (ج) مادو (د) انهن مان ڪوبه نه
3. _____ تجزيو مرڪب ۾ فنڪشنل گروپن جي موجودگي جي سڃاڻپ سان تعلق رکي ٿو.
(الف) طبعي خاصيتي تجزيو (ب) تجزياتي خاصيتي تجزيو
(ج) نامياتي خاصيتي تجزيو (د) غير نامياتي خاصيتي تجزيو
4. ڪاپر هيلائيڊ جي فلم تيست سان نيري سائي رنگ جي موجودگي سان _____ کي سڃاڻي سگهجي ٿو.
(الف) هيلوجن (ب) هائيڊروجن (ج) ٽامي (د) ب ۽ ج
5. طبعي طريقن سان طبعي خاصيتن کي ماپڻ سڏجي ٿو:
(الف) سڙڻ واري تجزيو (ب) گريويميٽرڪ تجزيو
(ج) ايٽمي اخراج طيف بيني جو طريقو (د) حتمي تجزيو
6. آلاتن جي غلط ڪم ڪرڻ سبب پيدا ٿيل نقص آهي:
(الف) ڊٽرميننٽ غلطي (ب) غير ڊٽرميننٽ غلطي
(ج) منظم غلطي (د) بي ترتيب وار غلطي
7. ماپيل قيمت ۽ اصل قيمت ۾ هڪجهڙائي سڏجي ٿي:
(الف) غلطي (ب) درستگي (ج) باقاعديگي (د) اهي سڀ
8. طيف بيني ۾ روشنيءَ جو _____ سان تعامل ڪرڻ آهي:
(الف) پٽڙو (ب) نهري (ج) گئس (د) مادي
9. گئس Mobile phase آهي:
(الف) پٽڙو ڪروميٽوگرافي (ب) گئس ڪروميٽوگرافي
(ج) سولڊ ڪروميٽوگرافي (د) انهن مان ڪوبه نه
10. ڏنل ايٽمي، ماليڪيولر يا آئنڪ ڪيميائي مادي جي ڪنسنٽريشن يا مقدار جو اندازو لڳائڻ لاءِ _____ کي استعمال ڪيو ويندو هو:
(الف) ڪروميٽوگرافي (ب) اسپيڪٽرو اسڪوپي
(ج) ڪنڊڪٽوميٽري (د) پوٽينشوميٽري



ڀاڱو (ب): مختصر سوال

1. توهان ڇا ٿا سوچيو ته اڄ جي دور ۾ ڪهڙا طريقا تيز آهن؟
2. توهان ڪيئن تجزياتي ٽيڪنڪس جي هڪ ٻئي سان ڀيٽ ڪندا؟
3. ڇا توهان پنهنجي زندگيءَ سان لاڳاپيل نقص / غلطي جا ڪجهه مثال ڏئي سگهو ٿا؟
4. مقداري تجزيي مان توهان جو ڇا مطلب آهي؟
5. فرق ڪريو ته گئس جي تياري ۾ هينين مان ڪهڙن حاصل ڪيل مقدارن ۾ درستگي، باقاعديگي يا ٻئي يا ٻنهي مان ڪوبه ناهي موجود؟

32 cm ³		32 cm ³	
45 cm ³		32 cm ³	
17 cm ³		34 cm ³	
23 cm ³		35 cm ³	
32 cm ³		32 cm ³	
45 cm ³		32 cm ³	
45 cm ³		33 cm ³	
32 cm ³		32 cm ³	

6. اسان جديد آلائي طريقن ۾ پوٽينشوميٽرڪ تجزيو ڇو استعمال ڪندا آهيون؟
7. صنعتن ۾ سائنسدان مختلف شين جي معيار جي ڪنٽرول لاءِ انفراريڊ اسپيڪٽرو اسڪوپي ڪيئن استعمال ڪري رهيا آهن؟
8. ڪنڊڪٽوميٽري جي استعمالن جي لسٽ ٺاهيو؟

ڀاڱو (ج): تفصيلي سوال

1. هينين ۾ فرق بيان ڪريو:
(الف) مقداري تجزيو ۽ خاصيتي تجزيو
(ب) معائري تجزيو ۽ گريوميٽرڪ تجزيو
2. ثابت ڪريو ته انسٽرومينٽل تجزياتي طريقا ڪلاسيڪل کان وڌيڪ اثرائتا آهن؟
3. گئس ڪروميٽوگرافي کي تفصيل سان بيان ڪيو؟
4. HPLC جي مدد سان ڪروميٽوگرافي جا مرحلا بيان ڪريو؟
5. ثابت ڪريو ته اليڪٽروڪيميڪل طريقن جو دارومدار اليڪٽروڪيميڪل سيلز تي آهي؟



صنعتي ڪيميا

باب 8

وقت جي ورهاست

15 = تدريس ٿيڻ

03 = تشخيصي ٿيڻ

15% = سليبس ۾ حصو

اهم تصورات:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| صابن جي تياري | 8.1 |
| ڪمند مان ڪنڊ جي تياري | 8.2 |
| سادن مشروب (Soft Drink) جي تياري | 8.3 |
| پيٽروليم صنعت | 8.4 |
| دواساز صنعت | 8.5 |

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (Student Learning Outcomes)

هن باب سکڻ کان پوءِ شاگرد:

- صنعتن ۾ مختلف تيار ٿيندڙ شين کي ڄاڻي سگهندا.
- صابن سازي (Saponification) جي طريقي کي ڄاڻي سگهندا.
- صابن جي تياري لاءِ گهربل مواد جي وضاحت ڪري سگهندا.
- صابن ٺاهڻ واري Flow Diagram کي ٺاهي سگهندا.
- ڪمند مان ڪنڊ جي تياري کي بيان ڪري سگهندا.
- دوا ساز صنعتن جي اهميت جي باري ۾ ڄاڻي سگهندا.
- پيٽروليم کي بيان ڪري سگهندا.
- پيٽروليم ۽ قدرتي گئس جي ٺهڻ کي بيان ڪري سگهندا.
- پيٽروليم جي ترڪيب بيان ڪري سگهندا.
- پيٽروليم جي پاڻاري عرق ڪشي (Fractional Distillation) بيان ڪري سگهندا.



تعارف

انساني زندگيءَ ۾ آسودگي لاءِ استعمال ٿيندڙ تقريباً هر شيءِ ڪيميائي شين مان ٺهيل آهي. جديد دنيا ۾ ڪيميائي صنعتن جو اهم ڪردار آهي. هر صنعتي عمل ۾ ڪيميائي شيون شامل هونديون آهن جيڪي هڪ اهم ڪردار ادا ڪن ٿيون. ڪيميائي صنعتن ۾ خام مال جهڙوڪ پيٽروليم، پاڻي، هوا، معدنيات، ڌاتو وغيره کي وڌيڪ اهم ۽ ڪارائتو شين ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي. ڪيتريون ئي ڪيميائي شيون آهن جيڪي اسان جي روزاني زندگيءَ جو اهم ۽ ضروري حصو بڻجي چڪيون آهن جهڙوڪ صابن، کنڊ، مشروبات، دوائون وغيره. پيٽروليم مان پڻ ڪارائتو شين حاصل ڪيون وينديون آهن. مثال طور پيٽروليم گئس (LPG)، قدرتي گئس (چلهي واري گئس) يا ڊيبل قدرتي گئس (CNG)، پوليٽرول، پيٽرول، ڊيزل ۽ بئيومين (ڌامڻ) وغيره. 70,000 کان به وڌيڪ مختلف پراڊڪٽ ڪيميائي صنعتن ذريعي ٺاهيا ويندا آهن. هن باب ۾ اسان صرف مٿي ڄاڻايل شين مان ڪجهه تي بحث ڪنداسين.

8.1 صابن جي تياري (Preparation of Soap)

صابن سازي (Saponification) ڇا آهي؟

صابن سازي هڪ ڪيميائي عمل آهي جنهن ۾ سوڊيم يا پوٽاشيم هائيڊرو آڪسائيڊ سان ٽرائگليسرائڊس ردعمل ڪري گليسرول ۽ ”صابن“ ٺاهي ٿو، جيڪو فيٽي ايسڊ جو لوڻ آهي. جانورن جي چربي ۽ پاڇين مان نڪرندڙ تيل ٽرائگليسرائڊ جا سڀ کان عام ذريعا آهن. سخت صابن ٺاهڻ لاءِ سوڊيم هائيڊرو آڪسائيڊ (NaOH) استعمال ڪيو ويندو آهي جڏهن ته پوٽاشيم هائيڊرو آڪسائيڊ (KOH) جو استعمال ڪري نرم صابن ٺاهيو ويندو آهي. صابن پاڻي ۾ ڳري وڃي ٿو ۽ داغ کي مٽائي صاف ڪري سگهجي ٿو. صابن کي چمڙي جي بيمارين، وارن جي رنگ ۽ جسم جي صفائي سترائي لاءِ پڻ استعمال ڪيو ويندو آهي. بهرحال اسان اڄڪلهه صابن کي گهڻو ڪري خوشبو ۽ صفائي لاءِ استعمال ڪندا آهيون. صابن جا گهريلو استعمال هي آهن: ڏوڻ، وهنجڻ ۽ ٻين گهريلو ڪمن ۾ جتي صابن سرفيڪٽنٽ جي طور تي ڪم ڪن ٿا. صابن ڪنهن ڪپڙي يا شئي تي لڳل تيل جي داغ کي جذب ڪري پاڻي جي ذريعي ان کي مٽائي صاف ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو. صنعت ۾، اهي سڀئي شين ۾ ٿڪنر (Thickener) جي طور تي استعمال ڪيا ويا آهن ۽ ڪجهه ڪيٽيلسٽ جي تياري ۾ پڻ استعمال ڪيا ويندا آهن.

8.1.1 صابن جي تياري لاءِ گهربل سامان (Material needed for soap preparation)

صابن جي تياري لاءِ گهربل خام مال هي آهن:

- جانورن جي چربي
- بوٽن مان نڪرندڙ تيل
- ڪاسٽڪ سوڊا (سوڊيم هائيڊرو آڪسائيڊ)
- پوٽاشيم هائيڊرو آڪسائيڊ



- اضافي شيون (رنگ، ساختی خوشبو ڏيندڙ)
- گانا (Abrasive) (سلڪا، تالڪ، سنگ مرمر)

جانورن جي چرپي: جانورن جهڙوڪ گئون مان حاصل ٿيندڙ چرپي کي اڪثر صابن ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

بوٽن مان ملندڙ تيل: بنيادي تيل جهڙوڪ ناريل، زيتون ۽ ڪجيءَ سان گڏ سويابين جو تيل، جهڙوڪ ڪينولا، زعفران ۽ سورج مڪي اڪثر ڪري صابن ٺاهڻ جي لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن.

سوديم هائيڊرو آڪسائيڊ / پوٽاشيم هائيڊرو آڪسائيڊ

ڪاسٽڪ سوڊا (NaOH) صابن ٺاهڻ لاءِ هڪ اهم جز آهي ۽ ان جي ڪري ئي صابن جي تياري ٿيندي آهي. جڏهن سوديم هائيڊرو آڪسائيڊ جا داڻا هڪ پٽڙي ۾ شامل ڪيا ويندا آهن ته هڪ لالي ڳار (Lye solution) ٺهندو آهي جنهن کي جڏهن تيل يا چرپي سان ملائبو ته هڪ ڪيميائي ردعمل ٿيندو آهي جنهن کي صابن سازي سڏيو ويندو آهي.

اڄڪلهه صابن کي ٺاهڻ لاءِ گهڻو قدر سوديم هائيڊرو آڪسائيڊ کي ئي استعمال ڪيو ويندو آهي. ان کان علاوه صابن کي پوٽاشيم هائيڊرو آڪسائيڊ (ڪاسٽڪ پوٽاش) سان پڻ ٺاهي سگهجي ٿو. پوٽاشيم صابن سوديم صابن جي پيٽ ۾ پاڻي ۾ وڌيڪ حل ٿيندو آهي. انهن کي نرم صابن پڻ سڏيو ويندو آهي. جيتوڻيڪ نرم صابن جي اهميت ۾ گهٽتائي اچي رهي آهي پر پوٽاشيم صابن اڃا تائين مختلف مقدار ۾ سوديم صابن سان گڏ شيونگ پراڊڪٽ ٺاهڻ ۾ ۽ ڪپڙي جي صنعت ۾ استعمال ٿيندو آهي.

اضافي شيون (Additives): صابن جي پيداوار لاءِ اهم خام مال چرپي ۽ الڪلي آهن. انهن سان گڏ ٻيون به شيون جهڙوڪ رنگ، چمڪ ۽ خوشبو ڏيندڙ، پاڻي نرم ڪندڙ مادا اضافي شين طور استعمال ٿيندا آهن.


گانا (Abrasives): پاڻيءَ ۾ حل نه ٿيندڙ معدنيات جهڙوڪ ٽانڪ، ڊائي ايتماشيس، مٽي، سليڪا، سنگ مرمر، آتش فشاني، راڄ، چاڪ، فيلڊ اسپر، ڪوارٽز ۽ واري کي اڪثر ڪري پيسي صابن جي فارمولن ۾ شامل ڪيو ويندو آهي. نامياتي گائن لاءِ ڪاٺ جي پوري کي پڻ استعمال ڪيو ويندو آهي.



شڪل 8.1 گانا



8.1.2 صابن جي تياري جو فلو چارٽ



صابن جي تياري جو فلو چارٽ

8.2 ڪمند مان ڪند جي تياري

(Preparation of Sugar from Sugar can)

ڪمند مان ڪند جي تياري هيٺين مرحلن تي مشتمل آهي.

- لاپارو ڪري ڪمند کي مل تائين پهچائڻ
- ڪمند مان رس ڪڍڻ
- رس جي صفائي
- رس کي گهاٽو ڪرڻ
- قلمائڻ (Crystallization) جو عمل
- قلمن (Crystals) کي الڳ ڪري سڪائڻ

لاپارو ڪري ڪمند کي مل تائين پهچائڻ

ڪمند جي پوک جو لاپارو عام طور تي سال جي ٽن مهينن ۾ ڪيو ويندو آهي جڏهن ته پوري سنڌ ۾ ڪمند سڄو سال پوکيو ويندو آهي. دنيا ۾ ڪمند جو لاپارو گهڻو قدر هٿ سان ڪيو ويندو آهي پر ڪن ملڪن ۾ اهو عمل مشينن سان پڻ ڪيو ويندو آهي. ان عمل کان پوءِ ڪمند کي ڪيترن ئي سوارين، جهڙوڪ ڍڳي گاڏي، ترڪ، ريل گاڏي وغيره ذريعي ڪارخاني تائين پهچايو ويندو آهي.



ڪمند جو رس ڪڍڻ (Juice Extraction of Sugar Can)

وزن ڪرڻ کان پوءِ ڪمند کي هٿ يا ڪرين ذريعي هلندڙ ميز تي رکيو ويندو آهي. ميز ڪمند کي هڪ يا ٻه وڏن ڦرندڙ چاقن جي سیت وٽ کڻي ويندي آهي، جيڪي ڪمند کي صفا سنهن ڌڙن ۾ اهڙيءَ طرح ڪٽيندا آهن جو رس جي ججهي مقدار لاءِ مواد تيار ٿي ويندو آهي.

نڪتل رس جي صفائي (Clarification of extracted juice)

رس جي صفائي مختلف عملن ذريعي ڪئي ويندي آهي جهڙوڪ ان کي گرم ڪري، لائم (Lime) ملائي ۽ فلوڪيوليشن عمل ذريعي. لائم ڪيلشيم هائيڊرو آڪسائيڊ جي ڇاڻ وارو ڳار آهي ۽ اهو ڳار اڪثر ڪري Sucrose واري ڳار سان ملي هڪ Calcium Saccharate مرڪب ٺاهيندو آهي. گرمائش ۽ لائم جوس ۾ موجود اينزائمز کي ماريوندا آهن ۽ pH کي قدرتي تيزابيت (5-6) کان نيوٽرل pH تائين وڌائيندا آهن. ڇو ته ڪند کي تيار ڪرڻ لاءِ pH کي ڪنٽرول ڪرڻ تمام ضروري آهي.

ان سڄي عمل کي صفائي جو عمل (Defecation) سڏيو ويندو آهي. ڳار کي روٽري ويڪيوم فلٽرن ڏانهن پمپ ڪيو ويندو آهي، جتي رهجي ويل سڪروز کي پاڻيءَ جي ڦواري سان ڌوئبو آهي. تنهن کان پوءِ صاف ٿيل رس کي ٽن کان پنجن بخارات ڪرائيندڙن (Evaporators) جي سيريز ڏانهن اماڻيو ويندو آهي.

صاف ٿيل رس جو ارتڪاز (Concentration of clarified juice)

سيريز جي پهرين Evaporator کي ٻاڦ جي مدد سان گرم ڪيو ويندو آهي. رس گرم ٿي ٽهڪندو آهي ۽ ٻئي Evaporator ڏانهن منتقل ٿيندو آهي. اهو عمل ٻيو ورجائبو آهي جيستائين صاف ٿيل رس ۾ ڪند جي مقدار 10-15% کان وڌي 59-60% تائين نٿي ٿئي ۽ مجموعي وزن 60-65% سيڪڙو ٿي وڃي.

ارتڪاز ٿيل رس کي قلمائڻ (Crystallization of concentrated juice)

گهاٽي رس کي Evaporator کان Vacuum pan ڏانهن موڪليو ويندو آهي، جتي بخارجڻ جو عمل وڌيڪ ٿيندو آهي جنهن سان رس Super saturation ٿي ويندو آهي. ڪند جا ڪجهه شفاف ڊاٽا (Seed Crystals) رس ۾ ملايا ويندا آهن جنهن کان پوءِ ڳار (Mother liquor) مان ڪند جي قلمڻ جو 50 سيڪڙو وزن جي لحاظ کان حاصل ٿيندو آهي. قلمائڻ جو عمل هڪ ترتيبوار عملن تي مشتمل آهي ۽ انهن عملن کي A molasses، B molasses ۽ آخري C molasses طور سڏيو ويندو آهي. جنهن ۾ 25 سيڪڙو ڪند ۽ 20 سيڪڙو (گلوڪوز ۽ فرڪٽوز) آهي.

قلمن جي عليحدگي ۽ سڪائڻ (Crystal separation and drying)

ڪند جا قلمر ٽوڪري جهڙي سينٽريفيوچ مشين ۾ الڳ ڪيا ويندا آهن. اهي مشينون لڳاتار سينٽريفيوچ جي عمل ذريعي قلمن کي ٽوڙينديون آهن ۽ سينٽريفيوگل ٽوڪري جي ديوار تي ڊبيل ڪند تي پاڻي جي چٽڪار ڪئي ويندي آهي جنهن سان ڪند جي هر ڊاٽي تان شربت جي کوٽنگ کي مٽايو ويندو آهي. جديد فيڪٽرين ۾ خالص ڪند تيار ڪرڻ لاءِ ڌوئڻ وارو عمل تمام وسيع آهي.




8.2.1 ڪنڊ جي تياري لاءِ گهريل سامان (Material needed for sugar preparation)

ڪمند مان ڪنڊ تيار ڪرڻ لاءِ گهريل خام مال هن ريت آهي:

- ڪمند جون گنديريون
- چن جو پاڻي
- پاڻي

8.2.2 ڪنڊ جي تياري جو فلو شيٽ ڊاياگرام



8.3 سادن مشروب جي تياري (Preparation of soft drinks)

بنيادي طور تي هڪ سادو مشروب، پاڻي، ڪنڊ، تيزاب، رنگ ۽ ذائقو ڏيندڙ ايجنٽ مان ٺهيل آهي. هن کي تيار ڪرڻ لاءِ انهن ترڪيبي جزن کي پاڻي ۾ ملائي 65° Brix تيار ڪيو ويندو آهي.


8.3.1 سادن مشروب جي تياري لاءِ گهريل سامان

(Material needed for preparation of soft drinks)

سادن مشروب جي تياري هيٺين شين ۾ مرحلن تي مشتمل آهي.

- پاڻي
- ڪيلشيم ۽ ٻيا معدنيات
- رنگ ۽ ذائقي جو ايجنٽ
- مائڪرو بيل جي واڌ لاءِ ڪنڊ
- کڻي ذائقي لاءِ سٽرڪ ايسڊ

8.3.2 سادن مشروبن جي تياري جو فلو چارٽ



8.4 پيٽروليم صنعت (Petroleum Industry)

8.4.1 پيٽروليم

پيٽروليم هڪ قدرتي مادو آهي جيڪو ڌرتيءَ جي مٿاڇري هيٺان موجود آهي. پيٽروليم کي پٿر جو تيل (Rock Oil) پڻ چيو ويندو آهي، گئس، پٽڙو ۽ نهرن هائڊرو ڪاربن جي هن پيچيده ڳار ۾ لوڻ ۽ مٽي جا ذرڙا پڻ موجود هوندا آهن، اهو هڪ اهڙو پٽڙو آهي جيڪو پاڻيءَ کان هلڪو آهي، پر پاڻي ۾ حل ناهي ٿيندو.

پيٽروليم ۽ قدرتي گئس جو نهڻ

تيل ۽ گئس نامياتي مادن مان ٺهيل آهن جيڪي سمنڊ جي فرش تي لت (Sediments) جي طور تي جمع ٿيندا آهن ۽ لکين سالن کان پوءِ اهي ٽٽي ڪري ٻين مرڪبن ۾ تبديل ٿي ويندا آهن. مختلف سامونڊي پٿرن تي موجود انهن مرڪبن جي نشاني جي مدد سان تيل ۽ گئس جي وسيلن جي جڳهه جي ڳولا جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

ناروي جي شيلف تي تيل ۽ گئس جي وسيلن جي اڪثريت ڪاري مٽيءَ جي ٿلهي ته مان ٺهيل آهي جيڪا سمنڊ جي هيٺان هزارين ميٽرن جي مفاصلي تي آهي. پٿر تي ڪاري مٽي ان ڳالهه جي نشاني آهي ته اهو ڪنهن ذخيري مان آيو آهي جنهن ۾ تمام گهڻي مقدار ۾ غير ضروري نامياتي مواد (Organic waste) آهي.



پيٽروليم جي جوڙجڪ (Composition of Petroleum)

پيٽروليم گهڻو قدر هائيڊروجن ۽ ڪاربان جو ٺهيل آهي، پر ان ۾ گهٽ مقدار ۾ آڪسيجن، نائٽروجن، سلفر، وينيڊيم ۽ ڪوبالت پڻ شامل هوندا آهن. Alkanes (Paraffins), Aromatics, Naphthenes ۽ Hetero compounds ڪجهه عام نامياتي مادا آهن. مختلف ذريعن مان ملندڙ پيٽروليم جي سالم جي جوڙجڪ وڏي پئماني تي مختلف هوندي آهي پر ڪيميائي عنصرن جو تناسب انتهائي گهٽ مختلف ٿيندو آهي. جيئن ته:

عناصر	ماپي جي لحاظ سان پيٽروليم جي تركيب
ڪاربن	83 کان 85 سيڪڙو
هائيڊروجن	10 کان 14 سيڪڙو
نائٽروجن	0.1 کان 2 سيڪڙو
آڪسيجن	0.05 کان 1.5 سيڪڙو
سلفر	0.05 کان 6.0 سيڪڙو
ڌاتون	0.1 کان گهٽ

8.4.4 پيٽروليم جي پاڳياري عرق ڪشي (Fractional Distillation of Petroleum)

اهو عمل وڏي پئماني تي Fractionating ڪالم (ٽاور) جي مدد سان آئل ريفائنريز ۾ ڪيو ويندو آهي. اهي آئل ريفائنريز اڪثر ڪري پيٽروليم جي ذريعن جي ويجهو هونديون آهن. صنعتي فريڪشنل ڪالم مٿان کان ٿڌا ۽ تري ۾ گرم هوندا آهن، جنهن ڪري پيٽروليم جي بخارات کي پٽڙو حالت ۾ تبديل (Condense) ٿيڻ لاءِ مختلف گرمي پد ملندو آهي.

ڇا اوهان ڄاڻو ٿا؟



پاڳياري عرق ڪشي

اهو هڪ عمل آهي جنهن ۾ پٽڙو مرڪبن جي ملاوت جي وزن کي گرم ڪري مختلف تهڪڻ پد تي الڳ ڪيو ويندو آهي.



استعمال	هائيڊرو ڪاربنز جي موجودگي	ڪاربن چين جي ڊيگهه	تھڪڻ پد (°C)	خام تيل مان جزوي ڪشيد
گھريلو استعمال لاءِ	ميٿين CH_4 ايٿين C_2H_6 پروپين C_3H_8 بيوٿين C_4H_{10}	1 - 4	-5 کان -160	پيٽروليم گئس
گاڙين جو تيل	آڪٽين C_8H_{18}	5 - 8	40 کان 110	گيسولين
پلاسٽڪ	ڊيڪين $C_{10}H_{22}$	8 - 10	110 کان 180	نيپٽا
هوائي جهاز جو تيل	ڊوڊيڪين $C_{12}H_{26}$	10 - 16	180 کان 260	ڪيروسين (پيرافين)
وڏين گاڙين جو تيل	هيڪزا ڊيڪين $C_{16}H_{34}$	16 - 20	260 کان 320	ڊيزل
صنعتن ۾ استعمال ٿيندڙ	آئيڪوسين $C_{20}H_{42}$	20 - 50	320 کان 400	فيول آئل
رستن تي استعمال ٿيندڙ		> 50	400 کان 600	بپٽيومين رهجي ويل

8.5 دواساز صنعت (Pharmaceutical Industry)

8.5.1 دواسازي جي شروعات (Origin of Pharma)

فارميسي هڪ الڳ سائنس جي طور تي اڻويهين صدي جي اڌ کان شروع ٿئي ٿي. فارميسي قديم زماني کان دوا جو حصو آهي. جيئن ته دواسازي جي تاريخ ۽ دوا جي تاريخ هڪ ٻئي جي ويجهو آهن. ان ڪري اهو ضروري آهي ته انهن ٻن مضمونن جي وچ ۾ فرق ڪجي. هر ملڪ جي صحت جي سارسنڀال جو نظام دواسازي جي شعبي تي منحصر آهي. دواساز ڪمپنيون دوائن جو مطالعو ڪرڻ، انهن کي تيار ڪرڻ ۽ انهن کي بيمارين جي علاج لاءِ وڪڻڻ جون ذميواري هونديون آهن. اهڙي طرح ٻين صحت جي مسئلن جي حل لاءِ دوا جو شعبو (Pharmaceutical Sector) ٺهيو آهي. دواسازي جي صنعت دواسازي جي عمل کي ٺاهي ٿي، ان کي ترقي ڏياري ٿي ۽ ان جي مارڪيٽنگ ڪري ٿي جيڪي مريضن جي علاج، ويڪسينيشن يا بيمارين جي علامتن کي گهٽائڻ جو سبب ٿينديون آهن.

8.5.2 دواسازي صنعت جي اهميت (Importance of Pharmaceutical Industry)

پاڪستان جي دواسازي جو ڪاروبار گذريل ڏهاڪن ۾ تمام گهڻو وڌيو آهي. دواسازي ڪمپنيون هميشه نئين علاج تي ڪم ڪري رهيون هونديون آهن جيڪي ماڻهن کي ڊگهي، صحتمند زندگي گذارڻ ۾ مدد ڏين ٿيون. هتي صنعت جي اهميت تي بحث ڪجي ٿو ۽ انهي سان گڏ ان ڳالهه تي ته ڇو دواسازي ڪمپنيون مريضن، سماج ۽ لائف سائنس جي صنعت لاءِ تمام ضروري آهن.



(1) علاج زندگي جي اميد وڌائي ٿو:

دوا سازي عالمي سطح تي مردن ۽ عورتن لاءِ زندگي جي اميد جي واڌ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. چيو وڃي ٿو ته 30 ترقي پذير ملڪن ۾ دواسازي جي سڌارن جي ڪري 2000ع کان 2009ع جي وچ ۾ زندگي جي اميد ۾ مجموعي طور واڌ 73 سيڪڙو ٿي آهي.

(2) دواساز صنعت بيمارين کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي:

جڏهن دوا ٺاهڻ جي ڳالهه اچي ٿي ته ان جو حتمي مقصد بيماري جو خاتمو ڪرڻ آهي، ڇاڪاڻ ته هي عالمي سطح تي ماحولياتي نظام جي مدد ڪري ٿو. ورلڊ هيلٿ آرگنائيزيشن (WHO) مطابق Smallpox پهرين ۽ اڃا تائين واحد انساني بيماري آهي جنهن کي عالمي سطح تي ختم ڪيو وڃي.

(3) دواساز صنعت درد ۽ تڪليف کي گهٽائي ٿي:

ورلڊ هيلٿ آرگنائيزيشن پاران ڪيل هڪ تحقيق موجب جيڪي ماڻهو دائمي سورن ۾ مبتلا رهن ٿا، اهي دائمي سور ۾ مبتلا نه رهڻ وارن جي ڀيٽ ۾ چار ڀيرا وڌيڪ اداسي، پریشاني ۽ مشڪلاتن جو شڪار هوندا آهن.

(4) ويڪسين پئسي جي بچت آهي:

ويڪسين نه رڳو لکين زندگين کي بچائڻ ٿيون، پر اهي پئسا بچائڻ ۾ پڻ مدد ڪن ٿيون. ويڪسين کي عام طور تي هڪ لاڳت جي افاديت طور سمجهيو ويندو آهي جيڪا صحت جي سارسنڀال جي خرچن کي گهٽائي ٿي ۽ نقصان کان روڪي ٿي، تنهنڪري معيشت جي مجموعي اثر کي محدود ڪري ٿي.

(5) دواساز صنعت اسپتال ۾ ترسڻ جي امڪان کي گهٽائي ٿي:

ڪيتريون ئي بيماريون آهن جن جي علاج لاءِ لازمي طور تي سرجري جي ضرورت هوندي آهي پر انهن کي هاڻي دوائن سان علاج / ختم ڪري سگهجي ٿو. مريضن جو جلدي سان اسپتال مان صحتياب ٿي نڪرڻ سان سارسنڀال جي نظام ۽ عملي تي دٻاءُ گهٽجي ٿو.

(6) صنعت لکين ملازمن لاءِ روزگار جو ذريعو آهي:

دواسازي جون ڪمپنيون سڄي دنيا ۾ لکين ماڻهن کي روزگار ڏين ٿيون. جيڪي مختلف شعبن ۾ محنت ڪن ٿا جيئن سائنسي تحقيق، ٽيڪنالاجي ۽ پيداواري شعبو، دواسازي جا ادارا اعليٰ تربيت يافته ۽ تعليم يافته ملازمن جي طلب ڪن ٿا، جن ۾ انتظاميه کان وٺي پي. ايڇ. ڊي سائنسدان تائين جا عهدا شامل آهن.

(7) دواساز ڪمپنيون عالمي معيشت کي وڌائڻ ٿيون:

دواسازي جو ڪاروبار عالمي معيشت لاءِ هڪ اهم اثاڻو آهي، انهي سان گڏ سڄي دنيا جي ماڻهن کي تحقيق، ترقي ۽ جديد دوائون فراهم ڪندي طبي ترقي ڪرائڻ ٿيون جيڪي انهن جي صحت ۽ زندگي جي معيار کي بهتر بڻائين ٿيون. دواسازي جو ڪاروبار، مجموعي طور تي مريضن ۽ ڪميونٽي لاءِ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو. اهو ممڪن ۽ زندگي بچائڻ واري علاج کان به وڌيڪ ڪجهه فراهم ڪري ٿو. اهي انعام واريون نوڪريون پڻ ڏين ٿيون ۽



عالمي معيشت کي طاقت ڏيڻ ۾ مدد ڪن ٿيون.

سماج، سائنس ۽ ٽيڪنالاجي

مختلف قسمن جي باهه کي وسائڻ لاءِ مختلف طريقن جي ضرورت آهي.

باهه کي ٻارڻ ۽ برقرار رکڻ لاءِ عام طور تي ڪاٺ، تيل ۽ بجلي ٻارڻ طور تي گهربل هوندا آهن. جيڪي Combustion واري ردعمل ۾ ٻرن ٿا. گرمي هڪ توانائي آهي جيڪا ٻارڻ سان تعامل ۾ اچي باهه ٻاري ٿي ۽ پوءِ ان ٻارڻ کي جاري رکي ٿي. هوا (آڪسيجن) Combustion جي عمل لاءِ هڪ اهم جزو آهي. Combustion هڪ پيچيده ڪيميائي تسلسل وارو ردعمل آهي جنهن لاءِ فيول، آڪسيجن ۽ گرمي جي توانائي جو صحيح تعامل ڪرڻ ضروري آهي. مٿي ذڪر ڪيل جزن مان ڪنهن کي به هٽائي ڪري باهه وسائي سگهجي ٿي. مختلف ٻارڻ کي وسائڻ لاءِ مختلف حڪمت عمليين جي ضرورت آهي.

ڪاٺ جي باهه کي وسائڻ لاءِ ان تي پاڻي هاري سگهجي ٿو. پاڻي بخارجڻ جي عمل دوران تمام گهڻي گرمي جذب ڪري ٿو ۽ ڪاٺ جي باهه کي گرميءَ کان محروم ڪري ٿو، جنهن ڪري باهه کي جاري رکڻ ناممڪن ٿي پوي ٿو. تيل ۽ پاڻي پاڻ ۾ نٿا ملن، ان ڪري پاڻي تيل سان لڳل باهه کي نه ٿو وسائي. ڇاڪاڻ ته تيل پاڻي کان وڌيڪ هلڪو آهي، اهو ان جي مٿان تري ٿو ۽ ٻارڻ کي جاري رکي ٿو. تيل جي باهه وسائڻ لاءِ آڪسيجن جي فراهمي کي بند ڪيو وڃي ان لاءِ باهه جي شعلن تي مٿي / واري، عام لوڻ يا بيڪنگ سوڊا اڇلائڻ سان باهه وسائڻ ۾ مدد ملندي.

هڪ برقي باهه عام باهه کان وڌيڪ طاقتور آهي ڇاڪاڻ ته ان جي گرمي جو ذريعو برقي توانائي آهي. ان کي وسائڻ لاءِ آڪسيجن جي فراهمي کي بند ڪيو وڃي. باهه وسائڻ وارا (Fire extinguisher) آڪسيجن جي فراهمي کي روڪي سگهن ٿا.

ڪيميا صنعت ۾ پيشي جي طور تي:

ڪيميا جي مطالعي ڪرڻ سان هڪ پيشيور ڪيمسٽ ٿي سگهجي ٿو. ڪيميادان ڪيميائي ساخت ۽ خاصيتن تي تحقيق ڪري ٿو. پوءِ هو سماجي تقاضائن کي پورو ڪرڻ لاءِ ڪمرشل پئماني تي وڏي تعداد ۾ بلڪل نوان (Novel) مرڪب ٺاهڻ جا طريقا ايجاد ڪري ٿو. هو پيداوار کي وڌيڪ اثرائتو ۽ سستو بڻائڻ لاءِ اوزار ۽ پروسيس پڻ ٺاهي ۽ بهتر ڪري ٿو. ڪيمسٽ عملي طور تي پنهنجي مهارت جي بنياد تي ڪنهن به صنعت ۾ ڪم ڪري سگهن ٿا. نامياتي ڪيمسٽ مختلف شعبن ۾ ڪم ڪن ٿا، جن ۾ دواسازي، پيٽروليم، پيٽروڪيميڪل، ڪاسميٽڪس، پوليمر ۽ پلاسٽڪ شامل آهن. غيرنامياتي ڪيمسٽ ميٽالرجيڪل صنعتن ۾ ڪم ڪن ٿا ان کان علاوه ڪپڙي،



سيمٽ، ڪنڊ، پاڻ، تيزاب ۽ ڪاسٽڪ سوڊا ٺاهڻ وارن پلانٽ ۾ ڪم ڪري سگهن ٿا. طبيعياتي ڪيميست لاءِ ڪم جا امڪان توانائي جي تبديلي واري صنعت ۾ موجود آهن. اهي نون ۽ بهتر توانائي جي ذريعن تي ڪم ڪري رهيا آهن. اهي ٻيهر استعمال ٿيندڙ (Renewable) توانائي تي تحقيق ڪندا آهن. هر ڪاروبار ۾ عملي طور تي تجزياتي ڪيميست ڪم ڪندا آهن. اهي ملاوت ۾ جزن جي نشاندهي ڪن ٿا، انهن جي مقدار کي معلوم ڪن ٿا ۽ پيداوار شين جي معيار جي نگراني ڪن ٿا. اهي پروسيس جي ڪارڪردگي جو جائزو وٺندا آهن ۽ ان کي بهتر ڪرڻ لاءِ طريقا تجويز ڪن ٿا.

اهي مختلف صنعتن ۾ ڪم ٿا، کاڌي ۽ مشروبات کان وٺي رنگ ۽ ورنيشز تائين. اهي نئين تعمير ٿيل صنعت ۾ ڪم ڪن ٿا. انهن بنيادي روزگار جي اختيارن کان علاوه ڪيميست جا ڪيترائي اضافي قسم آهن، جهڙوڪ بايوڪيميست، فوڊ ڪيميست، مادي ڪيميست وغيره.

خلاصو

- ڪيميائي صنعت پيٽروليم کي ڪارائتئين شين ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ هڪ ذميوار صنعت آهي.
- صابن (Fatty Acids) جو لوڻ آهي يا صفائي ڪندڙ هڪ مادو آهي جيڪو انهن شين جو ٺهيل آهي.
- پيٽروليم هائيڊرو ڪاربن جي هڪ پيچيده ملاوت آهي جنهن کي Refine ڪري ڪيترن ئي مرڪبن ۾ تبديل ڪري Fractional Distillation ذريعي الڳ ڪري سگهجي ٿو.
- پيٽروليم هزارين سال اڳ مٽي ۾ دٻجي ويل مئل جانورن ۽ ٻوٽن مان ٺهيل آهي.
- دواسازي جي صنعت بيمارين کي گهٽائڻ، بيمارين جي علاج ۽ ماڻهن جي زندگي جي معيار کي وڌائڻ لاءِ دوائن ۽ ويڪسين جي ترقي ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي.
- دواسازي جي صنعت صحت جي شعبي جو حصو آهي جيڪو دوائن سان واسطو رکي ٿو.
- صنعت ۾ دوائن جي ترقي، پيداوار ۽ مارڪيٽنگ سان لاڳاپيل مختلف ننڍن شعبن تي مشتمل آهي.
- جهڙوڪ دوا ٺاهيندڙن، دوا مارڪيٽ ۽ بايو ٽيڪنالاجي ڪمپنيون وغيره.



مشق

ڀاڱو (الف): گهڻا چونڊ سوال

درست جواب تي گول دائري جو نشان لڳايو.

1. صابڻ _____ ايسڊ جي لوڻ لاءِ اصطلاح آهي.
 (الف) ڪاربوآڪسيلڪ ايسڊ (ب) سائٽرڪ ايسڊ
 (ج) سلفيورڪ ايسڊ (د) فيٽي ايسڊ
2. Surfactants پاڻي جي گهٽائي ٿو
 (الف) وسڪاسٽي (ب) مٽاچري جو ٽينشن
 (ج) ٽهڪڻ پڊ (د) رجڻ پڊ
3. صابڻ جي ماليڪيول جي ڪاربوآگزيلٽ واري پڇاڙي جيڪا پاڻيءَ ڏانهن ڇڪ
 ڪندي آهي، ان کي چئبو آهي
 (الف) هائيڊرو فوبڪ پڇاڙي (ب) آخري حد
 (ج) هائيڊرو فيلڪ پڇاڙي (د) ڪوبه نه
4. پوٽاشيم هائيڊرو آڪسائيڊ جي استعمال سان پيدا ٿيندو آهي:
 (الف) سخت صابڻ (ب) نرم صابڻ (ج) عام صابڻ (د) سڀئي
5. سائٽرڪ ايسڊ کي _____ جي لاءِ ڪولڊرنڪ ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي:
 (الف) مٺي ڌاڻقي (ب) ڪڙي ڌاڻقي
 (ج) ڳاڙهو ڌاڻقو (د) ڪاري ڌاڻقي
6. سينٽريفيوڇ مشين کي الڳ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي
 (الف) رس کي (ب) pH کي (ج) مٺي کي (د) قلمن کي
7. ابيريسِيوز (abrasives) آهن:
 (الف) پاڻي ۾ حل ٿيندڙ معدنيات (ب) پاڻي ۾ حل نه ٿيندڙ معدنيات
 (ج) پاڻي ۾ گهٽ حل ٿيندڙ معدنيات (د) پاڻي جذب ڪندڙ معدنيات
8. لاپاروسڪوپ کان اهم مرحلو آهي:
 (الف) صابڻ جي تياري جو (ب) ڪولڊرنڪ جي تياري جو
 (ج) ڪنڊ جي تياري جو (د) دوائن جي تياري جو
9. هيٺين مان ڪهڙي کي جيت فيول طور استعمال ڪيو ويندو آهي:
 (الف) مٺيءَ جو تيل (ب) ڊيزل (ج) ٻارڻ (د) پئٽرول
10. هيٺ ڏنل مان ڪهڙو پئٽروليم جو حصو نه آهي:
 (الف) پيرافين موم (ب) اسفالت (ج) امونيا (د) پئٽروليم ڪوڪ



ڀاڱو (ب): مختصر سوال

1. صابڻ سازي (Saponification) جي عمل جي وضاحت ڪريو.
2. بيان ڪريو ته NaOH ۽ KOH صابڻ جي تياري ۾ استعمال ٿيندا آهن.
3. کنڊ جي تياري لاءِ گهربل شين جي فهرست ٺاهيو.
4. سادن مشروب ۾ ڪهڙا جز هوندا آهن؟
5. پيٽروليم جي وضاحت ڪريو.
6. ثابت ڪريو ته پيٽروليم ”ڪارو سون“ آهي؟

ڀاڱو (ج): تفصيلي سوال

1. پيٽروليم جا جزا تفصيل سان بيان ڪريو.
2. ڪمند مان کنڊ تيار ڪرڻ جي عمل جي وضاحت ڪريو.
3. فارما انڊسٽري جي اهميت کي لکو.
4. صابڻ جي تياري کي فلوشيت ڊاياگرام جي مدد سان بيان ڪريو.
5. فلوشيت ڊاياگرام ۾ سادن مشروب جي تياري جي مرحليوار ترتيب ٺاهيو.

لغت (Glossary)

معني	لفظ	معني	لفظ
Antibiotic	جيوڙامار	Charge	بار
Active Mass	فعال مايو	Condensed	گندييل
Auto Ionization	خود ٽوٽائڻ	Classification	درجہ بندي
Atmosphere	وايو منڊل	Covalent Bond	هم گرفت باند
Acid	تيزاب/ايسڊ	Compound	مرڪب
Anion	ڪاٽو ٽو	Calcium Sulphate	چيرولي
Aqueous Solution	آبي حل	Complex	پيچيده
Aromatic Compound	معطر مرڪب	Compressed	دٻيل
Alicyclic	چلائون	Citerous	رس پريا ڪتا
Anticlockwise	مخالف گهڙي وار	Chain	سلسلو/زنجير
Amorphous	غير قلمي	Cyclic	گولائي دار
Application	اطلاق / استعمال	Chemist	ڪيميادان
Acid Rain	تيزابي مينهن	Composition	جوڙجڪ
Anemia	رت اوٽائي	Cell	جيو گهڙو
Allotrope	بهرپ	Clockwise	گهڙي وار
Accuracy	درستگي	Combustion	سڙڻ وارو عمل
Additives	اضافي شيون	Crystalline	قلمي
Abrasive	گانا	Classical	پراڻو/ڪلاسيڪل
Absorbent	جاذب	Cathode	واڏو برقي چيٽرو
Anode	ڪاٽو برقي چيٽرو	Challenges	درپيش مسئلا
Analytical	تجزياتي	Crimson	ڳاڙهو قرمچي
Base	اساس	Calliberation	پيمانہ بندي
Backward Reaction	موٽ ڪائينڊڙ ردعمل	Crystal	قلمر / شفاف داڻا
Branched chain	شاخدار سلسلو	Crystallization	قلمائڻ
Boiling Point	ٽهڪڻ پد	Concentrated	گهاتو
Chemical Equilibrium	ڪيميائي توازن	Catalyst	عمل انگيز
Condensation	تڪثيف عمل	Condensed	گندييل
Concentration	مقدار/ارتڪاز	Dynamic	متحرڪ
Coefficient	سرو	Derive	ماخذ/اخذ ڪرڻ
Cation	ڪٽو	Disinfectant	جراثيم ڪش
		Drink	مشروب
		Diversity	گهڻائي

لغت (Glossary)

معني	لفظ	معني	لفظ
Drying Agent	سڪائڻ وارو	Fat	چرٻي
Dextrorotatory	ساڄي ڦيري وارا	Functional Group	عمل وارو گروپ
Dehydration	ناپيدگي	Genetic	جينياتي
Defecation	صفائي جو عمل	Gills	ڪليون
Density	ڪثافت	Glacier	برفاني وڏي ڇپ
Diabetes	ذبابطيس	Hydrated	آبيده
Diarrhea	اسهال	Homologous Series	هم شڪلي سلسلو
Detergent	صافي / صرف	Hydrated	آبيده
Decomposition	ختم ٿيڻ / ٽٽڻ	Hepatitis	سائي / يرقان
Dysentery	پيشش	Homocyclic	هم گولائيڊار
Equilibrium Concentration	توازن مقدار	Hydration	آبيدگي
Equilibrium Constant	توازن وارو مستقل	Hydrochloric acid	لوڻ جو تيزاب
Extent	وسعت	Heterocyclic	مختلف گولائيڊار
Equation	مساوات	Hard Water	سخت پاڻي
Element	عنصر	Hereditary	موروثي
End	چيٽرو	Industry	صنعت
Electric Conductivity	بجلي پسرائڻ	Ion	ٿو
Electrolyte	برق پاش	Indicator	پٽرو ڪندڙ
Energy	توانائي	Irreversible	هڪ طرفي / طرفو
Electrostatic	برق سڪوني	Ions	ٿا
Equator	خط استوا	Ionization	ٿوڻائي
Electrolyte	برق پاش	Ionic	ٿوڻائي
Error	غلطي	Instruments	آلات
Electrode	برقپرو	Impurities	ملاوڻي شيون / غير خالص شيون
Equivalence Point	مساوي گرفت	Indicator	پٽرو ڪندڙ
Fertilizer	پاڻ	Isomerism	هم ترڪيبي
Freeze	ڄمڻ	Juice	رس
Forward Reaction	اڳيان وڌندڙ رد عمل	Isomers	هم ترڪيب
Fuel	بارڻ	Leaching	سيمون
Fatigue	ٿڪاوت	Levorotatry	ڪابي ڦيري وارا
		Linearity	خطي
		Lye Solution	لالی ڳار

لغت (Glossary)

معني	لفظ	معني	لفظ
Liquid	پتڙو	Ozone Depletion	اوزون جي گهٽتائي
Layer	پرت تهه	Observed Value	مشاهدي واري قيمت
Lather	گجي / جهاڳ	Permenant	مستقل
Laboratory	تجربو گاهه	Potential	برقي قوت
Lime Water	چن جو پاڻي	Precision	باقاعدگي
Life Cycle	حياتي وارو ڦيرو	Pesticide	جيت مار دوا
Limitations	خاميون	Product	پيداوار شئي
Infection	وچڙندڙ مرض	Precipitates	ڇاڻ
Lilac	عنابي	Pollutant	آلودگي ڪندڙ آلودگي مادو
Mixture	ملاوت	Photosynthesis	ضياءيائي تاليف
Metal	ڌاتو	Polymerize	سوين سالمن جو جڙڻ
Melt	پگهرجڻ	Pollution	آلودگي
Molecular	سالمي	Pesticides	ماڪڙ ڪش
Microorganism	خوردڻي جاندڙ	Pharmaceutical	دوا ساز
Molecule	سالمو	Parasites	مفت خور
Mass	مايو / ماس	Pressure	دٻ
Mole	مول	Perticulates	مادي جا ذرات
Mineral	معدنيات	Proportional	نسبت
Metabollic	پيچ ڊائيم جو عمل	Polar	قطبي
Melting Point	رجڻ پد	Positive Charge	واڌو بار
Neutral	معتدل / بي عمل	Plane Polarized	روشن جي قطب راضي سطح
Neutralization Reaction	تعديلي رد عمل	Parameter	ماپا / مقدار پيما
Nervous System	تمني سر نشو	Quality Control	معياري ضابطو
Non Polar	غير قطبي	Qualitative	خاصيتي
Neurological	اعصابي	Quantitave	مقداري
Negative Charge	ڪاٺو بار	Reduction	عمل تخفيف
Numerical Value	عددي قيمت	Reaction Quotient	ردعمل جي وڌاپت
oil	تيل	Reversible	په طرفو
Oxidation	آڪسيڊجڻ	Reaction	ردعمل تعامل ڪرڻ
Organic	نامياتي	Range	حد
		Reactant	عامل
		Random	بي ترتيب وار

لغت (Glossary)

معني	لفظ	معني	لفظ
Rays	شعائون / شعاء	Secondary	ثانوي
Reagent	متعمل	Spectrograph	طيف نگار
Ratio	تناسب	Solubility	حل پذيري
Ring	گهيرو	Solvent	محلل ڳاريندڙ
Spectroscopy	طيف بيني	Starch	نشاستو
Soft Water	نرم پاڻي	Solution	ڳار/محلول/حل
Square root	پيول مول	Stability	استقامت / پائيداري
Scale	پيمانو	Table	جدول
Surface Tension	سطحي چڪ	Temporary	عارضي
Soluble	حل پذير / گهلڻ	Tetravalency	چوگرتي
Saponification	صابن سازي	Tetrahydral	چو سطحي
Sulphuric Acid	گندرفي تيزاب	True Value	اصل قيمت
System	سرسشتو / نظام	Theory	نظريو
Solid	نھرو	Titration	معائره
Soda	ڪار	Titrimetric	معائري
Source	ذريعا	Tissue	تاندورا
Scum	تلھي ڇاڻ / گج	Temperature	گرمي پد / درجہ حرارت
Salt	لوڻ	Typhiod	مدي جو بخار
Systematic	منظم	Unit	ايڪو
Substance	شئي/مادو	Universal Solvent	عالمگير محلل
Structural	بناوتي	Valency	گرفت
Simple	سادو	Vapourization/Evaporation	تبخير
Soft Drink	سادو مشروب	Vital Force	اھم قوت
Sediment	لت	Vinegar	سرڪو
Syrup	شربت/ڳار	Volatile	غير مستحڪم
Sooty Flame	ڪاري ڏونھين سان شعلا	Variable	متغير
Smog	ڌند	Volume	حجم
Spectrum	طيف	Waste	فضول / ردي مادو
Synthesize	ٺاھڻ / تيار ڪرڻ		
Spectrometer	طيف پيمما		